

EXAME	LOCAIS DE ATENDIMENTO
<p><b>Imunodifusão radial dupla para Blastomicose (Paracoccidioidomicose)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Tempo de Trombina</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Mononucleose (Paul-Bunell)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Weil Felix (Aglutinação em Lâmina)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Mioglobina (Sangue)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Manganês</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<p><b>Leptospirose - IgM</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>BNP - Peptídeo Natriurético</b></p>	<p>HMC 1</p>
<p><b>Maconha - Teste de Triagem</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Galactose Total (Triagem Neonatal) - Dosagem</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Estudo Genético da Hemocromatose Plus C282Y, H63D, S65C</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<b>iodo Proteico</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Fibrose Cística: 36 Mutações</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Pesquisa de Microdelação do Cromossomo Y</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Detecção de BK/JC Poliomavirus</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Renina Quantificação</b>	HMC 1

<b>Ácido 2 Tio - Tiazolidina 4 - Carboxílico</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Fenilalanina Plasmática</b>	HMC 1
<b>Cultura de Campylobacter</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IgE Especifico para Leite Fervido</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Adiponectina</b>	HMC 1

<b>Seqüenciamento do gene BBS (Síndrome Bardet-Biedl)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Anti LC1 (citosol hepático)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Vitamina A</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Vitamina B1</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Vitamina B2</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<b>Vitamina B6</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Acido Hipurico</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Acido Metil-hipurico</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Tempo de Trombina</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Fosfatase Alcalina Específica Óssea (Esquelética)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<p><b>HLA DQ2 e DQ8</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Drogas de Abuso no Cabelo - Concurso</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2</p>
<p><b>Pesquisa de Mutações em Genes BRCA1 e BRCA2 por MLPA</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>IgE Específico (F351) - Alimentos - Tropomiosina, Camarão</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Clobazam</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<b>Neisseria Gonorrhoeae - Anticorpos IgG</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Perfil Completo Ácidos Graxos</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Leptospira - Pesquisa</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Renina Atividade</b>	HMC 1
<b>Leishmania - Anticorpos IgG</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano



<b>Leishmania - Anticorpos IgM</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Intolerância Lactose (MCM6) Polimorfismos</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Proteína Beta Trace (Prostaglandina D2 Sintetase)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Toxicológico de Larga Janela de Detecção com relatório CAGED (CNH)</b>	HMC 1 HMC 2
<b>Dihidrotestosterona</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<p><b>Histoplasma Capsulatum, anti</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Widal (Febre Tifóide), Reação</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Iodo - Urina 24h</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Iodo - Urina amostra isolada</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>ADAMTS - 13 ATIVIDADE da protease de ruptura Fator V.Willebran</b></p>	<p>HMC 1</p>

<p><b>ADAMTS - 13 ANTÍGENO da protease de ruptura Fator V. Willebrand</b></p>	<p>HMC 1</p>
<p><b>Perfil Tandem - Qualitativo (Pesq. distúrbios dos ácidos orgânicos)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Imunofixação urina 24 horas (eletroforese)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Ácido Metilmalônico Urina</b></p>	<p>HMC 1</p>
<p><b>Imunofixação no sangue (eletroforese de imunoglobulinas)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<p><b>Anticorpos IgG Anti Gangliosideos</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Metabólitos de Glicosaminoglicanos Quantitativo Urina (GAGS)</b></p>	<p>HMC 1</p>
<p><b>Síndrome de Noonan - Painei</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Zinco Eritrocitário</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Anticorpos Anti Chikungunya IgG/IgM - Uso exclusivo do convênio IPSM</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<p><b>Anticorpos Anti Actina</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Cromatografia de Aminoácidos Qualitativo (sangue)</b></p>	<p>HMC 1</p>
<p><b>Cistina Quantitativo</b></p>	<p>HMC 1</p>
<p><b>Hepatite A - Anti HAV Total</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Dehidroepiandrosterona</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<b>Pesquisa de Amplificação do Gene HER2 - Hibridização In Situ</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Painel Imunoistoquímica para Pulmão ALK (D5F3)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Aluminio</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Herpes Vírus Tipo 8</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Intolerância a Frutose</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<p><b>Treponema pallidum - Pesquisa</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã* Unidade Timóteo* Unidade Coronel Fabriciano*</p>
<p><b>Parvovirus B19 PCR</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Anticoagulante Circulante, Pesquisa</b></p>	<p>HMC 1</p>
<p><b>Teste de Fragmentação do DNA do Espermatozóide</b></p>	<p>HMC 1</p>
<p><b>Anticorpos Anti-Proteína P Ribossomal</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<p><b>NGS: HFE, HFEA2, HAMP, SLC40A1, TFR2, FTH1, BMP2</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Lipase Ácida Lisossomal</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Tripsina Imunoreativa (IRT)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Parasitológico KATO KATZ</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Sequenciamento Exoma Tumoral Signatera</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>



<b>Monitoramento Signatera</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Cádmio</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Anticorpos Anti-Fosfolipase A2</b>	HMC 1
<b>Mitotano</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Mutação V600E no gene BRAF</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<b>Carnitina Total e Livre</b>	HMC 1
<b>Hidroxirolina Total</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Esporotricose - Sorologia para Esporotricose</b>	HMC 1
<b>Hibridização in situ para pesquisa de quebra do gene EWS</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Anticorpos Anti RNA Polimerase I</b>	HMC 1

<b>Cariótipo com Banda G - Amniocentese</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Magnésio Eritrocitário</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Painel NGS para Distrofia da Retina e Retinopatias</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Arsênio Urinário</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>N-Metilformamida - Urina</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<b>Pentaclorofenol (Pó da China)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Subfracionamento de Lipoproteína</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Deteção de Mycobacterium Tuberculosis e Resistência a Rifampicina</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Anti SARS-CoV-2, Anticorpos Neutralizantes</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Anticorpos Anti-MDA5</b>	HMC 1

<p><b>Complemento C3 Pró-ativador (Fator B)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>COVID-19 (RT-PCR) HMC</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>RT-LAMP ULTRA RÁPIDO para COVID-19</b></p>	<p>HMC 1</p>
<p><b>Oncotype, Mamário Invasivo, Vários Materiais</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Pesquisa de Co-Deleções em 1p e 19q e Mutações em IDH1 e 2</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<p><b>Gene MGMT (promotor) metilação - Metilação gliomas  </b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Reação imuno-histoquímica para PD-L1</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Painel Imunoistoquímica P/ Pulmao ALK(D5F3)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Teste Biópsia</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Biópsia</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<p><b>Biópsia de Mama - SISMAMA</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Biópsia de Colo Uterino - SISCOLO</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Biópsia Externa</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Biópsia simples Externa</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Biópsia de fragmentos múltiplos Externo</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<p><b>Peça cirúrgica complexa Externa</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Biópsia de Mama HMCC - SISMAMA</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Biópsia de Colo Uterino HMCC - SISCOLO</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Biopsia Oncológica (Simples ou Material Pequeno)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Biopsia Oncologia Peça Cirúrgica Estadiamento</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>



<p><b>Biopsia Não Oncológica (Simples ou Material Pequeno)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Biopsia Não Oncológica Peça Cirúrgica Estadiamento</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Biópsia percutânea enxerto renal</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Amilase</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Fosfatase Alcalina (FA)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<b>Fósforo</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Gama Glutamil Transferase (GGT)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Glicemia 1h após Dextrosol</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Desidrogenase Láctica (LDH)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Potássio</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<b>Proteínas Totais</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Sódio Urina 24 horas</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Transaminase Oxalacética - TGO/AST</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Transaminase Pirúvica - TGP/ALT</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Uréia</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<p><b>Anti-Estreptolisina O (ASLO)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Fator Reumatóide, Teste do Látex</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Proteína C Reativa Quantitativa (PCR)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Toxoplasmose, Anticorpos IgG</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Tiroxina Livre (T4L)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<b>Ácido Úrico</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Hormônio Folículo Estimulante (FSH)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Proteinúria de 24 horas</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>CEA (Antígeno Carcinoembrionário)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Albumina</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<b>Cloretos</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>CKMB (Creatinoquinase fração MB)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>CK Total (Creatinoquinase)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Estradiol Basal (E2)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Triiodotironina (T3)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<b>Tiroxina (T4)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Ácido Fólico (folato)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Prolactina</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Paratormonio PTH Intacto (Molécula inteira)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Hormônio Luteinizante (LH)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<b>Lipase</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Meta-hemoglobina</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Rubéola, anticorpos IgG</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Tireoestimulante (TSH)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Colesterol Total</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano



<p><b>VDRL - Reação de Sífilis</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Citomegalovirus IgG, anticorpos</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Citomegalovirus IgM, anticorpos</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Waler-Rose</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Toxoplasmose, Anticorpos IgM</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<p><b>Osmolalidade (Sérica)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Anti HBC (Anticorpos Hepatite B)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Glicemia 2h após almoço (pós prandial)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>HBSAg (Antígeno Austrália)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Proteínas Totais e Frações</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<b>Cortisol Basal</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Curva Glicêmica Clássica (5 dosagens / 3 horas)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>PSA Livre/Total</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Cálcio Iônico</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Chagas, Quimioluminescência</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<b>Bilirrubina total e frações</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Colesterol HDL</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Clearance de creatinina</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Cálcio Total</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Ferritina Sérica</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<b>Triglicéridios</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Gravidez (BHCG no sangue)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Colesterol LDL</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Rubéola, anticorpos IgM</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Cloretos - Urina 24 horas</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<b>Mucoproteínas</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Colesterol VLDL</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Sódio</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Clareance de Uréia</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Gasometria Arterial</b>	HMC 1 HMC 2

<b>Glicemia</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Vitamina B12</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Anti HBS (Anticorpos Hepatite B)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Curva Glicêmica (4 dosagens)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Dengue, Pesquisa de Anticorpos IgG e IgM (teste rápido)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<b>Sobrecarga de Cálcio</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Ácido Úrico - Urina 24 horas</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Vitamina D3 (25-Hidroxi)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Creatinina</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Glicemia 1h após almoço</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano



<b>Ferro Sérico</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Capacidade Combinação Total Ferro</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Capacidade Livre de Ligação do Ferro</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Cortisol após Dexametasona</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Cortisol (Horário Determinado)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<b>Insulina</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Insulina - 2h após almoço (pós prandial)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Cálcio - Urina 24 horas</b>	HMC 2 Unidade de Medicina Diagnóstica – Ideal Unidade Avançada – Canaã Hospital e Maternidade Vital Brazil –Timóteo Unidade Timóteo
<b>Anti HCV (Hepatite C)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Glicemia 2h após Dextrosol</b>	HMC 2 Unidade de Medicina Diagnóstica – Ideal Unidade Avançada – Canaã Hospital e Maternidade Vital Brazil –Timóteo Unidade Timóteo

<p><b>Cetonemia Semi-Quantitativa</b></p>	<p>HMC 2  Unidade de Medicina Diagnóstica – Ideal  Unidade Avançada – Canaã  Hospital e Maternidade Vital Brazil –Timóteo  Unidade Timóteo</p>
<p><b>Carboxihemoglobina</b></p>	<p>HMC 2  Unidade de Medicina Diagnóstica – Ideal  Unidade Avançada – Canaã  Hospital e Maternidade Vital Brazil –Timóteo  Unidade Timóteo</p>
<p><b>Curva Glicêmica (7 dosagens / 5 horas)</b></p>	<p>HMC 1  HMC 2  Unidade Avançada – Canaã  Unidade Usifamilia - Canaã  Unidade Timóteo  Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Curva Glicêmica (6 dosagens / 4 horas)</b></p>	<p>HMC 1  HMC 2  Unidade Avançada – Canaã  Unidade Usifamilia - Canaã  Unidade Timóteo  Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Curva Insulina 6 dosagens (4 horas)</b></p>	<p>HMC 1  HMC 2  Unidade Avançada – Canaã  Unidade Usifamilia - Canaã  Unidade Timóteo  Unidade Cononel Fabriciano</p>

<b>Creatinina/Urina 24 horas</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>HIV 1 e 2, pesquisa de anticorpos</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Anticorpo Anti HTLV I e II</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Sódio - Urina em Amostra Isolada</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Tacrolimus</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<b>PSA TOTAL (Antígeno Prostático Específico).</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Lactose - Teste de Tolerância</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Sacarose, Teste de Tolerância</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Índice Homa/Beta</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Ácido Úrico, Urina Micção Única</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<b>Cálcio Urina Micção Única</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Glicose/Urina 24 Horas</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Magnésio/Urina 24 Horas</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Proteína/Creatinina Urina - Micção única</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Ácido Lático (lactato)</b>	HMC 1 HMC 2

<b>Magnésio</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Gasometria Venosa</b>	HMC 1 HMC 2
<b>Fósforo - Urina 24 horas</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Potássio - urina 24 horas</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Potássio - Urina em Amostra Isolada</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<b>Curva Insulina 5 dosagens (3 horas)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Uréia - Urina de 24 horas</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Taxa de Filtração Glomerular</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Globulina Ligadora de Hormônios Sexuais (SHBG)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Tireoperoxidase, Anticorpos Anti - TPO (Microsomal)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano



<p><b>Dengue NS1, Pesquisa de Antígeno (teste rápido)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Sorologia para Sífilis, Anticorpo Total</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>IgE Total</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Hemoglobina Glicosilada (HBA1C)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Vancomicina</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<b>Colesterol Total - Sem jejum</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Colesterol HDL - Sem jejum</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Colesterol LDL - Sem jejum</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Colesterol VLDL - Sem jejum</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Triglicéridios - Sem jejum 12 horas</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<b>Clearance de Amilase</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Uréia em Urina Recente</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Glicemia 2h após jantar (pós prandial)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Colesterol Total e Frações</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Leishmaniose, Pesquisa de Anticorpos IgG e IgM (teste rápido)</b>	HMC 1 HMC 2

<p><b>Cortisol após 4 mg de Dexametasona (LIDDLE 1)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Prolactina com diluição</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Creatinina - Urina em Amostra Isolada</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Procalcitonina</b></p>	<p>HMC 1</p>
<p><b>Hemoglobina Glicada por HPLC (HbA1c)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<b>Metotrexato</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Troponina</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>COVID-19 (IgG/IgM) Teste Rápido</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>COVID-19 (Pesquisa de Antígenos) Teste Rápido</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>COVID-19, Anticorpos IgG</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<b>COVID-19, Anticorpos IgM</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>T3 Livre</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Prolactina Pool</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Bicarbonato Dosagem (CO2 total)</b>	HMC 1
<b>Proteína C Reativa Quantitativa (PCR)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<b>Dímero D</b>	HMC 1
<b>Gravidez (BHCG Qualitativo no sangue)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>HIV Qualitativo</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Anti HCV Qualitativo</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>HBSAg Qualitativo (Teste Rápido)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<b>Sódio</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Potássio</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Cálcio Iônico</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Cloretos</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Glicemia</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano



<b>Uréia</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Creatinina</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Magnésio</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Transaminase Oxalacética - TGO/AST</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Transaminase Pirúvica - TGP/ALT</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<b>Gama Glutamil Transferase (GGT)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Fosfatase Alcalina (FA)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Amilase</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Lipase</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Desidrogenase Láctica (LDH)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<p><b>CK Total (Creatinoquinase)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>CKMB (Creatinoquinase fração MB)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Bilirrubina total e frações</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>COVID-19 (Anticorpos Totais) Teste Rápido (Ministério Saúde)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2</p>
<p><b>Ácido Úrico</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<b>Albumina</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Citologia Cérvico Vaginal</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Citologia Cérvico Vaginal - Externa</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Citologia Cérvico Vaginal HMCC</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Citologia Cérvico Vaginal - SUS</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<p><b>Tempo e Atividade de Protrombina (TPA)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Tempo de Tromboplastina Parcial (TTPA)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Complementação</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Congelação HMC I</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2</p>
<p><b>Congelação HMC II</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<b>Congelação (Cubatão)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Fezes, Parasitológico (1ª amostra) (EPF)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Fezes, Parasitológico (2ª amostra) (EPF)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Fezes, Parasitológico (3ª amostra) (EPF)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Fezes, Parasitológico (Colh. Múltipla - 2 amostras-mesmo recipiente)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<p><b>Fezes, Parasitológico (Colh. Múltipla - 3 amostras-mesmo recipiente)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Fezes, Pesq. Sangue Oculto (sem dieta)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Substâncias Redutoras nas Fezes</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Pesquisa de Enterobius vermicularis (Swab)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>PH Fecal</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<b>Pesquisa de Leucócitos fecais</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Muco nas Fezes</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Tripsina Imuno-Reativa (IRT)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>PCR quant. CMV (CTRS)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>CA 125</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano



<b>CA 15-3</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Manganês</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Galactose Plasmática</b>	HMC 1
<b>Dosagem de Succinilacetona no Sangue</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Espermograma</b>	HMC 1

<p><b>Triagem Neonatal Ampliada</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Porfirinas, Dosagem</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Adenovirus, Anticorpos - Fixação do Complemento</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Beta - Talassemia, Análise Molecular</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Imunofenotipagem para Hemoglobinúria Paroxística Noturna (CD55, CD59)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2</p>

<p><b>Cariótipo com Banda G para Doenças Hematológicas Medula</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2</p>
<p><b>Mutações no Gene CEBP-Alfa</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2</p>
<p><b>Eletroforese de Hemoglobina com outros Estudos Pesquisados</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2</p>
<p><b>21 Hidroxilase Enzima, Anticorpo, soro</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Genotipagem do sistema HLA</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2</p>

	HMC 1 HMC 2
<b>HLA DR e DQ, Teste de Histocompatibilidade Baixa Resolução</b>	HMC 1 HMC 2
<b>Imunofenotipagem, Painel Proliferativo</b>	HMC 1 HMC 2
<b>Mutação do Tipo ITD no Gene FLT3 por PCR</b>	HMC 1 HMC 2
<b>Gene Receptor da Trombopetina (MPL) - W515L/W515K</b>	HMC 1 HMC 2

<b>Gene NPM1, Pesquisa de Mutação</b>	HMC 1 HMC 2
<b>Parvovirus B19 por PCR - Fleury</b>	HMC 1 HMC 2
<b>PCR para Translocação (T15:17), PML - Rara</b>	HMC 1 HMC 2
<b>Proteína Transportadora de Retinol - Urina</b>	HMC 1
<b>Aminoácidos Quantitativo, Líquor</b>	HMC 1 HMC 2

<b>Fish para F1P1L1 PDGFR Alfa</b>	HMC 1 HMC 2
<b>BCR-ABL Tipo P210 (PCR)</b>	HMC 1 HMC 2
<b>Hibridação in situ, por fluorescência, para LLC</b>	HMC 1
<b>Análise de mutações do gene c-KIT, Vários Materiais</b>	HMC 1 HMC 2
<b>MTHFR, Mutação C677T e A1298C, por PCR</b>	HMC 1

<b>Epstein-Baar vírus, Hibridização in situ, vários materiais</b>	HMC 1 HMC 2
<b>BCR-ABL, Tipo P190 e P210, quanti. por RT-PCR em tempo-real</b>	HMC 1 HMC 2
<b>Paraneoplásicos, Painel de anticorpos, Líquor</b>	HMC 1 HMC 2
<b>Hibridação in Situ (fluorescência) para Mieloma Múltiplo</b>	HMC 1 HMC 2
<b>BCR-ABL, Hibridação in situ, sangue periférico</b>	HMC 1 HMC 2

<b>Cadeias Kappa e Lambda Livres (FLEURY)</b>	HMC 1 HMC 2
<b>Mutação TP53 por MLPA</b>	HMC 1 HMC 2
<b>HLA DR e DQ, Teste de Histocompatibilidade Alta Resolução, Sangue Total</b>	HMC 1 HMC 2
<b>HLA A e B, Teste de Histocompatibilidade de Média Resolução, Sangue Total</b>	HMC 1 HMC 2
<b>Anticorpos Anti-Fosfatidiletanolamina IgA, IgG e IgM</b>	HMC 1 HMC 2



<b>Imunofenotipagem de linfócitos T, B e NK (sangue periférico)</b>	HMC 1 HMC 2
<b>Triagem Genômica, Portadores de Múltiplas Malformações Congênita</b>	HMC 1
<b>CGH-ARRAY para Análise de Anomalias Cromossômicas 400K</b>	HMC 1 HMC 2
<b>Proto-Oncogene RET: 8 éxons</b>	HMC 1 HMC 2
<b>Mutações Calreticulina</b>	HMC 1 HMC 2

<p><b>HLA-C , Teste de histocompatibilidade de alta resolução, sangue total</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2</p>
<p><b>Reatividade, Contra painel de linfócitos, classe I e II</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>HLA DR, Teste de histocompatibilidade de média resolução, sangue total</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2</p>
<p><b>Teste de Sensibilidade de Micobactérias</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Análise de Hipermutação Somática do IGH, para LLC, vários materiais</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<p><b>Fish para o Gene TP53</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2</p>
<p><b>Dosagem de Tireoglobulina, Obtido por punção</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2</p>
<p><b>Painel, Câncer Hereditário Expandido</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Síndrome Mielodisplásica, Hibridação In Situ, Vários Materiais</b></p>	<p>HMC 1</p>
<p><b>Alfa-1 Antitripsina, Fenotipagem</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<b>HLA-A, Teste de Histocompatibilidade de Alta Resolução, Sangue Total</b>	HMC 1 HMC 2
<b>HLA-B, Teste de Histocompatibilidade de Alta Resolução, Sangue Total</b>	HMC 1 HMC 2
<b>Painel de genes para ataxias hereditárias</b>	HMC 1 HMC 2
<b>NIPT Estendido - Pre Natal não invasivo Ampliado</b>	HMC 1
<b>Gordura Fecal - Dosagem 24h, 48h ou 72h</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<p><b>Tetrahydrocannabinol dosagem</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Síndrome Febre Periódica, painel com 21 Genes</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>HLA DR, Teste de histocompatibilidade de alta resolução</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Painel, Cancer de Mama e Ovário - Vários Materiais</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Neisseria Gonorrhoeae, Anticorpos IGG E IGM</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<p><b>BCR-ABL, Detecção de Mutações do Gene, Vários Materiais</b></p>	<p>HMC 1</p>
<p><b>Sequenciamento de Exoma, vários materiais</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2</p>
<p><b>Proteína A Plasmática, Associada à Gravidez</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Hormônio de Crescimento placentário - PLGF</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Ataxias Espinocerebelares</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<p><b>Fibrose Cística Sequenciamento Completo Teste Molecular</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Citomegalovírus, qualitativo por PCR</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Herpes Simples Virus 1 e 2, PCR</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2</p>
<p><b>Painel Genético para Epilepsia, vários materiais</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Coombs Direto, Monoespecífico</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<p><b>Pré- Natal, Hibridação in situ, vários materiais</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2</p>
<p><b>Teste de Exoma por NGS + teste cromossômico comparativo ngQUANT</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Fibrinogênio</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Hemograma</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Leucograma</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>



<p><b>Reticulócitos</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Tempo e Atividade de Protrombina (TPA)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Teste de Falcização</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Líquor Rotina (análise hematológica + glicose, cloreto, proteínas)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2</p>
<p><b>Malária (Pesquisa de Plasmodium)</b></p>	<p>HMC 1</p>

<b>Retração do Coágulo</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Tempo de Coagulação (Lee-White)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Tempo de Sangramento (DUKE)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Hemossedimentação</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Tempo de Tromboplastina Parcial (TTPA)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<b>Dímero D</b>	HMC 1
<b>Eritrograma</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Hematócrito</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Hemoglobina</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Rotina de Líquidos</b>	HMC 1 HMC 2

<b>Plaquetas (CITRATO)</b>	HMC 1 HMC 2
<b>Plaquetas (HEPARINA)</b>	HMC 1 HMC 2
<b>Plaquetas (FÔNIO)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Pesquisa de Eosinófilos</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Fragilidade Capilar</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<p><b>Líquido Células Caract. Gerais</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Líquido Células Cont. Específica</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2</p>
<p><b>Caracteres físicos (líquor)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2</p>
<p><b>Pesquisa de Leishmania (tegumentar)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Coombs Indireto</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<p><b>Liquor Rotina (análise hematológica)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2</p>
<p><b>Coombs Direto</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Tempo e Atividade de Protrombina (teste de mistura)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Grupo Sanguíneo ABO e RH</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Tempo de Tromboplastina Parcial (teste de mistura)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<b>Reticulócitos</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Plaquetas (EDTA)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Teste Rápido Malária</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Grupo Sanguíneo ABO e RH - (RN até 01 ano de idade)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Hemossedimentação</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<b>Plaquetas (FÔNIO)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Grupo Sanguíneo ABO e RH</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Líquido Células Caract. Gerais</b>	HMC 1 HMC 2
<b>Líquido Células Cont. Específica</b>	HMC 1 HMC 2
<b>Aldolase</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano



<b>Proteína-Bence-Jones, pesquisa</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Complemento Sérico C3</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Complemento Sérico C4</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Imunoglobulinas IgG</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Imunoglobulinas IgA</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<p><b>Imunoglobulinas IgM</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>HBC IgM, anti</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>HBE-AG</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Aldosterona</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Estriol (E3)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<p><b>17 Alfa Hidroxiprogesterona (1ª amostra)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Músculo Liso, Anticorpos Anti ASMA</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>ACTH (adenocorticotrófico)</b></p>	<p>HMC 1</p>
<p><b>Acido Vanilmandélico</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Brucelose IgG, Anticorpos</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<p><b>Catecolaminas Frações (URINA)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Cisticercose (ELISA)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Colinesterase Plasmática</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Hemoglobina A2, Dosagem</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Mitocôndria, Anticorpos anti AMA</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<b>Eletroforese de Hemoglobina (PH Alcalino + HPLC)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Triagem Urinária Mínima para Erros Inatos</b>	HMC 1
<b>Estrona (E1)</b>	HMC 1
<b>Fosfatase Ácida Total</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Anticorpo Anti DNA, IFI para</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<b>Tireoglobulina</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>HBE, anti</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Superoxido Dismutase</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Fenol Urinário</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Coprológico Funcional (Elementos anormais nas fezes)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<b>Gordura Fecal - Pesquisa (SUDAM III)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Criptosporidium - Pesquisa</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Progesterona</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Tiocianato</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Western Blot - Anticorpos anti HIV</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<b>Lipídios Totais</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Hemoglobina Fetal</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Sarampo IgM</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IgE para Poeira (HX2)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IgE Múltiplo - Frutos do Mar/Peixe</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano



<b>IgE para Leite</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Calcitonina</b>	HMC 1
<b>Mioglobina Urinária - Pesquisa</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>CD4 - Subpopulação Linfocitária</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Hormônio De Crescimento (GH)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<p><b>Leptospirose (Reação de Soro Aglutinação)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>CA 15-3</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>SSA/RO, Auto Anticorpos Anti</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>SSB/LA, Auto Anticorpos Anti</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Inibidor de C1 Esterase Quantitativo</b></p>	<p>HMC 1</p>

<p><b>Beta 2 Microglobulina Sangue</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Chlamydia IgG Trachomatis (Imunofluorescência Indireta)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Fta-Abs, Titulação de Anticorpos IgG Treponema (imunofluorescência)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>SM, Auto Anticorpos Anti</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>RNP, Auto Anticorpos Anti</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<b>CA19-9</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Fluoreto</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Ácido Mandélico</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Centrômero, Anticorpos anti</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Histoplasma Capsulatum, anti</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<b>Chlamydia IgM Trachomatis (Imunofluorescência Indireta)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Ilhota, Auto Anticorpos anti</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Imunofixação urina 24 horas (eletroforese)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Mercurio em urina</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Haptoglobina</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<b>Legionella IgG</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Neutrófilos, Anti - ANCA</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Osmolaridade (URINA)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Arsenico (Sangue)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Metanol</b>	HMC 1

<p><b>ADA, (Líquidos)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Célula Parietal, Anticorpos anti (célula oxíntica)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Gliadina IgG, Anticorpos anti (doença celíaca)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Histona, Auto Anticorpos anti</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Insulina, Auto Anticorpos Anti</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<p><b>SCL 70, Auto Anticorpos Anti</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>CA 72-4</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>HDV, IgG anti</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Igf-1 - Somatomedina C</b></p>	<p>HMC 1</p>
<p><b>Cardiolipina IgM, Auto Anticorpos</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>



<b>IgE para Carne de Porco</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IgE para Trigo</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IgE para Cacau (F93)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IgE para Clara de Ovo</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Sarampo IgG</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<b>IgE para Glúten</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IgE para Milho</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IgE para Grão de Soja</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IgE para Carne de Vaca</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IgE para Amendoim</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<b>IgE Específico para Aveia (F7)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IgE Específico para Tomate</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IgE para Bacalhau</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IgE para Laranja</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IgE para Camarão</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<p><b>Fta-Abs IgM (sangue) treponema (imunofluorescência)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Toxocara, Anticorpos anti IgG, pesquisa</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Vitamina K</b></p>	<p>HMC 1</p>
<p><b>Aspergillus sp, anti</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Endomisio IgA , Anticorpos anti (doença celíaca)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<b>Gliadina IgA, Anticorpos anti (doença celíaca)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Eletroforese de Proteínas Líquor</b>	HMC 1 HMC 2
<b>IgE para Pernilongo</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IgE Formiga</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IgE para Banana</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<b>IgE para Pelo de Cão</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Proteína C Funcional</b>	HMC 1
<b>Proteína S Funcional</b>	HMC 1
<b>Complemento (CH-50), Dosagem do</b>	HMC 1
<b>Fator VIII, Dosagem</b>	HMC 1

<p><b>Trypanosoma Cruzi IgG (Imunofluorescência) Chagas</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Mononucleose (Monoteste)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Chagas, IFI para</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Androstenediona</b></p>	<p>HMC 1</p>
<p><b>Mielograma</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<b>Cobre - Sangue</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Transferrina</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Alfa 1 Glicoproteína Ácida</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Proteína C Reativa Det Ultra sensível</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Diftérico, Cultura para Bacilo</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano



<p><b>Ureaplasma Urealyticum - cultura</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Mycoplasma Hominis - Cultura</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Pneumocystis Jirovecii - Pesquisa</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Crioaglutininas</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2</p>
<p><b>Microalbuminúria (Albumina/Creatinina)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<b>Crioglobulinas - Pesquisa</b>	HMC 1 HMC 2
<b>Varicela (Herpes Zoster) IgG, Anti</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Varicela (Herpes Zoster) IgM, Anti</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Coproporfirinas - Pesquisa</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Protoporfirinas - pesquisa</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<b>Zinco Protoporfirina</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Porfobilinogenio - Pesquisa</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Complemento C1q</b>	HMC 1
<b>Subclasses de IgG 1</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Subclasses de IgG 2</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<p><b>Subclasses de IgG 3</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Subclasses de IgG 4</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Eletroforese de proteínas urina 24 horas</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Esquistossomose (Imunofluorescência)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Endomisio IgG, Anticorpos anti (doença celíaca)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<b>Hepatite B Qualitativo</b>	HMC 1 HMC 2
<b>HCV, PCR Qualitativo</b>	HMC 1
<b>Micobacteria (PCR)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>HCV, PCR Quantitativo</b>	HMC 1
<b>Parvovírus B19 IgG, Anticorpos Anti</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<p><b>Parvovirus B19 IgM, Anticorpos Anti</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Tipagem de Linfócitos CD2 e CD19 + CD3, CD4 e CD8</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Cardiolipina IgG, Auto Anticorpos</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Anticoagulante Lúpico (Inibidor Lúpico)</b></p>	<p>HMC 1</p>
<p><b>Globulina de ligação de hormônios sexuais (SHBG)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<b>Fosfatase Alcalina Isoenzimas</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Proteinograma (Eletroforese de Proteína)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Citomegalovirus, Quantificação por PCR</b>	HMC 1
<b>T3 Reverso</b>	HMC 1
<b>Antitrombina III</b>	HMC 1

<b>Ácido Valpróico - Valproato de sódio</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Carbamazepina</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Ceruloplasmina</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Oxcarbazepina, Dosagem</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Imunoglobulina D</b>	HMC 1



<b>Difenilhidantoina</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IgE Específico para Veneno de Abelha</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IgE para Alho</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IgE para Arroz</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IgE para Atum</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<b>IgE para Batata (F35)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IgE para Candida albicans</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IgE para Carne de Caranguejo</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IgE para Carne de Galinha</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IgE para Caseína (alérgeno leite de vaca)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<b>IgE para Cenoura</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IgE Específico - Cladosporium Herbarum (M2)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IgE para Coco (F36)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IgE para Feijão Branco</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IgE para Gema de Ovo</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<b>IGE para Leite de Cabra (F300)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IgE Específico para Veneno de Marimbondo</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IgE para Mel</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IgE para Morango</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IgE Específico Para Pena de Ganso (E70)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<b>IGE para Penicilina G</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IGE para Penicilina V</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IgE Específico - Penicillium Notatum (M1)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>T3 Retenção + T4 Total (ITL)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>T3 Retenção (Captação ou Uptake)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<b>Listeriose (Soro Aglutinação)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Apolipoproteína A1</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>HBV PCR Quantitativo em Tempo Real</b>	HMC 1
<b>Legionella P/IF Direta - Pesquisa (URINA)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Toxoplasmose - Teste de Avidéz IgG</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<b>IgE Específico - Noz do Brasil (F18)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Coxsackievirus B (1-6) , Anticorpos IgG</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Enzima Conversora da Angiotensina</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Trypanosoma Cruzi IgM (Imunofluorescência) Chagas</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Vitamina Biotina (B8 - B7)</b>	HMC 1

<p><b>Metanefrinas- Frações - Urinarias</b></p>	<p>HMC 1  HMC 2  Unidade Avançada – Canaã  Unidade Usifamilia - Canaã  Unidade Timóteo  Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>TSH, Anticorpo Inibidor - TRAB (anti receptor)</b></p>	<p>HMC 1  HMC 2  Unidade Avançada – Canaã  Unidade Usifamilia - Canaã  Unidade Timóteo  Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Micoplasma Pneumoniae IGG</b></p>	<p>HMC 1  HMC 2  Unidade Avançada – Canaã  Unidade Usifamilia - Canaã  Unidade Timóteo  Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Micoplasma Pneumoniae IGM</b></p>	<p>HMC 1  HMC 2  Unidade Avançada – Canaã  Unidade Usifamilia - Canaã  Unidade Timóteo  Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Aminoácidos - Cromatografia Quantitativa (sangue)</b></p>	<p>HMC 1</p>



<b>Fosfolipídios</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Vitamina E</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>JO-1, Auto Anticorpos anti</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Sulfoniureias</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Alfa -1- Anti Tripsina</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<b>17 KS - Cetosteroides Neutros Totais (Urina 24h)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Glicose-6-Fosfato-Desidrogenase</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Caxumba IgM</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Caxumba IgG</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Ácido 5-Hidroxi indolacetico</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<b>Ácido Oxálico - Oxalato Sangue</b>	HMC 1
<b>Digoxina</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Lyme IgG</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Peptídeo C</b>	HMC 1 HMC 2
<b>Cistinúria - Pesquisa</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<p><b>Síndrome de Sotos - Mutações no Gene NSD1</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Etanol</b></p>	<p>HMC 1</p>
<p><b>IgE para Tartrazina</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Endomísio IgM, Anticorpos anti (doença celíaca)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>IgE Múltiplo MX2 (fungos)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<b>IgE para GX2 (pólen de gramínea)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IgE Específico - Ácido Acetilsalicílico (C207)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IgE para Beta Lactoglobulina (alérgeno leite de vaca)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Eletroforese de Lipoproteínas</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IgE para Folha de Tabaco</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<b>IgE Dermatophagoides Pteronyssinus (ácaro)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IGFPB-3 - Proteína Ligadora-3 do IGF</b>	HMC 1
<b>Eritropoietina</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>HBC IgG, anti</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>1,25 Dihidroxitamina D</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<p><b>Composto S 11 Desoxi-cortisol</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>17 OH - Hidroxi Corticosteroides</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Arsenico (Urina)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Mercurio (Sangue)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Aldosterona - Urina 24 horas</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<p><b>LKM, anti</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>2,5 Hexanodiona Urinária</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Alfa-2 Antiplasmina, Teste Funcional</b></p>	<p>HMC 1</p>
<p><b>3 Alfa Androstanediol Glicuronide</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>5 Nucleotidase</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>



<b>Alfa 2 Macroglobulina</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Musculo Estriado, Anticorpos anti</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Reticulina, Anticorpos anti</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Ácido Metil Malônico</b>	HMC 1
<b>Acetona</b>	HMC 1

<b>Adenovirus, IgG</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Adenovirus, Anticorpos IgM</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Ácidos Graxos Livres</b>	HMC 1
<b>HEV, anti</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Ácido Homogentísico - Pesquisa</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<b>Ácido Homovanílico</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>AMP Cíclico</b>	HMC 1
<b>Anfetaminas - Teste de Triagem</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Ácidos Orgânicos - Sangue</b>	HMC 1
<b>Apolipoproteína B</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<b>Antig. Solúvel do Fígado - Citoqueratina</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Inibidor do Ativador Tissular Plasminogênio</b>	HMC 1
<b>Barbitúricos - Teste de triagem</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Benzodiazepínicos - Teste de Triagem</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>BRCA1 e BRCA2 - Sequenciamento Genico Completo</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<p><b>Brucelose IgM, Anticorpos</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Inibidor de C1 Esterase Qualitativo</b></p>	<p>HMC 1</p>
<p><b>Complemento Sérico C2</b></p>	<p>HMC 1</p>
<p><b>IgE Específico - Paracetamol (C209)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>IgE Específico - Eritromicina (C212)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<p><b>IgE Específico - Xylocaina (Lidocaina) (C232)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>IgE Específico - Diclofenaco (C281)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>IgE Específico - Procaina (Novocaina) (C303)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>IgE Específico - Piroxicam (C304)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Complemento C5</b></p>	<p>HMC 1</p>

<p><b>IgE Específico - Insulina Bovina (C71)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>IgE Específico - Insulina Humana (C73)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Cariótipo de Restos Ovulares</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Cardiolipina IgA, Auto Anticorpos</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Cariótipo com Banda G</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<p><b>Cariótipo Banda G (Pesq. Doenças Hematológicas)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2</p>
<p><b>Caroteno</b></p>	<p>HMC 1</p>
<p><b>Cádmio - Urina</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>CD4, CD8 + CD3 - Subpopulação Linfocitária</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Complemento Sérico Total - CH100</b></p>	<p>HMC 1</p>



<p><b>Ciclosporina</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Creatina Sangue</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Chlamydia pneumoniae - Pesquisa (PCR)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Chlamydia Pneumoniae IgG, Anticorpos</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Citomegalovirus, Teste de Aidez IgG</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<b>Clonazepan</b>	HMC 1
<b>Colinesterase Eritrocitária</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Cortisol Livre</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Cromatografia dos Açúcares Redutores</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Cromo (Sangue)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<p><b>Catecolaminas Frações (SANGUE)</b></p>	<p>HMC 1</p>
<p><b>N - Telo peptideo - NTX</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Cobre - Urina</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>IgE Específico para Dermatophagoides Farinae</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>IgE para D. Microceras (D3)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<b>Desidrogenase Latica - Isoenzimas</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Estudo Genético da Distrofia de Becker e Duchenne</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Diazepan</b>	HMC 1
<b>IgE para Pelo de Gato</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IgE Específico Para Penas de Pato (E86)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<p><b>IgE Específico Para Penas de Peru (E89)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Echovirus IgG e IgM (Reação Sorológica)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Estudo Genético da Acondroplasia</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Entamoeba Histolytica, Anticorpos IgG (Amebíase)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Entamoeba histolytica - ELISA</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<b>IgE Específico - Ervilha (F12)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IgE para Limão</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IgE Específico - Lula (F258)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IgE Específico - Castanha (F299)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IgE para Mexilhão Azul</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<b>IgE Específico - Salmão (F41)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IgE para Cebola (F48)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IgE Específico - Polvo (F59)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IgE Específico - Mostarda (F89)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Fosfatase Alcalina Específica Óssea (Esquelética)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<b>Fator XIII. Dosagem</b>	HMC 1
<b>Fator VII, Dosagem</b>	HMC 1
<b>Fenobarbital</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Fator IX, Dosagem</b>	HMC 1
<b>Fator de Von Willebrand</b>	HMC 1



<b>Frutose</b>	HMC 1
<b>Fator XI da Coagulação</b>	HMC 1
<b>Fator XII da Coagulação</b>	HMC 1
<b>Fish para Síndrome Velocardiofacial</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>GAD, Auto Anticorpos anti</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<b>Gastrina</b>	HMC 1
<b>Gene da Metilenotetrahidrofolato Redutase</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Mutação no Gene da Protrombina</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Giardia Lamblia, Anticorpos IgG</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Giardia Lamblia, Anticorpos IgM</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<p><b>IgE Múltiplo - Sementes Oleagionosas</b></p>	<p>HMC 1  HMC 2  Unidade Avançada – Canaã  Unidade Usifamilia - Canaã  Unidade Timóteo  Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Glucagon</b></p>	<p>HMC 1</p>
<p><b>Glutationa Peroxidase</b></p>	<p>HMC 1  HMC 2  Unidade Avançada – Canaã  Unidade Usifamilia - Canaã  Unidade Timóteo  Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Ige Múltiplo - Cereal</b></p>	<p>HMC 1  HMC 2  Unidade Avançada – Canaã  Unidade Usifamilia - Canaã  Unidade Timóteo  Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>IgE Múltiplo - Alimentos Infantis</b></p>	<p>HMC 1  HMC 2  Unidade Avançada – Canaã  Unidade Usifamilia - Canaã  Unidade Timóteo  Unidade Cononel Fabriciano</p>

<p><b>Hemoglobina H</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Anticorpo anti hepatite E IgM</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>HCV, Genotipagem (HCV-PCR Superior a 600 UI/ML)</b></p>	<p>HMC 1</p>
<p><b>HDV IgM, anti</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>HEINZ, Corpúsculos de</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<b>Hidratos de Carbono - Carbohidratos</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Translocação BCR-ABL por PCR</b>	HMC 1
<b>HIV, Genotipagem</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>HIV, PCR Qualitativo</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>HIV, PCR Quantitativo</b>	HMC 1

<b>Hemoglobina Livre</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Antígeno HLA-B-27, PCR</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Vigabatrina, Dosagem</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Peptideo Intestinal Vasoativo, Dosagem</b>	HMC 1
<b>Vitamina C</b>	HMC 1

<p><b>Pesquisa Molecular de Cromossomo X Frágil (PCR)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Triclorocompostos Totais e Frações</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Triciclicos - Antidepressivos</b></p>	<p>HMC 1</p>
<p><b>Anticorpos anti Transglutaminase Tecidual IgG (doença celíaca)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Toxoplasmose, IgA</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<b>Helicobacter Pylori, IgG</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Helicobacter Pylori, IgM</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Captura Híbrida para HPV</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Anticorpo Anti HTLV I e II - Líquor</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IA2, Anti</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano



<p><b>IgE Específico - Verme no Sangue (I73)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Influenza A, Anticorpos IgG e IgM por Imunof.</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Influenza B, Anticorpos IgG e IgM por Imunof.</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Imunocomplexos Circulantes</b></p>	<p>HMC 1</p>
<p><b>Inclusão Citomegalica, Células</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<b>IgE Específico para Blomia Tropicalis (D201) (ácaro)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Índice de IgG no Líquor</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Imunofixação no sangue (eletroforese de imunoglobulinas)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Isoaglutininas (anti-A e anti-B)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IgE Específico - Seda Cultivada (K74)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<b>IgE para Látex</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IgE Específico - Semente de Algodão (K83)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>KAPPA - Cadeia Leve</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Kleihauer</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Lamotrigina</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<b>LAMBDA - Cadeia leve</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Fator V de Leiden</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Leucino Aminopeptidase</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>LDL Oxidada, anti</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Legionella IgM</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<p><b>Lyme IgM</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>IgE Específico - Rhizopus Nigricans (M11)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>IgE Específico - Fusarium Moniliforme (M9)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>17 Alfa Hidroxiprogesterona (2ª amostra)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>17 Alfa Hidroxiprogesterona (3ª amostra)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<b>17 Alfa Hidroxiprogesterona (4ª amostra)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>A.C.T.H. (2ª amostra)</b>	HMC 1
<b>A.C.T.H. (3ª amostra)</b>	HMC 1
<b>Dialdeido Malonico</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Metil Etilcetona</b>	HMC 1

<b>Mieloperoxidase</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Mycobacterium Tuberculosis IgA</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Estudo Molecular da Hiperplasia Adrenal Congenita (21 Hidroxilase)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Ácidos Biliares</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Mucopolissacaridoses - Pesquisa</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<b>Fator Natriurético Atrial</b>	HMC 1
<b>Antioxidantes Totais</b>	HMC 1
<b>Aquaporina 4, Anticorpos IgG</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Anti Beta 2 Glicoproteína</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Vitamina B3</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano



<b>Complemento C8</b>	HMC 1
<b>Peptideo Citrulinado Cíclico</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Células Herpéticas - Pesquisa (Celulas Tzanck)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Clozapina</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Atividade do Cofator da Ristocetina</b>	HMC 1

<p><b>Coxsackievirus A9, Anticorpos IgG e IgM</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Anticorpos anti Coxiela Burnetti IgG</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Anticorpos anti Coxiela Burnetti IgA</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Anticorpos anti Coxiela Burnetti IgM</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Creatinofosfoquinase - Isoenzimas</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<b>Criofibrinogênio - Pesquisa</b>	HMC 1 HMC 2
<b>Cromogranina A</b>	HMC 1
<b>Yersinia Enterocolitica - Cultura</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>D - Xilose</b>	HMC 1
<b>Estudo Genético da Doença de Huntington</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<b>Drogas de Abuso no Cabelo - Concurso janela maior que 30 dias</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Nitrazepan</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>17 Hidroxi-Pregnenolona</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Osteocalcina</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Avaliação do Risco Fetal - Teste Combinado</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<p><b>PCNA Anticorpos anti</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Ácido Fenilglicoxílico</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Ácido Fitânico e Ácido Pristânico</b></p>	<p>HMC 1</p>
<p><b>Alfa - Talassemia, Análise Molecular</b></p>	<p>HMC 1</p>
<p><b>Bartonella, Anticorpos IgM e IgG</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<p><b>Citomegalovirus IgG, Anticorpos (ELFA)</b></p>	<p>HMC 1  HMC 2  Unidade Avançada – Canaã  Unidade Usifamilia - Canaã  Unidade Timóteo  Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Citomegalovírus IgM, Anticorpos (ELFA)</b></p>	<p>HMC 1  HMC 2  Unidade Avançada – Canaã  Unidade Usifamilia - Canaã  Unidade Timóteo  Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>ACTH após supressão com Dexametasona</b></p>	<p>HMC 1</p>
<p><b>Fator II da Coagulação</b></p>	<p>HMC 1</p>
<p><b>Distrofia Facioescapuloumeral - Southern Blot</b></p>	<p>HMC 1  HMC 2  Unidade Avançada – Canaã  Unidade Usifamilia - Canaã  Unidade Timóteo  Unidade Cononel Fabriciano</p>

<b>Filaria - Pesquisa</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Paraminofenol</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Isospora Belli - Pesquisa</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Leishmaniose Visceral Humana, PCR</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>PM1 SCL, Anticorpo Anti* (Imunodifusão em G)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<p><b>Porfirinas - Pesquisa</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Polimorfismo do PAI-I</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Pré - Albumina</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Primidona</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Fosfatidilserina, Anticorpos IgM, IgG e IgA</b></p>	<p>HMC 1</p>



<p><b>Helmintos, Identificação</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Anticorpos Anti Filagrina/Profilagrina</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Fator Intrínseco, Auto Anticorpos</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Látex, (Líquidos)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Macro Prolactina</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<b>FTA-ABS, IFI para Sífilis (IgG) - Líquor</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Pro - Insulina</b>	HMC 1
<b>Proteína S Livre</b>	HMC 1
<b>G6PD (Papel Filtro)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Giardia-Elisa</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<p><b>Anticorpos anti Hantavirus IgG e IgM</b></p>	<p>HMC 1</p>
<p><b>Hemoglobinopatias (Papel de Filtro)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Estudo Genético das Mutações C282Y/H63D - Hemocromatose</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Hormônio de Crescimento (HGH - 2ª Amostra)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Hormônio De Crescimento (HGH - 3ª Amostra)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<p><b>Hormônio de Crescimento (HGH - 4ª Amostra)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Hormônio de Crescimento (HGH - 1ª Amostra)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Hormônio De Crescimento (HGH - 5ª Amostra)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Histoplasma, Detecção Antígeno Urinário</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Antígeno Helicobacter Pylori</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<b>Herpes Simples Virus 1 e 2, PCR</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Inibina A</b>	HMC 1
<b>Mutação V617F no Gene JAK2</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Morfologia Estrita de Kruger</b>	HMC 1
<b>Dosagem de Hormônio Lactogenio Placentário</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<b>LAMBDA (Cadeia Leve) e KAPPA (Cadeia leve)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Leptina</b>	HMC 1
<b>Licopeno</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Lítio Endógeno</b>	HMC 1
<b>Lipoproteína - A</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<b>Liozima</b>	HMC 1
<b>Lyme Western Blot</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Anticorpos Anti MAG IgG - Glicoproteína Associada</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Anticorpos Anti MAG IgM - Glicoproteína Associada</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Mycoplasma Pneumoniae IgG e IgM, Anticorpos</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<b>Mineralograma - Cabelo, Unha (Lab. Clinice)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Mineralograma - Sangue</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Anticorpos Tiroquinase Músculo Específica - MUSK</b>	HMC 1
<b>Células NK (CD56)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Opiáceos - Teste de Triagem</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano



<b>Proteína C Ativada, Resistência</b>	HMC 1
<b>Estudo de Síndromes Genéticas mais Frequentes</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Pregnenolona</b>	HMC 1
<b>Uroporfirinas - Pesquisa</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Anticorpos anti RAIVA (resposta vacinal)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<p><b>IgE Específico - Lagosta (RF304)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>IgE Específico - Vagem (RF315)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Anticorpos anti Rickettsia Rickettsii IgG</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Anticorpos anti Rickettsia Rickettsii IgM</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Pandy, Reação de</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<p><b>Rubéola Teste de Aidez IgG</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Estudo Genético da Mutação S65C para Hemocromatose</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Subunidade Alfa de Hormônios Glicoproteicos</b></p>	<p>HMC 1</p>
<p><b>Síndrome de Angelman e Prader-Willi por PCR</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Selenio Sérico</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<b>Serotonina Total</b>	HMC 1
<b>T4 Neo-natal</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>TBG - Globulina Ligadora de Tiroxina</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Teofilina</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Topiramato, dosagem</b>	HMC 1

<b>FTA-ABS IgG (sangue) treponema</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Alfa Fetoproteína</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Ácido Fólico Eritrocitário</b>	HMC 1
<b>Histamina</b>	HMC 1
<b>Triptase</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<p><b>Lítio</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>IgE para Alfa Lactoalbumina (alérgeno leite de vaca)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>IgE Especifico para Aspergillus Fumigatus (M3)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Ige Especifico Para Aspergillus Niger M207</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Ige Especifico Para Manga (F91)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<b>Triagem para Erros Inatos do Metabolismo Ampliada</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Antígeno HE-4</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>KAPPA - Cadeia Leve Urina</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>LAMBDA - Cadeia leve Urina</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Enolase Neuronal Específica</b>	HMC 1

<b>Treponema Pallidum IgM - Líquor</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Indican, pesquisa</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Glutaciona Redutase</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Alfa 1 Glicoproteína Ácida</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Fator de Necrose Tumoral TNF alfa</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano



<b>Zinco Urinário</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Anticorpos anti Ovarianos</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>C-Telopeptídeo - CTX</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Cariótipo com Bandas de Vilosidade Coriônica</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IgE Específico para Amoxicilina</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<p><b>IgE Múltiplo EX2 (epitélios de animais)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>IGE (EX2)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Bordetella pertussis, anticorpo IgM</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Bordetella pertussis, anticorpo IgG</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Ige Múltiplo EX1 (epitélios de animais: gato, cavalo, vaca e cão)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<b>Herpes Simples I e II IgG (Liquor)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Herpes Simples I e II IgM (Liquor)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Estudo Genético da Síndrome de Gilbert</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Estudo de Mutações do Gene EGFR</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>FISH para Translocação do Gene ALK</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<p><b>Quilomícrons - Inspeção do Plasma Refrigerado</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Imunofixação urina amostra única</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Estudo Genético da Apolipoproteína E</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Estudo Genético Fetal - PCR</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Chlamydia Pneumoniae IgM, Anticorpos</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<p><b>Mutação do Gene MPL para Doença Mieloproliferativa</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Proto Oncogene RET (éxons 16 e 15)</b></p>	<p>HMC 1</p>
<p><b>IgE Específico Pessego (F95)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>IgE Especifico para Kiwi (F84)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>IgE especifico para ananas (abacaxi)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<p><b>Oograma</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>IGE para Lactose (Principais Alérgenos do Leite)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Calprotectina Fecal</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Estudo Molecular HLA-B5701</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Anticorpos anti Receptor da Insulina</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<b>Beta Hidroxi-butírico</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Microsporídeos, pesquisa (Fezes)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IGE Específico - Extrato de Cochonilha (F340)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Anticorpos Anti Haemophilus Influenza Tipo B</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IgE para Barata (I6)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<p><b>Tireoglobulina em aspirado de punção</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>IgE Específico para Cevada</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>IgE Específico para Semente de Gergelim</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Tetano IgG, Anticorpos Anti</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Chlamydia Psittaci, Anticorpos IgG</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>



<b>Chlamydia Psittaci, Anticorpos IgM</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Poliomavírus BK/JC (PMV) DNA JC</b>	HMC 1
<b>Chlamydia Psittaci, Anticorpos IgA</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Chlamydia psittaci, PCR</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>PTH em aspirado</b>	HMC 1

<p><b>Neurofibromatose Tipo 1 (NF1) - Sequenciamento</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Citomegalovírus, qualitativo por PCR</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Varicela Zoster Vírus, PCR</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Teste Pré-Natal Não Invasivo</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Teste Pré-Natal Não Invasivo - Master</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<p><b>Fish - Amplificação de N-MYC em Neuroblastoma</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Ige Múltiplo EX71 (pena de aves)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>PCR para Síndrome de Werdnig-Hoffmann</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Estrongilóides, anticorpos</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Interferon Gamma - Quantiferon TB</b></p>	<p>HMC 1</p>

<b>Cariotipo com Banda G em Liquido Amniotico</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IgE especifico para pimenta do chile RF279</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IgE especifico para pimenta negra</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Treponema Pallidum (HA)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>HTLV - I, PCR</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<p><b>IgE Específico para veneno de Vespa</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Anticorpos anti-neuronais (sangue)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Seqüenciamento do gene RHO (Retinite pigmentosa)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Estudo Molecular da Síndrome Silver-Russell (MLPA)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>IgE Específico para Mamão Papaya RF293</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<p><b>IgE Específico para Abacate F96</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Instabilidade de Microssatélites - Parafina</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Estudo Genético do Exoma Completo</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Anticorpos anti Trichinella Spiralis (Triquinose)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Imunoglobulina IgA - Saliva</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<b>Zika Vírus, Teste Molecular</b>	HMC 1
<b>Anticorpos Anti Chikungunya IgG e IgM</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>ELASTASE PANCREÁTICA FECAL</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Equinococos, Anticorpos Totais</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>DENGUE, ANTICORPOS IgG</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<b>DENGUE, ANTICORPOS IgM</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Hemocromatose Hereditária - 5 Mutações</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Índice de Androgênios Livres</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Anticorpos anti Mi-2</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Subclasses de Imunoglobulina IgA 1 e 2</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano



<b>Ige Especifico para Cefalexina C309</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Chikungunya, Diagnostico Molecular Qualitativo (PCR)</b>	HMC 1
<b>Detecção e Tipagem do Virus da Dengue</b>	HMC 1
<b>Angiotensina I</b>	HMC 1
<b>Angiotensina II</b>	HMC 1

<b>Ige Especifico para Avelã F17</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Melatonina</b>	HMC 1
<b>BRCA1 - Mutação Familiar</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Cortisol Salivar</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Hemoglobina Glicada por HPLC</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<b>IGG Específico para Trigo</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Fator X da Coagulação</b>	HMC 1
<b>Ige Especifico para Penas de Galinhas</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Proteína 14.3.3 - Líquor</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IgE específico para Centeio (F5)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<b>Grelina</b>	HMC 1
<b>Certican</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Inibina B</b>	HMC 1
<b>Zika Vírus Anticorpos IGG</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Zika Vírus Anticorpos IGM</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<p><b>Chagas, HA (hemaglutinação)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Esquistossomose - Líquor</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Cisticercose - Líquor</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Beta Glicosidase em Leucócitos</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Steinert, Estudo Molecular da Distrofia Miotônica</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<b>Chlamydia Pneumoniae IgA, Anticorpos</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Anticorpos Anti Pneumococos</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IGE Específico para ovo</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Colesterol não HDL</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Biotinidase - Dosagem</b>	HMC 1

<b>Citometria e Citologia Líquidos</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Chlamydia trachomatis - Neisseria Gonorrhoeae (PCR)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Antígeno Tumoral da Bexiga</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Anticorpos Anti-Sintetase</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Protoporfirina Livre</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<p><b>Sirolimus</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Rubeola - PCR Qualitativo</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Cálculos Urinários (Cálculo Renal)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>IGE Específico para Maracujá (F294)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>IGE Específico para Castanha de Caju (F202)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>



<b>Epstein Barr, PCR - Quantitativo</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Síndrome de Sotos - Deleção no Gene NSD1</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Triagem para Imunodeficiência Combinada Grave - SCID</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Estradiol Basal (E2)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Testosterona</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<b>Micoplasma Hominis - PCR</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Coxsackievírus B (1-6), Anticorpos IgM</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Pesquisa de Decoy Cells</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Hemossiderina em Aspirado Medular</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IGE Múltiplo para TX7</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<b>IgE Específico para maçã</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IgE Específico para pêra</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Hemoglobinúria Paroxística Noturna (HPN)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Cariótipo com Banda G para 100 células Sangue Total</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IGE Específico para Malte F90</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<p><b>Fenilalanina (PKU)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Aminoacidúrias - Dosagem Quantitativa</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Anticorpos Neurais - Receptores NMDA [NR1 E NE2]</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Ocitocina</b></p>	<p>HMC 1</p>
<p><b>Acido Delta Amino Levulinico Urina 24 Horas</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<b>Painel de Epilepsia</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IGE Específico para Canela RF220</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Cistinúria - Pesquisa Urina Recente</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Interleucina 10</b>	HMC 1
<b>Alfa Galactosidase em Leucócitos</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<p align="center"><b>IGE Múltiplo (EX72)</b></p>	<p align="center">HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p align="center"><b>IgE Específico para Ampicilina</b></p>	<p align="center">HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p align="center"><b>Citomegalovírus IgG, Anticorpos (Elisa) - Líquor</b></p>	<p align="center">HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p align="center"><b>Citomegalovírus IgM, Anticorpos (Elisa) - Líquor</b></p>	<p align="center">HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p align="center"><b>Painel de Erros Inatos do Metabolismo Tratáveis</b></p>	<p align="center">HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<p><b>Estudo do Padrão de Metilação do Promotor (MGMT)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Hipercolesterolemia Familiar, Teste Genético</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>IGE Específico para Melancia F329</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Acilcarnitinas Urinarias</b></p>	<p>HMC 1</p>
<p><b>Acilcarnitinas (Perfil Quantitativo)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<b>IGE Específico para Caqui</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>PKU - Ampliado (Teste do pezinho)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>PKU - Básico (Teste do pezinho)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>PKU - Master (Teste do pezinho)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>PKU - Plus (Teste do pezinho)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano



<b>Fish para Cromossomo 21</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Anti Beta 2 Glicoproteína, anticorpos IgA</b>	HMC 1
<b>Pesquisa de Cromossomo Y para Síndrome de Turner - SRY</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Síndrome de RETT (Gene MECP2) por MLPA</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Testosterona livre</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<b>Zinco</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Fator Anti-Nuclear (HEP2)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Epstein Baar IgM - Anticorpos</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Epstein Baar IgG - Anticorpos</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Vitamina A</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<b>Proteína Glicosilada (Frutosamina)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Herpes Simples I e II IgM (Elisa)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Herpes Simples I e II IgG (Elisa)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Ácido Hipúrico</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Ácido Metil-hipúrico</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<b>Vitamina B6</b>	HMC 1
<b>Cistatina C</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Vitamina B1</b>	HMC 1
<b>Manganes - Urina</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Vitamina B2</b>	HMC 1

<b>Ácido Oxálico - Oxalato Urina 24 Horas</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Ácido Cítrico Urina Recente</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Ácido Oxálico - Oxalato Urina</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>HAV IgM, anti</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>HAV IgG, anti</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<b>Hemossiderina</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Piruvato Quinase</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Toxoplasmose por PCR</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IGE Específico para Dolichovespula Arenaria I5</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IGE Phadiatop Inalantes</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<p><b>Cryptococcus Neoformans - Aglutinação direta</b></p>	<p>HMC 1</p>
<p><b>Drogas de Abuso no Cabelo - Particular</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Síndrome de Deleções Submicroscópicas SDS - RM</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Cadasil, Sequenciamento dos Exóns 3 e 4 - Gene NOTCH3</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Levetiracetam (KEPPRA)</b></p>	<p>HMC 1</p>

<b>Bartonella Henselae, Anticorpos IgM e IgG</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Intolerância Alimentar A200</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Anticorpos Anti Epiderme</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Anticorpo Anti Nucleossomo (Anti Cromatina IgG)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Streptococcus grupo A (teste rápido)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano



<p><b>Proteína C Reativa Ultra sensível Fluidos Biológicos</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Pesquisa Genética para Distrofia Muscular</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Teste de Sexagem Fetal</b></p>	<p>HMC 1</p>
<p><b>Brometo Sangue</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Estudo Molecular Neoplasias Endocrinas TIPO 1</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<p><b>IgE Específico para Alfa Galactose 1,3</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>BCR-ABL Hibridação in situ, Aspirado Medular</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Sulfato de Dehidroepiandrosterona</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>GH basal e após supressão com Dextrosol - 2 horas</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Mucopolissacarídeos - Dosagem</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<b>Proteus, Síndrome</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Ige Específico para Alface F215</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Ige Específico para Mepivacaína C233</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Antifungigrama</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Interleucina 4</b>	HMC 1

<b>Kabuki, síndrome (MLL2) sequenciamento</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Anticorpos anti Helicobacter Pylori, IgA</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IGE Específico para Melão F87</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Estudo Molecular da Ataxia Espinocerebelar Tipo 1</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Ácido Láctico - LCR Líquor</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<p><b>Estudo Molecular da Ataxia Espinocerebelar Tipo 2</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Estudo Molecular da Ataxia Espinocerebelar Tipo 3</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Estudo Molecular da Ataxia Espinocerebelar Tipo 6</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Estudo Molecular da Ataxia Espinocerebelar Tipo 7</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Estudo Molecular da Ataxia Espinocerebelar Tipo 10</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<p><b>HTLV 1e 2, Anticorpos IGG por Western Blot</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Anticorpos Anti Coxsackievírus A IgG - Líquor</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Anticorpos Anti Coxsackevírus A IgM - Líquor</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Intolerância Alimentar - IgG Total (IA59)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Anticorpos Anti Coxsackievírus B IgG - Líquor</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<p><b>Anticorpos Anti Coxsackievírus B IgM - Líquor</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Painel de Síndromes Clinicamente Reconhecíveis</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Imunohistoquímica de PD-L1 (Ventana Clone SP263)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>CD34 - Teste De Viabilidade</b></p>	<p>HMC 1</p>
<p><b>Estudo Molecular do Polimorfismo do Gene da CBS (Cistationa Beta-Sintetase)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<b>Inflamograma Sistêmico</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Painel de Câncer Hereditário</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Biópsia Líquida-EGFR em plasma, pesquisa de mutação</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IgE Múltiplo (GX1)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IgE Múltiplo (FX7)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano



<p><b>Painel de Imunodeficiências Primárias</b></p>	<p>HMC 1  HMC 2  Unidade Avançada – Canaã  Unidade Usifamilia - Canaã  Unidade Timóteo  Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Ácidos Orgnânicos Quantitativos - Urina</b></p>	<p>HMC 1</p>
<p><b>CK - MB Massa</b></p>	<p>HMC 1  HMC 2</p>
<p><b>Neutropenia Congênita Severa (ELA2)</b></p>	<p>HMC 1  HMC 2  Unidade Avançada – Canaã  Unidade Usifamilia - Canaã  Unidade Timóteo  Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Fluoreto - Urinário</b></p>	<p>HMC 1  HMC 2  Unidade Avançada – Canaã  Unidade Usifamilia - Canaã  Unidade Timóteo  Unidade Cononel Fabriciano</p>

<p><b>Hemoglobina S - Teste de Solubilidade</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Ácido Butoxiacético - Urina</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Síndrome de RETT - Sequenciamento do Gene MECP2</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Anticorpos Esclerodermia (Anti TH/TO)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Painel para Câncer de Mama e Ovário Hereditários</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<p><b>Fósforo - Urina Recente</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Magnésio - amostra isolada</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>IgE Específico para Rcan F5 Canis Familiaris E226</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>IgE Específico Rcan F1 Canis Familiaris Cão E101R</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Síndrome de Brugada - Síndrome da Onda J</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<p><b>Painel Molecular para Síndrome de Brugada</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Ensaio de Ligação do Fator de Von Willebrand e Fator VIII</b></p>	<p>HMC 1</p>
<p><b>Ensaio de Ligação do Fator de Von Willebrand ao Colágeno</b></p>	<p>HMC 1</p>
<p><b>Acido Delta Amino Levulinico</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Pesquisa de Mutação PDGRF Beta por Fish</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<p><b>Sequenciamento Completo do Gene FGFR1</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Anticorpos IgG Anti Papiloma Humano (HPV-IGG)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>HIV 1 e 2 pesquisa - Líquor</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Ácido cítrico - Citrato Urina 24 Horas</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Creatina Urina Amostra Isolada</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<p><b>Creatina Urina de 24 Horas</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>IGE Específico para Amêndoa F20</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>IGE para RPRU P 3 LPT Recombinante Pêssego (F420)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>IGE para RPRU P4 Profilin Pêssego (F421)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>IGE Específico - RK215 RHEV B1</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<b>IGE Específico RK217 RHEV B 3</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Candida Albicans, Anticorpos IgG</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Candida Albicans, Anticorpos IgM</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Trypanossoma Cruzi, Anticorpos IGG - Elisa</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Toxoplasmose IgM, Anticorpos (ELFA)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<p style="text-align: center;"><b>Haloperidol</b></p>	<p style="text-align: center;">HMC 1</p>
<p style="text-align: center;"><b>Clostridium difficile DNA (PCR)</b></p>	<p style="text-align: center;">HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p style="text-align: center;"><b>Estudo Molecular da Atrofia Muscular Espinhal SMA</b></p>	<p style="text-align: center;">HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p style="text-align: center;"><b>Blastomicose (Paracoccidioomicose) - imunodifusão radial</b></p>	<p style="text-align: center;">HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p style="text-align: center;"><b>Chumbo Urinário</b></p>	<p style="text-align: center;">HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>



<b>Níquel (urina)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Rubéola IgM, Anticorpos Anti (ELFA)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Anticorpos Anti Gangliosideos IgM</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Diagnóstico da Mutação da Alfa 1 Antitripsina</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>PKU - Master + HIV ( Teste do pezinho)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<p><b>PKU - Master + MCAD ( Teste do pezinho)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>PKU - Completo (Teste do pezinho)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>PKU - Estendido ( Teste do pezinho)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>PKU - Expandido ( Teste do pezinho)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>PKU - Molecular ( Teste do pezinho)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<b>Sequenciamento Completo do Gene FAS</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Perfil Bioquímico de Ferro</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Anti DNASE B</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Estudo Molecular da Mutação A1298C</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IGE Específico - C294 Dipirona</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<p><b>IGE Específico para Tabanus (Mosca Mutuca)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Vitamina B5</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Painel de Neurofibromatose</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Pesquisa de Bandas Oligoclonais por Isofocalização</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>IgE Específico para RMAL D1 PR-10 Maçã (F434)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<b>IgE Específico para RMAL D3 LTP Maçã (F435)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IgE Específico para Damasceno (F237)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IgE Específico para Ameixa (F255)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IgE Específico para RPRU P1 PR-10 Pêssego (F419)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IGE Específico para Ômega-5 F416</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<b>CDH1 - Deleções e Duplicações por MLPA</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>PALB2 - Deleções e Duplicações por MLPA</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>STK11 - Deleções e Duplicações por MLPA</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>EPCAM - Deleções e Duplicações por MLPA</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>MLH1 e MSH2 - Deleções e Duplicações por MLPA</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<p><b>MSH6 - Deleções e Duplicações por MLPA</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Proteína Amilóide A</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Vírus Oeste do Nilo, Teste Molecular</b></p>	<p>HMC 1</p>
<p><b>Colesterol LDL - Dosagem Enzimática / colorimétrica</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Ácidos Orgânicos na Urina Qualitativo</b></p>	<p>HMC 1</p>

<p><b>HIV 1 e 2 (Papel Filtro)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Mutação no gene MCAD</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Pesquisa de Mutação do Gene PDGFR Alfa</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Laboratório de Apoio Tacrolimus</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Beta Total</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>



<p><b>Diagnóstico molecular Coronavírus COVID-19 (PCR-RT)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Homocistinúria - Urina Recente</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>IGE Específico para Periplanta Americana (i206)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Ige Específico para Sulfametoxazol C223</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Proteína Ligadora 2 de IGF - IGFBP2</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<p><b>IGF 2 - Fator de Crescimento Tipo 2</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Alfa -1- Anti Tripsina Fecal</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Influenza A - H1N1 (Secreção)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>IGE Específico para Codeína C300</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>IGE Específico para Conalbumina F323</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<b>IGE Específico para Uva F259</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Avaliação de CD20 (Linfócito)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Cromatografia Qualitativa de Aminoácidos Confirmatório</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Ácido Mevalônico (Urina)</b>	HMC 1
<b>MEFV - Mutação Familiar</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<b>Painel Mineral nas Hemácias</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Acetilcolina, Anticorpos anti Receptor</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>CA 50</b>	HMC 1
<b>Gliadina IgM, Anticorpos anti</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IgE Especifico para Ovo albumina</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<b>IgE Especifico para Ovomucóide</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Níquel (soro)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Ácido Cítrico - Citrato Soro</b>	HMC 1
<b>Alfa Glicosidase - Doença de Pompe</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Aminoacidúrias - Dosagem Qualitativa</b>	HMC 1

<p><b>Anticorpos Anti - Membrana Basal Glomerular</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Anticorpos anti Transglutaminase Tecidual IgA</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Anticorpos Anti Proteinase 3 - PR3</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Anticorpos anti RNA Polimerase Tipo III</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Aspergillus, Pesquisa do Antígeno Galactomanana</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<b>Brucelose, Soroaglutinação</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Chlamydia Trachomatis IgA, Anticorpos Anti</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Chumbo</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Cocaína - Teste de Triagem</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Fosfatase Ácida Prostática</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<b>T3 livre</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Tireoglobulina, Anticorpos anti</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Testosterona biodisponível</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Fenciclidina - Urina</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Estudo Molecular de Sensibilidade a Varfarina</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano



<b>Homocisteína</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IgE Painel (MX1) - Fungos e leveduras</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IgE para Cefalosporinas (Cefaclor, Cefalexin, Cefatoxina, Cefadroxila)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Mutação F 508 (IRT)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>NT - PROBNP</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<b>Quebras Cromossômicas, Pesquisa</b>	HMC 1 HMC 2
<b>Probiome - Microbiona Intestinal</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Ácido Transmuconico</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Risperidona</b>	HMC 1
<b>Sequenciamento Esclerose Tuberosa (TSC1, TSC2)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<p><b>Sequenciamento Completo do Gene MEFV</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Anticorpos Anti-Plaquetas</b></p>	<p>HMC 1</p>
<p><b>Beta 2 Microglobulina Urina</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Bicarbonato Urinário</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Coenzima Q10</b></p>	<p>HMC 1</p>

<b>Craniossinostose (FGFR2) - sequenciamento</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Cromo Urinário</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Galactose 1 Fosf. Uridil Transferase</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Hormônio Anti Mullerian (Muleriano)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IgE Específico (F45) - Alimentos - Levedura</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<p><b>Saccharomyces Cerevisiae, anti IgG e IgA (ASCA)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Interleucina 6</b></p>	<p>HMC 1</p>
<p><b>Leptospirose - IgG</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Metanefrinas Plasmáticas</b></p>	<p>HMC 1</p>
<p><b>MOG - Mielina Oligodendrocito Glicoproteína - Anticorpos Soro</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<b>Propeptídeo Procolágeno Tipo I - P1NP</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Proteína Relacionada ao Paratormônio, plasma</b>	HMC 1
<b>R337H - Analise de Mutação em TP53</b>	HMC 1
<b>Toxoplasmose - Anticorpos IgM Líquor</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>18 Hidroxicorticosterona</b>	HMC 1

<b>IgE Específico para Parvoalbumina (F355)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Anticorpos Totais COVID-19 (IgA e IgG)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>IgA para COVID-19</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Vancomicina</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Calymatobacterium granulomatis (donovanose) - pesquisa</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<p><b>Pesquisa de Mutações dos Genes PDGFR Alfa e C-Kit</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Antígeno Hepatite D (Delta)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>ÁCIDO 2-ETOXIACÉTICO</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Interleucina 1 Beta</b></p>	<p>HMC 1</p>
<p><b>CGH-ARRAY para Análise de Anomalias Cromossômicas 750K</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>



<b>Painel Ampliado para Autismo</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Sequenciamento Completo do Gene PMP22 por NGS</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Painel de Imunodeficiências Primárias Completo</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Charcot Marie-Tooth, Estudo por MLPA (PMP22 por MLPA)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Painel de Imunodeficiências e Doenças Imunológicas</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<p><b>Carnitina Livre</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Ige Específico para Lagosta Vermelha F80</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Ácido Tricloroacético</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>IGE Específico para Acarus Siro (D70)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Estudo Molecular Síndrome Ehlers-Danlos Tipo IV (COL3A1)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<p><b>Pesquisa de Deficiência Enzimática DPD - DPYD</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Doenças Sexualmente Transmissíveis, PCR - Urina</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Disfibrinogenemia pesquisa</b></p>	<p>HMC 1</p>
<p><b>Sequenciamento Completo do Gene TMRSS6</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Acetilcolina Anticorpo Modulador do Receptor</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<p><b>Pesquisa de ZAP 70 po Citometria de Fluxo</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Pcr para Mycobacterium Tuberculosis (Biópsia)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Painel de 5 Mutações para Deficiência de G6PD</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Ácido Homovanílico</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Anticorpos ANTI-HMG-COA Redutase</b></p>	<p>HMC 1</p>

<b>Basófilos</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Imunofluorescência Pele</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Imunofluorescência Renal</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Imunohistoquímica</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Imunohistoquímica Externa</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<p><b>Imunohistoquímica HMCC</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Imunohistoquímica de próstata</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Vitamina C</b></p>	<p>HMC 1</p>
<p><b>Citologia Oncotica - Líquidos</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Citologia Oncotica - Líquidos (SISMAMA)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<p><b>Citologia Oncotica - Líquidos (Externo)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Citologia Oncotica HMCC - Líquidos (SISMAMA)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Citologia Oncotica HMCC - Líquidos</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Cultura Para Micobactérias</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Exame Microscópico a Fresco</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã* Unidade Timóteo* Unidade Coronel Fabriciano*</p>

<p><b>- Fungos, Cultura para (Micoses Superficiais)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Haemophilus ducreyi - Pesquisa</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã* Unidade Timóteo* Unidade Coronel Fabriciano*</p>
<p><b>Pesquisa de Fungos - 1ª amostra</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã* Unidade Timóteo* Unidade Coronel Fabriciano*</p>
<p><b>Hemocultura Automatizada (2ª Amostra)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã* Unidade Timóteo* Unidade Coronel Fabriciano*</p>
<p><b>Hemocultura Automatizada (3ª Amostra)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã* Unidade Timóteo* Unidade Coronel Fabriciano*</p>



<b>Gardnerella vaginalis - Pesquisa</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã* Unidade Timóteo* Unidade Coronel Fabriciano*
<b>Bacterioscopia por Lâmina (Gram)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã* Unidade Timóteo* Unidade Coronel Fabriciano*
<b>Hemocultura Automatizada (1ª amostra)</b>	HMC 1 HMC 2
<b>BAAR Ziehl - Neelsen (1ª amostra)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Cultura de Urina</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<b>Anaeróbios, Cultura para</b>	HMC 1 HMC 2
<b>BAAR Ziehl - Neelsen (2ª amostra)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>BAAR Ziehl - Neelsen (3ª amostra)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>- BAAR Ziehl - Neelsen (7ª amostra)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>- BAAR Ziehl - Neelsen (8ª amostra)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<p align="center"><b>Cultura Para Fungos</b></p>	<p align="center">HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã* Unidade Timóteo* Unidade Coronel Fabriciano*</p>
<p align="center"><b>Chlamydia trachomatis - Pesquisa</b></p>	<p align="center">HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p align="center"><b>Pesquisa de Cryptococcus (Tinta da China)</b></p>	<p align="center">HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p align="center"><b>Neisseria gonorrhoeae - Pesquisa</b></p>	<p align="center">HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã* Unidade Timóteo* Unidade Coronel Fabriciano*</p>
<p align="center"><b>Bacilo diftérico (Corynebacterium diphtheriae) - Pesquisa</b></p>	<p align="center">HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<b>Paracoccidioides brasiliensis - Pesquisa</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Pesquisa de Fungos - 2ª amostra</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã* Unidade Timóteo* Unidade Coronel Fabriciano*
<b>Pesquisa de Fungos - 3ª amostra</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã* Unidade Timóteo* Unidade Coronel Fabriciano*
<b>Pesquisa de Fungos - 4ª amostra</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã* Unidade Timóteo* Unidade Coronel Fabriciano*
<b>Pesquisa de Fungos - 5ª amostra</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã* Unidade Timóteo* Unidade Coronel Fabriciano*

<p><b>Pesquisa de Fungos - 6ª amostra</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã* Unidade Timóteo* Unidade Coronel Fabriciano*</p>
<p><b>Pesquisa de Fungos - 7ª amostra</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã* Unidade Timóteo* Unidade Coronel Fabriciano*</p>
<p><b>BAARH - (Pesquisa de Hanseníase)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã* Unidade Timóteo* Unidade Coronel Fabriciano*</p>
<p><b>Pesquisa de Streptococcus Grupo B</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã* Unidade Timóteo* Unidade Coronel Fabriciano*</p>
<p><b>Corynebacterium minutissimum - Pesquisa</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<b>Cultura de Fezes</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Cultura de Ponta de Cateter</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Cultura de Secreção Traqueal</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Cultura de Líquor</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Cultura Bacteriana de Escarro</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<b>Cultura de Tecido Profundo</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Cultura de Líquido Pleural</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Cultura de Lavado Broncoalveolar</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Cultura de Secreção de Ferida e Abscesso</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Cultura de Secreção Vaginal/Endocervical</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã* Unidade Timóteo* Unidade Coronel Fabriciano*

<p><b>Cultura de Secreção Uretral</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã* Unidade Timóteo* Unidade Coronel Fabriciano*</p>
<p><b>Cultura de Tecido Ósseo</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Cultura de Secreção de Ouvido</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Cultura de Líquido Ascítico/Peritoneal</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Cultura de Implante Ortopédico e Próteses</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>



<b>Cultura de Secreção de Orofaringe/Nasofaringe</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Cultura de Líquido Sinovial</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Cultura Bacteriana de Raspado de Pele</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Cultura de Secreção Ocular</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Cultura de Esperma/Sêmen</b>	HMC 1

<p><b>Clostridioides difficile (Toxinas A e B)</b></p>	<p>HMC 1  HMC 2  Unidade Avançada – Canaã  Unidade Usifamilia - Canaã  Unidade Timóteo  Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Cultura de Líquido Amniótico</b></p>	<p>HMC 1  HMC 2  Unidade Avançada – Canaã  Unidade Usifamilia - Canaã  Unidade Timóteo  Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Painel Triagem Oncogenética - (XX) genes (especificar)</b></p>	<p>HMC 1  HMC 2  Unidade Avançada – Canaã  Unidade Usifamilia - Canaã  Unidade Timóteo  Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Painel Hereditário Mama e Ovário</b></p>	<p>HMC 1  HMC 2  Unidade Avançada – Canaã  Unidade Usifamilia - Canaã  Unidade Timóteo  Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Painel Hereditário Colorretal</b></p>	<p>HMC 1  HMC 2  Unidade Avançada – Canaã  Unidade Usifamilia - Canaã  Unidade Timóteo  Unidade Cononel Fabriciano</p>

<b>Painel Hereditário Próstata</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Painel Hereditário Pâncreas</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Painel Hereditário Gástrico</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Painel Hereditário Pulmão</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Painel Hereditário Adrenal</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<b>Painel Hereditário Glioma</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Painel Hereditário Endométrio</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Painel Hereditário Sarcomas</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Painel Hereditário Melanoma</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Painel Hereditário Síndrome de Carcinoma Poliposo Juvenil</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<p><b>Sequenciamento Completo de BRCA 1 e BRCA 2</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Sequenciamento NGS do Gene PTEN</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Citologia Oncotica - Punção</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Citologia Oncotica - Punção (SISMAMA)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>
<p><b>Citologia Oncotica - Punção (Externa)</b></p>	<p>HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano</p>

<b>Citologia Oncotica HMCC - Punção (SISMAMA)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Citologia Oncotica HMCC - Punção</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Revisão de Lâmina</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Revisão histopatológica</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Revisão citopatológica</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<b>Revisão de Lâmina - SUS</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Detecção Qualitativa de Coronavírus PCR-RT (COVID-19)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Dismorfismo Eritrocitário</b>	HMC 1
<b>Pesquisa de Espermatozóides na Urina</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano
<b>Urina Rotina (EAS)</b>	HMC 1 HMC 2 Unidade Avançada – Canaã Unidade Usifamilia - Canaã Unidade Timóteo Unidade Cononel Fabriciano

<b>Anti Xa, Atividade</b>	HMC 1
<b>Obs: Drive True não é realizado coleta de sangue em crianças abaixo de 2 anos.</b>	



## s - Vale do Aço

Data Revisão: 25/04/2023

ORIENTAÇÃO CLIENTE/RELACIONAMENTO COM CLIENTE	AGENDAMENTO OBRIGATÓRIO?
<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 4 horas. Amostra: Citrato congelado Anotar medicamentos em uso. Exame não realizado nas Unidades do Ideal, Canaã, Oncologia, Timóteo, Cel.fabriciano e coleta domiciliar.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Permitido realizar pela tabela do IPSM. Não consta no Rol da ANS verificar cobertura no plano.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Colher na primeira hora da manhã antes do horário de trabalho.</p>	<p>Não</p>

<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Não tem cobertura pelo plano. 1ª urina da manhã ou reter no mínimo 4 hs, colhida no laboratório.</p> <p>Coleta assistida por um técnico. Atenção! Preencher questionário. No caso de paciente menor de 18 anos, é necessário a assinatura do menor e do responsável.</p>	<p>Não</p>
<p>Coleta em papel filtro.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 4 horas. Atenção: a análise deste Exame já contempla as mutações C282Y, H63D e S65C. Não realizar marcação separada.</p> <p>Exame com diretriz de utilização, verificar cobertura no plano. Enviar Questionário e termo de consentimento para testes genéticos e cópia do pedido médico.</p>	<p>Não</p>

<p>Jejum não obrigatório. Não consta no Rol da ANS verificar cobertura no plano.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Obrigatório preencher questionário. Procedimento necessita de autorização do plano.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Exame consta no Rol de cobertura dos convênios, porém com diretrizes de utilização necessita de autorização. Preencher Questionario!</p>	<p>Não</p>
<p>Não consta no Rol de cobertura da ANS, verificar no plano.</p>	<p>Não</p>
<p>Permanência de 2 h em pé (parado ou andando) antes da coleta, ou conforme solicitação médica. Anotar se o cliente esta em uso de dieta hiposódica. Se solicitado em repouso, o cliente deverá permanecer em repouso absoluto por 30 minutos antes do exame. Jejum NÃO obrigatório Colher SOMENTE no periodo da manha (ate 10h) Informar medicamentos em uso.</p>	<p>Não</p>

<p>1ª urina da manhã ou reter no mínimo 4 h, colhida no laboratório. Recomenda-se ao paciente não consumir couveflor ou repolho pelo menos 1 semana antes da realização do exame.</p>	Não
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	Não
<p>Fezes recente sem conservante. Coletar e enviar no meio de transporte Cary Blair. <b>Importante</b> realizar a coleta antes de iniciar o tratamento com antibiótico.</p>	Não
<p>Não necessárioJejum.</p>	Não
<p>Jejum necessário de 12 horas. Para crianças, ficam estabelecidos os seguintes intervalos de jejum: Menores de 1 ano: Intervalo entre as mamadas (Jejum obrigatório de 3 horas) Crianças de 1 a 4 anos: 6 horas de jejum Crianças a partir de 5 anos: Igual critério para adultos Não consta no Rol de cobertura dos planos, código CBHPM: 40316580.</p>	Não

<p>Importante: Enviar cópia do pedido médico.  Enviar junto com a amostra: ** REQ05296 Termo de consentimento para Sequenciamento de nova geração exoma, painéis e gene único **.</p>	<p>Não</p>
<p>Não é necessário preparo para este exame  Não consta no Rol de cobertura.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas.☒  Não é permitida a coleta domiciliar.  Informar medicamentos em uso.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum 8 horas.  Não é permitida a coleta domiciliar.  Não consta no Rol de cobertura.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas.  Informar medicamentos em uso.  Não consta no Rol de cobertura. Não é permitida a coleta domiciliar (Amostra Congelada).</p>	<p>Não</p>

<p>Adultos: necessário Jejum obrigatório de 8 horas. Crianças: necessário um jejum mínimo de 3 horas Não é permitida a coleta domiciliar (Amostra Congelada). Não consta no Rol de cobertura.</p>		Não
<p>1ª urina da manhã ou reter no mínimo 4 hs, colhida no laboratório. pedido e questionar se é pré jornada ou pós.</p>	Conferir	Não
<p>Para coleta domiciliar, o laboratório só recolhe a amostra coletada pelo cliente.</p>		Não
<p>Mínimo de 04 horas de jejum. Anotar os medicamentos em uso Não é permitida a coleta domiciliar.</p>		Não
<p>Jejum não necessário.</p>		Não

<p>Exame não necessita de preparo.  À equipe de marcação: necessário solicitar guia e senha para convênio USISAUDE.  Não colher às 6ª feira, sábado ou véspera feriado.</p>	<p>Não</p>
<p>Exame não possui cobertura no rol da ANS verificar autorização.  É necessário solicitar kit, verificar no laboratório.  Obrigatório o envio da cópia dos Documentos de Identificação RG e CPF do doador da amostra.  Concurso (descrever qual o edital).</p>	<p>Não</p>
<p>Exame necessita de autorização do plano (com Diretriz de Utilização).  Não é necessário jejum.  Preencher questionário Testes Genéticos e Termo de Consentimento Testes Genéticos.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não necessário                      Exame refrigerado: estabilidade 7 dias</p>	<p>Não</p>
<p>Deve ser realizada antes da próxima dose do medicamento, ou a critério médico.  A dose de medicamento deve ser estável por pelo menos dois dias e não deve ter havido falha na tomada do mesmo.                      Estabilidade amostra: 7 dias</p>	<p>Não</p>

<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>
<p>Exame não consta no Rol da ANS, verificar cobertura no plano. Jejum não obrigatório. Estabilidade: 7 dias,</p>	<p>Não</p>
<p>Coletar urina. Estabilidade: 48 horas.</p> <p>Amostra refrigerada.</p>	<p>Não</p>
<p>A coleta das amostras devem ser feitas pela manhã O paciente deve estar em repouso por ao menos 30 minutos . Jejum NÃO obrigatório. Informar medicamentos em uso.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>



<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Procedimento não consta no Rol de cobertura da ANS.</p>	<p>Não</p>
<p>Líquor: procedimento coletado pelo médico.</p>	<p>Não</p>
<p>Exame exclusivo para marcação SESMT/Usiminas. Necessário cadastrar identidade e CPF no sistema. Não tem cobertura pelo plano. Necessário cópia da CNH NO MOMENTO DA MARACAÇÃO. Coleta até as 16h.</p>	<p>Sim</p>
<p>Jejum não necessário.</p>	<p>Não</p>

<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não necessário.</p>	<p>Não</p>
<p>Estabilidade : 24 horas. Procedimento não consta no rol da ANS, verificar no plano. Necessário coleta de urina de 24 hs, preparo:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pela manhã, ao acordar, esvaziar completamente a bexiga e desprezar a primeira urina.</li><li>2. A partir da segunda urin, colher todo volume durante o dia, a noite, e até a primeira urina do dia seguinte, quando completar 24 hs, juntandoas em um ou mais frascos limpos (retirar na recepção do laboratório).</li><li>3. Durante a coleta conservar a urina em geladeira.</li><li>4. Enviar a urina para o laboratório imediatamente após a última coleta.</li></ol>	<p>Não</p>
<p>(Amostra Congelada). Procedimento não consta no rol da ANS, verificar no plano. 1ª urina da manhã ou reter no mínimo 4 h, colhida no laboratório.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não necessário.</p>	<p>Não</p>

<p>Jejum não obrigatório.  Procedimento não consta no rol de cobertura da ANS verificar no plano.</p>	<p>Não</p>
<p>Procedimento possui DUT, necessita de autorização do plano.  realizada no material:  papel filtro sangue,</p> <p>Coleta</p>	<p>Não</p>
<p>Urina 24 horas.  Buscar orientação e frasco no laboratório.  Colher em frasco seco. Manter refrigerado.  Encaminhar paciente ao laboratório.</p>	<p>Não</p>
<p>Estar há no mínimo 2 horas sem urinar; -Realizar higienização da genitália Realizar coleta da urina em frasco estéril</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não necessário.</p>	<p>Não</p>

<p>Jejum não necessário. Procedimento Não consta no Rol de cobertura da ANS.</p>	<p>Não</p>
<p>Coletar 50,0 mL de urina somente no Laboratório. 1ª urina da manhã ou 4 horas de retenção urinária.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório; Termo de consentimento para Sequenciamento de nova geração exoma, painéis e gene único ** e cópia do pedido medico Procedimento com Diretriz de Utilização, necessário autorização do plano.</p> <p>Enviar junto com a amostra: * REQ05296</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas. Informar o uso de medicamentos e poli vitamínicos. Estabilidade: 7 dias</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Uso exclusivo para convênio IPSM. Necessita de autorização.</p>	<p>Não</p>

Jejum não necessário.	Não
<b>Jejum não obrigatório.</b>	Não
Urina 24 horas. Buscar orientação e frasco no laboratório. Encaminhar paciente ao laboratório.	Não
<b>Jejum não obrigatório.</b>	Não
Jejum não necessário. Colher sangue de preferência pela manhã. Anotar uso de medicamento, principalmente corticosteróide. Estabilidade: ate 3 dias refrigerado. prolongado. Não coletar vespera de feriado	Não

<p>Trazer junto com a amostra, copia do pedido medico, laudo do anatomo patologico. Material: bloco de parafina.</p>	<p>Não</p>
<p>Encaminhar junto com a amostra, copia do pedido medico, laudo do anatomo patologico. Material anatomo patológico incluído em bloco de parafina. Material:biopsia.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não necessário.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Procedimento não consta no rol de cobertura dos convênios.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não necessário. Procedimento não possui cobertura no rol da ANS.</p>	<p>Não</p>

<p>Não realizar higiene local (lesão genital). Não utilizar produto/medicamento tópico na área no dia do exame.</p> <p>Para homens, a coleta será realizada entre 7h e 15h de segunda a sexta (HMCI, HMCII e Ideal) ou entre 7h e 12h (Canaã); entre 7h e 11h aos sábados (HMCI, Canaã e Ideal) .</p> <p>Não marcar coleta domiciliar ou Oncologia.</p> <p>Não é permitida coleta íntima feminina na unidade do Canaã de segunda à sexta, no período da tarde.</p> <p>Não é permitida coleta íntima masculina de segunda à sexta, no período da tarde, na unidade de CORONEL FABRICIANO.</p> <p>Não é permitido coleta íntima masculina em TIMOTEO (agendar p Fabriciano pela manhã)</p>	<p>Não</p>
<p>Exame não necessita de preparo.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não necessário.</p> <p>Anotar os medicamentos em uso.</p>	<p>Não</p>
<p>Procedimento não consta no rol da ANS, verificar cobertura do plano.</p> <p>O paciente deve manter entre 2 a 7 dias de abstinência sexual antes da coleta.</p> <p>Colher apenas até 12:00 de segunda à sexta; coletas aos sábados até 11:00.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não necessário.</p> <p>Não consta no rol da ANS.</p>	<p>Não</p>

<p>Jejum não obrigatório. Verificar cobertura no plano, procedimento de alto custo.</p>	<p>Não</p>
<p>Exame não exige preparo Procedimento não consta no rol da ANS, verificar no plano. Exame realizado em sangue total colhido em papel filtro apropriado (papel filtro específico da Mayo). Solicitar ao Alvaro com antecedência (pelo menos 15 dias úteis).</p>	<p>Sim</p>
<p>Coleta em recém nascidos de até 90 dias.</p>	<p>Não</p>
<p>Coletar fezes em frasco estéril (volume de 10 gramas) e enviar amostra REFRIGERADA. Enviar as amostras em frasco estéril SEM CONSERVANTE. Coletar amostras de segunda-feira a quinta-feira até as 10h00.</p>	<p>Não</p>
<p>Procedimento não consta no rol da ANS, verificar cobertura no plano.</p>	<p>Não</p>



<p>Realizar o Signatera monitoramento com até 30 dias após a conclusão do Exame (Sequenciamento Exoma Tumoral Signatera código SIGN). A coleta deve ser realizada de segunda a quinta. NUNCA coletar na sexta-feira e véspera de feriado. Enviar a amostra com prioridade, logo após a coleta.</p>	<p>Sim</p>
<p>Jejum não obrigatório. Colher na primeira hora da manhã antes do horário de trabalho.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não necessário. Exame não consta no Rol da ANS.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não necessário; Procedimento não consta no rol da ANS;</p>	<p>Não</p>
<p>Exame com diretriz de utilização, necessita de autorização do convênio. Enviar cópia do pedido médico e do laudo de anatomopatológico.</p>	<p>Não</p>

<p>Jejum não obrigatório. Não consta no Rol de cobertura da ANS, verificar cobertura no plano.</p>	<p>Não</p>
<p>Urina 24h âmbar. Buscar frasco no laboratório. Encaminhar paciente ao laboratório.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Enviar bloco de parafina. É imprescindível envio do pedido médico. Verificar cobertura do plano.</p>	<p>Não</p>
<p>Não consta no Rol de cobertura da ANS. Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>

<p>Não coletar Domingo , Feriado e vésperas de Feriado. Sábado até 10 horas; Preconiza-se coleta entre a 14ª e a 16ª semana completa;</p>	<p>Sim</p>
<p>Procedimento não coberto pelo rol da ANS, verificar cobertura dos planos. Jejum obrigatório de 4 horas.</p>	<p>Não</p>
<p>Verificar cobertura do plano. Sugestão código código de custo variável 40503081 se autorizado através deste código será necessário incluílo na conta paciente para evitar cobrança indevida. * REQ05296 Termo de consentimento para Sequenciamento de nova geração exoma, painéis e gene único (devidamente preenchido e assinado) * Cópia pedido médico/relatório ou justificativa para realização do teste.</p>	<p>Não</p>
<p>Urina do final da jornada de trabalho.</p>	<p>Não</p>
<p>Urina pós jornada</p>	<p>Não</p>

<p>Coletar urina no final da jornada de trabalho.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 12 horas e informar os medicamentos utilizados. Procedimento não conta no rol da ANS, verificar cobertura no plano.</p>	<p>Não</p>
<p>Exame não necessita de preparo.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não necessário Verificar cobertura do plano.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não necessário. Enviar cópia do pedido médico. Preencher Questionário. Exame não consta no Rol da ANS.</p>	<p>Não</p>

<p style="text-align: center;"><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p style="text-align: center;">Não</p>
<p style="text-align: center;">Verificar cobertura do plano de Saúde <b>Deve ser informado a necessidade do laudo em Inglês no ato do agendamento</b></p>	<p style="text-align: center;">Sim</p>
<p style="text-align: center;">Somente Particular Não possui cobertura pelos planos de saúde Resultado de exames em até 30 minutos <b>NÃO É ACEITO EM TODAS COMPANHIAS AREAS</b> <b>Deve ser informado a necessidade do laudo em Inglês no ato do agendamento.</b> <b>Metodologia:RT-LAMP</b></p>	<p style="text-align: center;">Não</p>
<p style="text-align: center;">Necessário solicitar autorização do plano; Material aceito somente de seg. a quinta-feira. Para a realização deste exame é necessário: Envio da solicitação médica; Necessário cópia do laudo de anátomo patológico e imunohistoquímica; O preenchimento completo do questionário; Necessário cópias do RG e CPF do paciente;</p>	<p style="text-align: center;">Sim</p>
<p>Material: enviar lâminas de HE correspondentes (tumor fixado em bloco de parafina). Procedimento não consta no rol da ANS verificar cobertura no plano. Paciente tem que preencher e assinar o termo de testes genéticos somáticos.</p>	<p style="text-align: center;">Não</p>

<p>Material: enviar lâminas de HE correspondentes (tumor fixado em bloco de parafina). Enviar amostra em temperatura ambiente. Enviar junto com a amostra: REQ06922 TERMO DE CONSENTIMENTO PARA TESTES GENÉTICOS SOMÁTICOS Copia do pedido médico; Laudo do exame anatomopatológico e imunohistoquímico realizados previamente. Atenção: É imprescindível o envio dos documentos solicitados para a análise do exame.</p>	Não
<p>Encaminhar junto com a amostra, copia do pedido medico e laudo do anatomo patologico.</p>	Não
<p>Encaminhar junto com a amostra, copia do pedido medico e laudo do anatomo patologico.</p>	Não
<p>Não é necessário preparo para este exame.</p>	Não
<p>Não é necessário preparo para este exame.</p>	Não

Não é necessário preparo para este exame.	Não
Não é necessário preparo para este exame.	Não
Não é necessário preparo para este exame.	Não
Não é necessário preparo para este exame.	Não
Não é necessário preparo para este exame.	Não

Não é necessário preparo para este exame.	Não
Não é necessário preparo para este exame.	Não
Não é necessário preparo para este exame.	Não
Não é necessário preparo para este exame.	Não
Não é necessário preparo para este exame.	Não



<p>Não é necessário preparo para este exame.</p>	<p>Não</p>
<p>Não é necessário preparo para este exame.</p>	<p>Não</p>
<p>Não é necessário preparo para este exame.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório Informar medicamentos em uso.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório Informar medicamentos em uso.</p>	<p>Não</p>

<p>Jejum não obrigatório Informar medicamentos em uso.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório Informar medicamentos em uso.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas. Aos sábados marcar até as 9 horas Não é permitida a coleta domiciliar e oncologia. Permanecer no laboratório por 1 hs, em repouso. glicose em jejum.</p> <p>Marcar</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Informar medicamentos em uso.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Evitar exercício físico. Informar medicamentos em uso.</p>	<p>Não</p>

<p>Jejum não obrigatório. Não marcar junto com Proteínas Totais e Frações (PTF)</p>	<p>Não</p>
<p>Urina 24 horas. Colher em frasco bem limpo e seco. Manter refrigerado. Buscar orientação (impressa) e frasco no laboratório. Necessário coleta de urina durante 24 hs</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pela manhã, ao acordar, esvaziar completamente a bexiga e desprezar a primeira urina.</li><li>2. A partir da segunda urina, colher todo volume durante o dia, a noite, e até a primeira urina do dia seguinte, quando completar 24 hs, juntando as em um ou mais frascos limpos (retirar na recepção do laboratório).</li><li>3. Durante a coleta conservar a urina em geladeira.</li><li>4. Enviar a urina para o laboratório imediatamente após a última coleta.</li></ol>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Informar medicamentos em uso.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Informar medicamentos em uso.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Informar medicamentos em uso.</p>	<p>Não</p>

<p>Jejum obrigatório de 8 horas. Até 2 anos colher antes da próxima alimentação. Coleta pode ser realizada todos os dias, porém SOLICITAÇÃO DE URGENCIA SOMENTE COM SETOR EXECUTANTE: Ramal 9378 (exame processado no setor somente às 3ª e 6ª feiras).</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Informar medicamentos em uso.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Informar medicamentos em uso.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas. Informar medicamentos em uso.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Informar medicamentos em uso.☒</p>	<p>Não</p>

<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Informar medicamentos em uso.☒</p>	<p>Não</p>
<p>Necessário coleta de urina durante 24 hs. Colher em frasco bem limpo e seco. Manter refrigerado.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pela manhã, ao acordar, esvaziar completamente a bexiga e desprezar a primeira urina.</li><li>2. A partir da segunda urina, colher todo volume durante o dia, a noite, e até a primeira urina do dia seguinte, quando completar 24 hs, juntando assim um ou mais frascos limpos (retirar na recepção do laboratório).</li><li>3. Durante a coleta conservar a urina em geladeira.</li><li>4. Enviar a urina para o laboratório imediatamente após a última coleta.</li></ol>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Não marcar junto com Proteínas Totais e Frações (PTF).</p>	<p>Não</p>

<p>Jejum não obrigatório. Informar medicamentos em uso.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Informar medicamentos em uso.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Informar medicamentos em uso.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Informar medicamentos em uso.☒ Se solicitado Estrogênio, marcar ESTRIOL, ESTRADIOL e ESTRONA.</p> <p>Até 2 anos colher antes da próxima alimentação.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Informar medicamentos em uso.☒</p>	<p>Não</p>

<p>Jejum não obrigatório. Informar medicamentos em uso.☒</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Informar medicamentos em uso.☒ Jejum Desejável de 4h.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Informar medicamentos em uso.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Informar medicamentos em uso.☒</p>	<p>Não</p>

<p>Jejum não obrigatório. Informar medicamentos em uso.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Recomenda-se coletar ao final da Jornada de Trabalho.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas. Informar medicamentos em uso. Até 2 anos colher antes da próxima alimentação.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Informar medicamentos em uso.☒</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 12 a 14 horas. Opção sem Jejum usar a marcação Colesterol sem Jejum (CLTS). Evitar ingestão de bebidas alcoólicas na véspera. Informar medicamentos em uso.</p>	<p>Não</p>



<p>Jejum obrigatório de 8 horas. Informar medicamentos em uso.☒ Até 2 anos colher antes da próxima alimentação.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Informar medicamentos em uso.☒</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Informar medicamentos em uso.☒</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas. Informar medicamentos em uso.☒ Até 2 anos colher antes da próxima alimentação.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas. Informar medicamentos em uso.</p>	<p>Não</p>

<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas. Até 2 anos colher antes da próxima alimentação. Informar medicamentos em uso.</p>	<p>Não</p>
<p>Coleta deve ser realizado duas horas após o almoço.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum desejável de 8 horas. Informar medicamentos em uso.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas. Informar medicamentos em uso. Não marcar junto o exame albumina, o mesmo já é liberado como frações.</p>	<p>Não</p>

<p>COLETA DEVE SER AGENDADA SOMENTE ENTRE 7 E 8h</p> <p>Jejum não obrigatório</p> <p>Informar medicamentos em uso.</p> <p>Se mulher, informar uso de anticoncepcional.</p> <p>Não realizar no mesmo dia do "CORTD"</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas.</p> <p>Aos sábados: só pode marcar e colher até 07:30H.</p> <p>Colher somente na parte da manhã.</p> <p>Não marcar glicose em jejum.</p> <p>Jejum obrigatório de 8 horas.</p> <p>Deve ser coletada urina para execução do exame Glicosúria, junto com a curva glicêmica.</p> <p>Exame com duração de 3 horas no laboratório</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório</p> <p>Abstinência sexual de no mínimo 48 horas</p> <p>24 horas após ultrassom trans-retal</p> <p>48 horas após exercícios pesados em especial ciclismo</p> <p>o 4 semanas após biópsia ou massagem prostática</p> <p>2 dias após toque retal</p> <p>Informar medicamentos em uso</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.</p> <p>Informar medicamentos em uso.</p> <p>Evitar exercícios físicos.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas.</p>	<p>Não</p>

<p>Jejum não obrigatório. Informar medicamentos em uso.☒</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 12 a 14HS. Opção sem Jejum usar a marcação Colesterol sem Jejum (HDLS) Informar medicamentos em uso. Evitar exercício físico. Evitar ingestão de bebidas alcoólicas na véspera.</p>	<p>Não</p>
<p>Buscar orientação (impressa) e frasco no laboratório.                      Necessário coleta de urina durante 24 hs.                      Colher em frasco bem limpo e seco sem conservantes. Guardada no espaço interno da porta da geladeira, longe do congelador. Não marcar creatinina.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pela manhã, ao acordar, esvaziar completamente a bexiga e desprezar a primeira urina.</li><li>2. A partir da segunda urina, colher todo volume durante o dia, a noite, e até a primeira urina do dia seguinte, quando completar 24 hs, juntando assim um ou mais frascos limpos (retirar na recepção do laboratório).</li><li>3. Durante a coleta conservar a urina em geladeira.</li><li>4. Enviar a urina para o laboratório imediatamente após a última coleta.</li></ol>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Informar medicamentos em uso</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Informar medicamentos em uso.☒</p>	<p>Não</p>

<p>Jejum obrigatório de 12 a 14 horas. Evitar exercício físico. Evitar ingestão de bebidas alcoólicas na véspera.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Cliente menor de idade precisa estar acompanhado pelos pais ou maior responsável.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 12 a 14 horas. Opção sem Jejum usar a marcação Colesterol sem Jejum (LDLS) Só pode ser marcado junto com colesterol total, hdl e triglicérides na mesma prescrição. Se não estiver no pedido médico, deve ser acrescentado na marcação.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas. Informar medicamentos em uso. Até 2 anos colher antes da próxima alimentação.</p>	<p>Não</p>
<p>Urina de 24 horas. Colher em frasco bem limpo e seco. Guardada no espaço interno da porta da geladeira, longe do congelador. Buscar orientação (impresa) e frasco no laboratório.</p>	<p>Não</p>

<p>Jejum não obrigatório. Não consta no Rol de cobertura.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 12 a 14 horas.</p>	<p>Não</p>
<p>Informar medicamentos em uso. Evitar exercício Físico. Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>
<p>Urina de 24 horas. Colher em frasco bem limpo e seco. Guardada no espaço interno da porta da geladeira, longe do congelador. Buscar orientação (impressa) e frasco no laboratório.</p>	<p>Não</p>
<p>Se solicitado exame APÓS ESFORÇO, é necessário que o médico especifique a atividade e o tempo de realização.</p>	<p>Não</p>

<p>Jejum obrigatório de 8 horas ou conforme orientação médica, não ultrapassar 14 horas. Informar medicamentos em uso.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Informar medicamentos em uso.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum desejável de 8 horas. Informar medicamentos em uso.☐</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas. Aos sábados, atendimento até 08:30h. Exame com duração de 2 horas no laboratório Deve ser coletada urina para execução do exame Glicosúria, junto com a curva glicêmica.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Informar medicamentos em uso. Colher o sangue após o 6º dia de sintomas.</p>	<p>Não</p>

<p>O teste é realizado somente pela manhã de SEGUNDA a SEXTA.</p> <p>Paciente deverá manter dieta pobre em cálcio sete dias antes do teste: ALIMENTOS PERMITIDOS: café, chá, refrigerante, pão, bolacha água e sal, biscoitos, gelatinas, mel, geléia, açúcar, manteiga ou nata (até duas colheres de sopa ao dia), margarina, azeite, carne, aves ou peixe na quantidade de 220 gramas ao dia, batata, canjica, macarrão, arroz, sopa de verduras, frutas, verduras, pipoca, temperos, vinagre e sal. ALIMENTOS NÃO PERMITIDOS: bebidas achocolatadas, leite, preparados com leite, mingau de aveia, cereais integrais, leite condensado, creme de leite, maionese, mexilhões, ostra, camarão, queijo, arroz integral, feijão, sopa de ervilhas ou feijão, brócolis, repolho, aipo, couve, vagem, alface, lentilha, quiabo, salsa, nabo, ervilha, nozes e azeitonas.</p> <p>INSTRUÇÕES:      Às 21 horas do dia anterior ao exame: iniciar jejum e ingerir 200 ml de água filtrada. À</p>	<p>Sim</p>
<p>Urina 24 horas.          Buscar orientação e frasco no laboratório.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.          Informar medicamentos em uso.          Até 2 anos colher antes da próxima alimentação.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.          Informar medicamentos em uso.</p>	<p>Não</p>
<p>Ao iniciar a alimentação, marcar o horário, aguardar 1 hora, a partir do início da refeição e retornar para colher o exame (chegar ao laboratório 10 minutos antes da coleta).          Pode ingerir água neste período.          Se ingerir sobremesa, fazelo logo após alimentação.          A coleta deverá ser feita PREFERENCIALMENTE no mesmo dia da glicose em jejum.          Neste intervalo de 1 hora não poderá: chupar balas, mascar chicletes, tomar café, chá, suco, sorvete, etc.          O teste poderá ser colhido após qualquer refeição, de preferência uma refeição habitual do cliente.          Caso o médico oriente, seguir a orientação médica.</p>	<p>Não</p>



<p>Jejum obrigatório de, pelo menos, 8 horas.  Até 2 anos: colher antes da próxima alimentação.  A coleta deverá ser feita até 10h devido ao efeito circadiano.  Informar medicamentos em uso.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de pelo menos 8 horas.  Até 2 anos: colher antes da próxima alimentação</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de pelo menos 8 horas.  Até 2 anos: colher antes da próxima alimentação  Colher pela manhã.  Informar medicamentos em uso.</p>	<p>Não</p>
<p>Exame de ser colhido entre 07:00 e 09:00  Jejum obrigatório de 8 horas.  Ingerir o dexametasona às 23:00 no dia anterior da coleta do exame ou conforme orientação médica.  Se associado "CORT" realizar o "CORTD" no dia seguinte.  A Dexametasona é fornecida pelo laboratório do HMC no dia anterior à coleta do exame de "CORTD".</p>	<p>Não</p>
<p>COLETA DEVE SER REALIZADA NO HORÁRIO ESPECIFICADO PELO MÉDICO.  Jejum não obrigatório.  Informar medicamentos em uso.  Se mulher, informar uso de anticoncepcional.  NÃO realizar no mesmo dia do "CORTISOL APÓS DEXAMETASONA"</p>	<p>Não</p>

<p>Jejum obrigatório de 8 horas. Informar medicamentos em uso.</p>	<p>Não</p>
<p>AO iniciar a alimentação, marcar o horário, aguardar 2 horas, a partir do início da refeição e retornar para colher o exame (chegar ao laboratório 10 minutos antes da coleta). Podese ingerir água neste período. Se ingerir sobremesa, fazelo logo após alimentação. A coleta deverá ser feita no mesmo dia da insulina em jejum (se houver). Neste intervalo de 2 horas não poderá: chupar balas, mascar chicletes, tomar cafe, chá, suco, sorvete, etc. O teste poderá ser colhido após qualquer refeição, de preferência uma refeição habitual do cliente.</p>	<p>Não</p>
<p>Urina 24 horas. Colher em recipiente contendo HCl 50% 10mL/L. A amostra deverá ser refrigerada. Buscar orientação e frasco no laboratório.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum desejável de 8 horas. Necessário solicitar autorização para convênio Fundo de Saúde.</p>	<p>Não</p>
<p>Coleta aos sábados até as 09h05 minutos (nas unidades descentralizadas, até às 08:30h). Permanecer no laboratório por 2 hs, em repouso. Jejum obrigatório de 8 horas. Marcar glicose em jejum. Para gestantes, marcar também a glicemia 1h após dextrosol.</p>	<p>Sim</p>

<p>Jejum obrigatório de 8 horas ou conforme orientação médica</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.</p> <p>Recomenda-se coletar material ao final da jornada de trabalho. Evitar colher na primeira jornada de trabalho da semana.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas. Exames não realizados aos sábados</p> <p>Deve ser coletada urina para execução do exame Glicosúria, junto com a curva glicêmica. Exame com duração de 5 horas no laboratório.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas. Aos sábados só pode marcar o horário de 07:00h. Não marcar glicose em jejum. Jejum obrigatório de 8 horas. Aos sábados: só pode marcar e colher até 07:30H. Colher somente na parte da manhã.</p> <p>Deve ser coletada urina para execução do exame Glicosúria, junto com a curva glicêmica. Urina deve estar retida por 4 horas. Exame com duração de 4 horas no laboratório.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas. Aos sábados coleta até as 07:00h.</p>	<p>Não</p>

<p>Buscar orientação (impressa) e frasco no laboratório.                      Necessário coleta de urina durante 24 hs.                      Colher em frasco bem limpo e seco sem conservantes. Guardada no espaço interno da porta da geladeira, longe do congelador. Não marcar creatinina.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pela manhã, ao acordar, esvaziar completamente a bexiga e desprezar a primeira urina.</li> <li>2. A partir da segunda urina, colher todo volume durante o dia, a noite, e até a primeira urina do dia seguinte, quando completar 24 hs, juntando assim um ou mais frascos limpos (retirar na recepção do laboratório).</li> <li>3. Durante a coleta conservar a urina em geladeira.</li> <li>4. Enviar a urina para o laboratório imediatamente após a última coleta.</li> </ol>	<p>Não</p>
<p style="text-align: center;"><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p style="text-align: center;">Não</p>
<p style="text-align: center;">Jejum não obrigatório Necessário solicitar autorização prévia quando o convênio do paciente for Fundo Saúde Sistema Usiminas.</p>	<p style="text-align: center;">Não</p>
<p style="text-align: center;">1ª urina da manhã ou reter no mínimo 4 horas( Urina recente).</p>	<p style="text-align: center;">Não</p>
<p style="text-align: center;">Jejum obrigatório de 8 horas. Atenção! Preencher questionário. Colher dentro de 1 hora antes da medicação. Para plano USISAÚDE, é necessário solicitar autorização.</p>	<p style="text-align: center;">Não</p>

<p>Jejum não obrigatório</p> <p>Abstinência sexual de no mínimo 48 horas</p> <p>24 horas após ultrassom trans-retal</p> <p>48 horas após exercícios pesados em especial ciclismo</p> <p>4 semanas após biópsia ou massagem prostática</p> <p>2 dias após toque retal</p> <p>Informar medicamentos em uso</p>	<p>Não</p>
<p>Necessário preencher o TERMO DE CONSENTIMENTO.</p> <p>Jejum para crianças menores de 3 anos: intervalo entre as mamadas</p> <p>Jejum para crianças de 3 a 5 anos: 4 horas</p> <p>Jejum para crianças a partir de 6 anos e adultos: 8 horas</p> <p>Preferencialmente não usar laxantes e diuréticos.</p> <p>Evitar bebidas alcoólicas nas 48 horas antes do exame.</p> <p>O tempo de realização do exame será no mínimo de 1 hora.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas.</p> <p>Para crianças aceitase Jejum obrigatório de 4 horas.</p> <p>Preferencialmente não usar laxantes e diuréticos.</p> <p>Evitar bebidas alcoólicas nas 48 horas antes do exame.</p> <p>O tempo de realização do exame será no mínimo de 1 hora.</p>	<p>Sim</p>
<p>OBRIGATÓRIO constar no pedido os exames Glicemia (GLI) e Insulina (INSU) juntamente com o HOMA.</p>	<p>Não</p>
<p>1ª urina da manhã ou reter no mínimo 4 horas( Urina recente).</p>	<p>Não</p>

<p>1ª urina da manhã ou reter no mínimo 4 horas( Urina recente).</p>	<p>Não</p>
<p>Urina 24 horas. Colher a urina em frasco contendo ácido acético 8M 20mL/L. Esta deve ser refrigerada e protegida da luz. Buscar orientação (impressa) e frasco no laboratório.</p>	<p>Não</p>
<p>Urina 24 horas. Colher em frasco com conservante HCL 50%. Refrigerar. Buscar orientação (impressa) e frasco no laboratório.</p>	<p>Não</p>
<p>1ª urina da manhã ou reter no mínimo 4 horas (Urina recente).</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>

<p>Jejum não obrigatório. Informar medicamentos em uso.</p>	<p>Não</p>
<p>Para agenda Domiciliar, agendar no ultimo horario da rota para levar amostra ao laboratorio para processamento. Se solicitado exame APÓS ESFORÇO, é necessário que o médico especifique a atividade e o tempo de realização.</p>	<p>Não</p>
<p>Urina 24 horas. Colher em recipiente contendo HCl 50% 20mL/L. A amostra deverá ser refrigerada. Buscar orientação e frasco no laboratório.</p>	<p>Não</p>
<p>Urina 24 horas. Colher em frasco bem limpo e seco (sem conservante). Manter refrigerado. Buscar orientação (impressa) e frasco no laboratório. Necessário coleta de urina de 24 hs 1. Pela manhã, ao acordar, esvaziar completamente a bexiga e desprezar a primeira urina. 2. A partir da segunda urin, colher todo volume durante o dia, a noite, e até a primeira urina do dia seguinte, quando completar 24 hs, juntandoas em um ou mais frascos limpos (retirar na recepção do laboratório). 3. Durante a coleta conservar a urina em geladeira. 4. Enviar a urina para o laboratório imediatamente após a última coleta.</p>	<p>Não</p>
<p>1ª urina da manhã ou reter no mínimo 4 horas (Urina recente).</p>	<p>Não</p>

<p>Aos sábados: só pode marcar até 07:30H.          Colher somente na parte da manhã.          Entregar preparo para o paciente.          Verificar se as curvas foram desmembradas corretamente, se não desmembrarem, marcar em prescrição separada da Curva Glicêmica.</p>	<p>Não</p>
<p>Necessário coleta de urina de 24 hs. Colher em frasco bem limpo e seco (sem conservante). Manter refrigerado.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pela manhã, ao acordar, esvaziar completamente a bexiga e desprezar a primeira urina.</li> <li>2. A partir da segunda urin, colher todo volume durante o dia, a noite, e até a primeira urina do dia seguinte, quando completar 24 hs, juntandoas em um ou mais frascos limpos (retirar na recepção do laboratório).</li> <li>3. Durante a coleta conservar a urina em geladeira.</li> <li>4. Enviar a urina para o laboratório imediatamente após a última coleta.</li> </ol>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. <span style="float: right;">Necessária informação de peso do paciente.</span>          Necessário autorização do convênio: pegar guia e senha.</p>	<p>Não</p>
<p style="text-align: center;"><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p style="text-align: center;">Jejum obrigatório de 4 horas.          Informar medicamentos em uso.☒          Se mulher, informar uso de anticoncepcional.          Se mulher, Informar se está grávida.</p>	<p>Não</p>



<p>Informar medicamentos em uso.☒ Jejum não obrigatório. Exame sem cobertura pelo SUS. Exame consta no rol da ANS, solicitar autorização do plano.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório Informar medicamentos em uso.☒</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 4 horas ou conforme orientação médica. Informar data e hora da coleta, medicamentos em uso, dosagem, dia e hora da última administração do medicamento. A coleta ideal deve ser realizada imediatamente antes da administração da próxima dose do medicamento ou conforme orientação médica.</p>	<p>Não</p>

<p>Agendamento exclusiva para coleta sem jejum. Evitar ingestão de bebidas alcoólicas na véspera. Informar medicamentos em uso.</p>	<p>Não</p>
<p>Coleta exclusiva para coleta sem jejum. Evitar exercício físico. Evitar ingestão de bebidas alcoólicas na véspera. Informar medicamentos em uso.</p>	<p>Não</p>
<p>Coleta exclusiva para coleta sem jejum.</p>	<p>Não</p>
<p>Marcação exclusiva para coleta sem jejum.</p>	<p>Não</p>
<p>Marcação exclusiva para coleta sem jejum. Evitar exercício físico. Evitar ingestão de bebidas alcoólicas na véspera.</p>	<p>Não</p>

<p>Jejum obrigatório de 8 horas.          Urina de 24 horas.          Buscar orientação impressa e frasco no laboratório.</p>	<p>Não</p>
<p>1ª urina da manhã ou reter no mínimo 4 horas( Urina recente).</p>	<p>Não</p>
<p>Ao iniciar a alimentação, marcar o horário, aguardar 2 horas, a partir do início da refeição e retornar para colher o exame (chegar ao laboratório 10 minutos antes da coleta).          Pode ingerir água neste período.          Se ingerir sobremesa, fazelo logo após alimentação.          A coleta deverá ser feita PREFERENCIALMENTE no mesmo dia da glicose em jejum.          Neste intervalo de 2 horas não poderá: chupar balas, mascar chicletes, tomar café, chá, suco, sorvete, etc.          Caso o médico oriente, seguir a orientação médica.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 12 a 14 horas.          Evitar exercício físico.          Evitar ingestão de bebidas alcoólicas na véspera.          Informar medicamentos em uso.</p>	<p>Não</p>
<p>Exame exclusivo para internação</p>	<p>Sim</p>

<p>Coleta deve ocorrer entre 07:00 e 10:00 Jejum obrigatório de 8 horas.</p> <p>. Administrar um comprimido de 0,5 mg de dexametasona de 6 em 6 horas durante 48 horas (total 8 comprimidos). A primeira dose deve ser às 8 horas da manhã do primeiro dia e a última dose às 2 horas da manhã do terceiro dia, 6 horas antes da coleta ou conforme orientação médica.</p> <p>Se tiver "CORT" realizar o "CORTDE" no dia seguinte.</p> <p>A Dexametasona é fornecida pelo laboratório do HMC no dia anterior à coleta do exame de "CORTDE".</p>	<p>Não</p>
<p>Informar medicamentos em uso.☒ Jejum não obrigatório. A Diluição a ser realizada é 1:100.</p>	<p>Não</p>
<p>1ª urina da manhã ou reter no mínimo 4 horas( Urina recente).</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório Exame não consta no rol de cobertura, verificar autorização nos planos</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>

<p style="text-align: center;"><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p style="text-align: center;">Não</p>
<p style="text-align: center;"><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p style="text-align: center;">Não</p>
<p>FINALIDADE DO EXAME: pesquisar a produção de anticorpos IgG e IGM contra o Coronavírus 2019.  Jejum não obrigatório.  Coleta deve ser feita a partir de 10 dias de início de sintomas ou por pessoas que tiveram contato com caso suspeito/positivo e não desenvolveram sintomas.  Não consta no Rol da ANS.  Teste pode ser executado em quaisquer das unidades de laboratórios pertencentes ao HMC.  Não é permitida coleta domiciliar.</p>	<p style="text-align: center;">Não</p>
<p style="text-align: center;"><b>Jejum não obrigatório.</b></p> <p>Coleta deve ser feita entre o terceiro e o quinto dia após início de sintomas.</p>	<p style="text-align: center;">Não</p>
<p>Procedimento não possui cobertura no rol da ANS.                      Suspensão em 17/07.</p>	<p style="text-align: center;">Não</p>

<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Informar medicamentos em uso.☒</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 4h. Informar medicamentos em uso. Paciente deverá ficar em repouso por 30 minutos. Duração total do exame: aproximadamente 60 minutos.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Informar medicamentos em uso.☒</p>	<p>Não</p>

<p>Jejum não obrigatório. Exame possui DUT, necessita autorização do plano, exceto PM.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Informar medicamentos em uso.☒ Apresentar documento de identificação com foto.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas. Até 2 anos: colher antes da próxima alimentação. Necessário solicitar autorização para convênio Fundo de Saúde.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas. ATÉ 2 ANOS COLHER ANTES DA PRÓXIMA ALIMENTAÇÃO</p>	<p>Não</p>

<p>Jejum não obrigatório. Informar medicamentos em uso. Evitar exercício Físico.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Evitar exercício físico.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Evitar exercícios físicos.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Informar medicamentos em uso.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas ou conforme orientação médica, não ultrapassar 14 horas. Informar medicamentos em uso. Coleta domiciliar com Glicemia pós prandial, agendar apenas 2ª, 4ª e 6ª.</p>	<p>Não</p>



Jejum não obrigatório.	Não
Jejum não obrigatório.	Não
Jejum não obrigatório.	Não
Jejum não obrigatório.	Não
Jejum não obrigatório.	Não

<b>Jejum não obrigatório.</b>	Não
<b>Jejum não obrigatório.</b>	Não
jejum não obrigatório Informar medicamentos em uso.	Não
<b>Jejum não obrigatório.</b>	Não
<b>Jejum não obrigatório.</b>	Não

Jejum não obrigatório.	Não
Jejum não obrigatório.	Não
Jejum não obrigatório.	Não
Exclusivo internação	Não
Jejum não obrigatório.	Não

<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Não é necessário preparo para este exame</p>	<p>Não</p>
<p>Não é necessário preparo para este exame</p>	<p>Não</p>
<p>Não é necessário preparo para este exame</p>	<p>Não</p>
<p>Código para exclusiva marcação de citologia cérvico vaginal para municípios de Açucena, Braúnas, Bugre, Iapu, Joanésia, Mesquita, Naque e Periquito (atendimento SUS).</p>	<p>Não</p>

Jejum não obrigatório.	Não
Jejum não obrigatório.	Não
Não é necessário preparo para este exame	Não
Exclusivo internação	Não
Exclusivo internação	Não

Exclusivo internação	Não
Coletar preferencialmente em frasco Coproplus (MIF): entregar em até 5 dias após a coleta. Outras opções, se cliente trazer em frasco adquirido fora do Laboratório: Amostra sem conservante, se mantida na geladeira: entregar em até 24h. Amostra à temperatura ambiente: entregar até 2h após coleta.	Não
Coletar preferencialmente em frasco Coproplus (MIF): entregar em até 5 dias após a coleta. Outras opções, se cliente trazer em frasco adquirido fora do Laboratório: Amostra sem conservante, se mantida na geladeira: entregar em até 24h. Amostra à temperatura ambiente: entregar até 2h após coleta.	Não
Coletar preferencialmente em frasco Coproplus (MIF): entregar em até 5 dias após a coleta. Outras opções, se cliente trazer em frasco adquirido fora do Laboratório: Amostra sem conservante, se mantida na geladeira: entregar em até 24h. Amostra à temperatura ambiente: entregar até 2h após coleta.	Não
2 amostras de dias diferentes no mesmo pote. Frasco Coproplus (MIF) fornecido pelo laboratório. Estabilidade: até 5 dias após a coleta.	Não

<p>3 amostras de dias diferentes no mesmo pote. Frasco Coproplus (MIF) fornecido pelo laboratório. Estabilidade: até 5 dias após a coleta.</p>	Não
<p>Fezes recente, sem conservante. Aceitável até 24 horas se refrigerado entre 2 a 8 °C. À temperatura ambiente até 2 horas após a coleta. Frasco próprio, fornecido pelo laboratório ou adquirido pelo cliente. Amostra não deve ser coletada no período menstrual (aguardar pelo menos 48h após o término do fluxo sanguíneo).</p>	Não
<p>Fezes recente, sem conservante. Frasco próprio fornecido pelo laboratório ou adquiridos em farmácias e drogarias. A amostra pode ser entregue ao laboratório em até 4 horas após a coleta ou no dia seguinte se mantida refrigerada.</p>	Não
<p>Não usar nenhum medicamento no local. Vir ao laboratório antes de defecar ou tomar banho (não fazer higiene). O ideal é que a coleta seja feita no período em que o sintoma de coceira aparece ou a critério médico.</p>	Não
<p>Fezes recente, sem conservante. Após a coleta: entregar a amostra em até 4 horas em temperatura ambiente ou 24 horas se refrigerada. Frasco próprio fornecido pelo laboratório.</p>	Não

<p>Fezes recente, sem conservante: até 8 horas em temperatura ambiente, ou até 24 horas se refrigerado. Frasco próprio fornecido pelo laboratório ou adquirido pelo cliente.</p>	Não
<p>Procedimento não possui cobertura pelo plano. Fezes recente, sem conservante: até 8 horas em temperatura ambiente, ou até 24 horas se refrigerado. Frasco próprio fornecido pelo laboratório.</p>	Não
<p>Jejum não necessário.</p>	Não
<p>Marcação exclusiva para exames terceirizados do CTRS. Para marcação de paciente externo e internado: CITOP.</p>	Não
<p>Jejum não obrigatório. ATENÇÃO: Para paciente SUS a faixa etária permitida é de 19 a 130 anos. As amostras não devem ser colhidas em pacientes em tratamento com doses elevadas de biotina (i.e. &gt; 5 mg/dia) até no mínimo 8 horas após a última administração de biotina.</p>	Não



<p>Jejum não obrigatório. Informar medicamentos em uso. Informar se já fez este exame anteriormente.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Colher na primeira hora da manhã antes do horário de trabalho.</p>	<p>Não</p>
<p>O paciente deve ingerir leite de três a quatro horas antes da coleta do material biológico. Procedimento não consta no rol da ANS</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>
<p>De segunda à sexta colher até 12:00; Coletas aos sábados até 11:00. Abstinência sexual de 2 a 5 dias.</p>	<p>Não</p>

<p>Recém nascidos com mínimo de 2 kg e crianças até 60 dias de vida de idade.</p> <p>Agendamento somente de segunda a quinta-feira até as 10h. Não há coleta às 6ª feira, sábado ou véspera feriado.</p> <p>Obs: Após agendamento atendente necessita comunicar ao laboratório por email para solicitar logística.</p> <p>Deve-se enviar o agendamento aos emails: eliene.oliveira@fsfx.com.br edna.martins@fsfx.com.br labhmc@fsfx.com.br</p>	<p>Sim</p>
<p>Uma 24 horas (Frasco Ambar com bicarbonato de sódio).</p> <p>As amostras não podem ser entregues às 6ª feira, sábado ou véspera feriado. Buscar orientação e frasco no laboratório. Anotar medicamento(s) do(s) último(s): 7 dias(s).</p> <p>Agendamento somente de segunda a quinta-feira até as 10h. Não há coleta às 6ª feira, sábado ou véspera feriado.</p> <p>Obs: Após agendamento atendente necessita comunicar ao laboratório por email para solicitar logística.</p> <p>Deve-se enviar o agendamento aos emails: eliene.oliveira@fsfx.com.br edna.martins@fsfx.com.br</p>	<p>Sim</p>
<p>Uma 24 horas (Frasco Ambar com bicarbonato de sódio).</p> <p>Coleta permitida somente até as 10:00 horas. Informar medicamentos em uso. Não colher às 6ª feira, sábado ou véspera feriado.</p> <p>Agendamento somente de segunda a quinta-feira até as 10h. Não há coleta às 6ª feira, sábado ou véspera feriado.</p> <p>Obs: Após agendamento atendente necessita comunicar ao laboratório por email para solicitar logística.</p> <p>Deve-se enviar o agendamento aos emails: eliene.oliveira@fsfx.com.br edna.martins@fsfx.com.br</p>	<p>Sim</p>
<p>Uma 24 horas (Frasco Ambar com bicarbonato de sódio).</p> <p>Coleta permitida somente até as 10:00 horas. Procedimento não consta no rol de cobertura da ANS, verificar no plano. Código de referencia na CBHPM 40319210.</p> <p>Agendamento somente de segunda a quinta-feira até as 10h. Não há coleta às 6ª feira, sábado ou véspera feriado.</p> <p>Obs: Após agendamento atendente necessita comunicar ao laboratório por email para solicitar logística.</p> <p>Deve-se enviar o agendamento aos emails: eliene.oliveira@fsfx.com.br edna.martins@fsfx.com.br</p>	<p>Sim</p>
<p>Uma 24 horas (Frasco Ambar com bicarbonato de sódio).</p> <p>Necessário solicitar guia e senha de autorização (Convênioênios) Não poderá ser colhido às 6ª feira, sábado ou véspera feriado. A coleta deve ser realizada até 10 horas. Anotar medicamento(s) utilizados no(s) último(s): 7 dias(s).</p> <p>Agendamento somente de segunda a quinta-feira até as 10h. Não há coleta às 6ª feira, sábado ou véspera feriado.</p> <p>Obs: Após agendamento atendente necessita comunicar ao laboratório por email para solicitar logística.</p> <p>Deve-se enviar o agendamento aos emails: eliene.oliveira@fsfx.com.br edna.martins@fsfx.com.br</p>	<p>Sim</p>

<p>Material comido pelo médico. Coleta permitida somente até as 10:00 horas. Não colher às 6ª feira, sábado ou véspera feriado.</p> <p>Agendamento somente de segunda a quinta-feira até as 10h. Não há coleta às 6ª feira, sábado ou véspera feriado.</p> <p>Obs: Após agendamento atendente necessita comunicar ao laboratório por email para solicitar logística.</p> <p>Deve-se enviar o agendamento aos emails: eliene.oliveira@fsfx.com.br edna.martins@fsfx.com.br labhmc@fsfx.com.br</p>	<p>Sim</p>
<p>Jejum não obrigatório. Não consta no Rol de cobertura da ANS. Não colher às 6ª feira, sábado ou véspera feriado.</p> <p>Agendamento somente de segunda a quinta-feira até as 10h. Não há coleta às 6ª feira, sábado ou véspera feriado.</p> <p>Obs: Após agendamento atendente necessita comunicar ao laboratório por email para solicitar logística.</p> <p>Deve-se enviar o agendamento aos emails: eliene.oliveira@fsfx.com.br edna.martins@fsfx.com.br labhmc@fsfx.com.br</p>	<p>Sim</p>
<p>Jejum não obrigatório. Coleta permitida somente até as 10:00 horas. Não colher às 6ª feira, sábado ou véspera feriado. Informar medicamentos em uso.</p> <p>Agendamento somente de segunda a quinta-feira até as 10h. Não há coleta às 6ª feira, sábado ou véspera feriado.</p> <p>Obs: Após agendamento atendente necessita comunicar ao laboratório por email para solicitar logística.</p> <p>Deve-se enviar o agendamento aos emails: eliene.oliveira@fsfx.com.br edna.martins@fsfx.com.br labhmc@fsfx.com.br</p>	<p>Sim</p>
<p>Jejum não obrigatório. Não consta no Rol da ANS verificar cobertura no plano. Coleta até as 10:00 horas.</p> <p>Agendamento somente de segunda a quinta-feira até as 10h. Não há coleta às 6ª feira, sábado ou véspera feriado.</p> <p>Obs: Após agendamento atendente necessita comunicar ao laboratório por email para solicitar logística.</p> <p>Deve-se enviar o agendamento aos emails: eliene.oliveira@fsfx.com.br edna.martins@fsfx.com.br labhmc@fsfx.com.br</p>	<p>Sim</p>
<p>Jejum não obrigatório. Não colher às 6ª feira, sábado ou véspera feriado. Colher ate as 10:00 horas de segunda a quinta feira.</p> <p>Agendamento somente de segunda a quinta-feira até as 10h. Não há coleta às 6ª feira, sábado ou véspera feriado.</p> <p>Obs: Após agendamento atendente necessita comunicar ao laboratório por email para solicitar logística.</p> <p>Deve-se enviar o agendamento aos emails: eliene.oliveira@fsfx.com.br edna.martins@fsfx.com.br labhmc@fsfx.com.br</p>	<p>Sim</p>

<p>Jejum não obrigatório. Exame realizado apenas particular. Não colher às 6ª feira, sábado ou véspera feriado. Obrigatório o preenchimento do questionário de Teste de Histocompatibilidade. Não cobrar taxa de envio, já inserido no valor do exame.</p> <p>Agendamento somente de segunda a quinta-feira até as 10h. Não há coleta às 6ª feira, sábado ou véspera feriado. Obs: Após agendamento atendente necessita comunicar ao laboratório por email para solicitar logística. Deve-se enviar o agendamento aos emails: eliene.oliveira@fsfx.com.br</p>	<p>Sim</p>
<p>Jejum não obrigatório. Preencher questionário! Não colher às 6ª feira, sábado ou véspera feriado. Colher ate as 10:00 horas de segunda a quinta feira. Solicitar autorização do plano. Se o transplante for de medula óssea utilizar o código 40403777.</p> <p>Agendamento somente de segunda a quinta-feira até as 10h. Não há coleta às 6ª feira, sábado ou véspera feriado. Obs: Após agendamento atendente necessita comunicar ao laboratório por email para solicitar logística. Deve-se enviar o agendamento aos emails:</p>	<p>Sim</p>
<p>Preencher Questionário! Não colher às 6ª feira, sábado ou véspera feriado. A coleta deve ser realizada até 11 horas. Anotar medicamento(s) do(s) último(s): 7 dias(s).</p> <p>Agendamento somente de segunda a quinta-feira até as 10h. Não há coleta às 6ª feira, sábado ou véspera feriado. Obs: Após agendamento atendente necessita comunicar ao laboratório por email para solicitar logística. Deve-se enviar o agendamento aos emails: eliene.oliveira@fsfx.com.br adna.martins@fsfx.com.br</p>	<p>Sim</p>
<p>verificar cobertura do plano, exame com diretrizes de utilização. Coleta até as 10:00 horas. Preencher Questionário! Jejum não obrigatório. Não colher às 6ª feira, sábado ou véspera feriado.</p> <p>Agendamento somente de segunda a quinta-feira até as 10h. Não há coleta às 6ª feira, sábado ou véspera feriado. Obs: Após agendamento atendente necessita comunicar ao laboratório por email para solicitar logística. Deve-se enviar o agendamento aos emails: eliene.oliveira@fsfx.com.br adna.martins@fsfx.com.br</p>	<p>Sim</p>
<p>Jejum não obrigatório. Não consta no Rol de cobertura da ANS. Colher preferencialmente pela manhã. Não colher às 6ª feira, sábado ou véspera feriado. Atenção! Preencher questionário.</p> <p>Colher ate as 10:00 horas de segunda a quinta feira. Agendamento somente de segunda a quinta-feira até as 10h. Não há coleta às 6ª feira, sábado ou véspera feriado. Obs: Após agendamento atendente necessita comunicar ao laboratório por email para solicitar logística.</p>	<p>Sim</p>

<p>verificar cobertura do plano, exame com diretrizes de utilização. Jejum não obrigatório. Não colher às 6ª feira, sábado ou véspera feriado. Colher até as 10:00 horas de segunda a quinta-feira.</p> <p>Agendamento somente de segunda a quinta-feira até as 10h. Não há coleta às 6ª feira, sábado ou véspera feriado. Obs: Após agendamento atendente necessita comunicar ao laboratório por email para solicitar logística. Deve-se enviar o agendamento aos emails: eliene.oliveira@fsfx.com.br edna.martins@fsfx.com.br labhmc@fsfx.com.br</p>	<p>Sim</p>
<p>Não consta no Rol da ANS verificar cobertura no plano. Não colher às 6ª feira, sábado ou véspera feriado.</p> <p>Agendamento somente de segunda a quinta-feira até as 10h. Não há coleta às 6ª feira, sábado ou véspera feriado. Obs: Após agendamento atendente necessita comunicar ao laboratório por email para solicitar logística. Deve-se enviar o agendamento aos emails: eliene.oliveira@fsfx.com.br edna.martins@fsfx.com.br labhmc@fsfx.com.br</p>	<p>Sim</p>
<p>Não colher às 6ª feira, sábado ou véspera feriado. Atenção! Preencher questionário.</p> <p>Agendamento somente de segunda a quinta-feira até as 10h. Não há coleta às 6ª feira, sábado ou véspera feriado. Obs: Após agendamento atendente necessita comunicar ao laboratório por email para solicitar logística. Deve-se enviar o agendamento aos emails: eliene.oliveira@fsfx.com.br edna.martins@fsfx.com.br labhmc@fsfx.com.br</p>	<p>Sim</p>
<p>Coleta até as 10:00 horas. As amostras não podem ser entregues às 6ª feira, sábado ou véspera feriado. Exame não consta no Rol de cobertura dos Convênios. Este exame pode ser realizado em amostra de urina isolada, de 24 horas ou de outro período cronometrado, conforme solicitação médica.</p> <p>Agendamento somente de segunda a quinta-feira até as 10h. Não há coleta às 6ª feira, sábado ou véspera feriado. Obs: Após agendamento atendente necessita comunicar ao laboratório por email para solicitar logística. Deve-se enviar o agendamento aos emails: eliene.oliveira@fsfx.com.br edna.martins@fsfx.com.br labhmc@fsfx.com.br</p>	<p>Sim</p>
<p>Coleta permitida somente até as 10:00 horas. Exame não consta no rol de cobertura, verificar no plano. Não colher à 6ª feira, sábado ou véspera de feriado; Material colhido somente pelo médico.</p> <p>Agendamento somente de segunda a quinta-feira até as 10h. Não há coleta às 6ª feira, sábado ou véspera feriado. Obs: Após agendamento atendente necessita comunicar ao laboratório por email para solicitar logística. Deve-se enviar o agendamento aos emails: eliene.oliveira@fsfx.com.br</p>	<p>Sim</p>

<p>Coleta permitida somente até as 10:00 horas.</p> <p>Não consta no Rol de cobertura da ANS. Este teste tem como objetivo detectar a deleção submicroscópica do gene CHIC2, comumente observado na síndrome hipereosinofílica crônica/leucemia eosinofílica. É imprescindível encaminhar cópia da receita médica juntamente com o questionário apropriado preenchido. Agendar coleta.</p> <p>Agendamento somente de segunda a quinta-feira até as 10h. Não há coleta às 6ª feira, sábado ou véspera feriado.</p> <p>Obs: Após agendamento atendente necessita comunicar ao laboratório por email para solicitar logística.</p>	<p>Sim</p>
<p>Deve-se enviar o agendamento aos emails: jejunio@fcm.ufpr.br</p> <p>Exame necessita de autorização (somente guia e senha). Colher de 2ª a 5ª feira, somente até as 10:00 horas Anotar medicamentos dos últimos: 30 dias. É necessário o envio de questionário específico. Agendar coleta.</p> <p>Agendamento somente de segunda a quinta-feira até as 10h. Não há coleta às 6ª feira, sábado ou véspera feriado.</p> <p>Obs: Após agendamento atendente necessita comunicar ao laboratório por email para solicitar logística.</p>	<p>Sim</p>
<p>Exame de alto custo, não consta no Rol de cobertura. Necessário verificar autorização no plano.</p> <p>Coletas realizadas apenas no Laboratório HMC I de segunda à quinta-feira até 10:00. Não devem ser coletadas na sexta ou em véspera de feriados.</p> <p>É necessário o envio de questionário específico. Agendar coleta.</p> <p>Agendamento somente de segunda a quinta-feira até as 10h. Não há coleta às 6ª feira, sábado ou véspera feriado.</p> <p>Obs: Após agendamento atendente necessita comunicar ao laboratório por email para solicitar logística.</p>	<p>Sim</p>
<p>Este exame pode ser realizado em amostras de sangue periférico ou de medula óssea. Coleta permitida somente até as 10:00 horas de segunda a quinta-feira. Exame não consta no rol de cobertura, verificar no plano. Não colher à 6ª feira, sábado ou véspera de feriado. É necessário o envio de questionário específico. Agendar coleta.</p> <p>Agendamento somente de segunda a quinta-feira até as 10h. Não há coleta às 6ª feira, sábado ou véspera feriado.</p> <p>Obs: Após agendamento atendente necessita comunicar ao laboratório por email para solicitar logística.</p> <p>Deve-se enviar o agendamento aos emails: oliane.oliveira@fcm.ufpr.br</p>	<p>Sim</p>
<p>Este exame não necessita de preparo. Não marcar dia de sexta a tarde ou sábado. Coleta até as 10:00 horas de segunda a quinta feira</p> <p>Agendamento somente de segunda a quinta-feira até as 10h. Não há coleta às 6ª feira, sábado ou véspera feriado.</p> <p>Obs: Após agendamento atendente necessita comunicar ao laboratório por email para solicitar logística.</p> <p>Deve-se enviar o agendamento aos emails: oliane.oliveira@fcm.ufpr.br</p>	<p>Sim</p>

<p>Se material aceito em bloco de parafina, solicitar cópia do laudo original (o laudo e bloco devem ter a mesma numeração).</p> <p>Material de biópsia coletado pelo médico.</p> <p>Entrega do material permitida somente até as 10:00 horas. <span style="float: right;">Atenção</span></p> <p>Este exame não é realizado sem o Termo de Esclarecimento, Informação e Consentimento para o Transporte de Amostra de Material Biológico assinado pelo cliente.</p> <p>Agendamento somente de segunda a quinta-feira até as 10h.</p> <p>Não há coleta às 6ª feira, sábado ou véspera feriado.</p> <p>Obs: Após agendamento atendente necessita comunicar ao laboratório por email para solicitar logística.</p> <p>Deve-se enviar o agendamento aos emails:</p>	Sim
<p>É necessário o envio de questionário específico, disponível no site do laboratório, corretamente preenchido.</p> <p>Jejum não obrigatório.</p> <p>Exame necessita de autorização (somente guia e senha).</p> <p>Colher de 2ª a 5ª feira somente até as 10:00 horas</p> <p>Anotar medicamentos dos últimos: 30 dias.</p> <p>Agendamento somente de segunda a quinta-feira até as 10h.</p> <p>Não há coleta às 6ª feira, sábado ou véspera feriado.</p> <p>Obs: Após agendamento atendente necessita comunicar ao laboratório por email para solicitar logística.</p>	Sim
<p>Não consta no ROR de cobertura da ANS.</p> <p>Material coletado pelo médico.</p> <p>Agendar coleta.</p> <p>Agendamento somente de segunda a quinta-feira até as 10h.</p> <p>Não há coleta às 6ª feira, sábado ou véspera feriado.</p> <p>Obs: Após agendamento atendente necessita comunicar ao laboratório por email para solicitar logística.</p> <p>Deve-se enviar o agendamento aos emails:  <a href="mailto:eliene.oliveira@fsfx.com.br">eliene.oliveira@fsfx.com.br</a>  <a href="mailto:edna.martins@fsfx.com.br">edna.martins@fsfx.com.br</a></p>	Sim
<p>O exame é realizado em material de medula óssea. <span style="float: right;">Sangue periferico sera aceito</span></p> <p>somente em casos excepcionais: se houver presença de plasmócitos no sangue periférico e o médico solicitante descrever claramente no pedido médico. <span style="float: right;">Enviar</span></p> <p>cópia do pedido + questionário.</p> <p>Procedimento de alto custo, necessário verificar cobertura no plano.</p> <p>Colher ate as 10:00 horas de segunda a quinta feira</p> <p>Agendamento somente de segunda a quinta-feira até as 10h.</p> <p>Não há coleta às 6ª feira, sábado ou véspera feriado.</p> <p>Obs: Após agendamento atendente necessita comunicar ao laboratório por email para solicitar logística.</p>	Sim
<p>Este exame é realizado em sangue periferico.</p> <p>Este exame não necessita de preparo.</p> <p>É imprescindível encaminhar o questionário e pedido médico.</p> <p>Colher de 2ª a 5ª feira até as 10:00</p> <p>Agendamento somente de segunda a quinta-feira até as 10h.</p> <p>Não há coleta às 6ª feira, sábado ou véspera feriado.</p> <p>Obs: Após agendamento atendente necessita comunicar ao laboratório por email para solicitar logística.</p> <p>Deve-se enviar o agendamento aos emails:  <a href="mailto:eliene.oliveira@fsfx.com.br">eliene.oliveira@fsfx.com.br</a></p>	Sim

<p>Não colher às 6ª feira, sábado ou véspera feriado. Este exame não necessita de preparo.</p> <p>Agendamento somente de segunda a quinta-feira até as 10h. Não há coleta às 6ª feira, sábado ou véspera feriado. Obs: Após agendamento atendente necessita comunicar ao laboratório por email para solicitar logística. Deve-se enviar o agendamento aos emails: eliene.oliveira@fsfx.com.br edna.martins@fsfx.com.br Enviar questionário preenchido.</p>	<p>Sim</p>
<p>Enviar cópia da solicitação médica. Coleta de segunda à quinta até as 10:00 horas Este exame não necessita de preparo. Exame requer autorização do Convênioênio.</p> <p>Agendamento somente de segunda a quinta-feira até as 10h. Não há coleta às 6ª feira, sábado ou véspera feriado. Obs: Após agendamento atendente necessita comunicar ao laboratório por email para solicitar logística. Deve-se enviar o agendamento aos emails: eliene.oliveira@fsfx.com.br edna.martins@fsfx.com.br</p>	<p>Sim</p>
<p>Este exame não necessita de preparo e é realizado somente com solicitação médica. Preencher questionário! Colher ate as 11:00 horas de segunda a quinta feira</p> <p>Agendamento somente de segunda a quinta-feira até as 10h. Não há coleta às 6ª feira, sábado ou véspera feriado. Obs: Após agendamento atendente necessita comunicar ao laboratório por email para solicitar logística. Deve-se enviar o agendamento aos emails: eliene.oliveira@fsfx.com.br edna.martins@fsfx.com.br labhmc@fsfx.com.br</p>	<p>Sim</p>
<p>Este exame não necessita de preparo e é realizado somente com solicitação médica. Preencher questionário!</p> <p>Colher ate as 10:00 horas de segunda a quinta feira Solicitar autorização do plano. Se o transplante for de medula óssea solicitar autorização no plano código 40403769.</p> <p>Agendamento somente de segunda a quinta-feira até as 10h. Não há coleta às 6ª feira, sábado ou véspera feriado. Obs: Após agendamento atendente necessita comunicar ao laboratório por email para solicitar logística.</p>	<p>Sim</p>
<p>I</p>	<p>Sim</p>



<p>Coleta deve ser realizada pela manhã (7:00 às 10:30) Para esse exame, preencher, e enviar junto com a amostra, o Questionários Formulário de Solicitação de Teste genético.          Enviar cópia da solicitação Este exame não necessita de qualquer tipo de preparo.          Esse exame NÃO pode ser colhido na véspera de feriados.          Colher de 2ª a 5ª exceto em vésperas de feriado.</p> <p>Agendamento somente de segunda a quinta-feira até as 10h.          Não há coleta às 6ª feira, sábado ou véspera feriado.</p> <p>Obs: Após agendamento atendente necessita comunicar ao laboratório por email para solicitar logística.</p>	<p>Sim</p>
<p>Este exame não necessita de preparo.          Solicitar autorização do plano.          Preencher questionário e enviar cópia da solicitação médica.          As amostras não podem ser coletadas às 6ª feira, sábado ou véspera feriado. Exame não consta no Rol de cobertura dos Convênioênios.</p> <p>Agendamento somente de segunda a quinta-feira até as 10h.          Não há coleta às 6ª feira, sábado ou véspera feriado.</p> <p>Obs: Após agendamento atendente necessita comunicar ao laboratório por email para solicitar logística.          Deve-se enviar o agendamento aos emails:          eliane.oliveira@fzfr.com.br</p>	<p>Sim</p>
<p>Este exame não necessita de preparo. Enviar cópia da solicitação médica.          Solicitar autorização do plano.          Obrigatório preenchimento e envio do Questionário.          Colher de segunda a quarta feira normalmente e quinta feira ate as 10:00 horas.</p> <p>Agendamento somente de segunda a quinta-feira até as 10h.          Não há coleta às 6ª feira, sábado ou véspera feriado.</p> <p>Obs: Após agendamento atendente necessita comunicar ao laboratório por email para solicitar logística.</p>	<p>Sim</p>
<p>Este exame não necessita de preparo. Enviar cópia da solicitação médica.          Solicitar autorização do plano.          Obrigatório preenchimento e envio do Questionário.          Colher de segunda a quarta feira normalmente e quinta feira ate as 10:00 horas.</p> <p>Agendamento somente de segunda a quinta-feira até as 10h.          Não há coleta às 6ª feira, sábado ou véspera feriado.</p> <p>Obs: Após agendamento atendente necessita comunicar ao laboratório por email para solicitar logística.</p>	<p>Sim</p>
<p>Este exame não necessita de qualquer tipo de preparo.          Necessário o envio do questionário preenchido.          Necessário o envio da cópia da solicitação médica.          Coleta até as 10:00 horas.          Procedimento não consta no rol da ANS.          Agendar coleta.</p> <p>Agendamento somente de segunda a quinta-feira até as 10h.          Não há coleta às 6ª feira, sábado ou véspera feriado.</p> <p>Obs: Após agendamento atendente necessita comunicar ao laboratório por email para solicitar logística.</p>	<p>Sim</p>

<p>Este exame não necessita de preparo e é realizado somente com solicitação médica.          Procedimento consta no rol de cobertura da ANS, devido ao alto custo é necessário pegar autorização para USISAUDE.          Necessário preencher questionário!!</p> <p>Agendamento somente de segunda a quinta-feira até as 10h.          Não há coleta às 6ª feira, sábado ou véspera feriado.          Obs: Após agendamento atendente necessita comunicar ao laboratório por email para solicitar logística.          Deve-se enviar o agendamento aos emails:          eliene.oliveira@fsfx.com.br          edna.martins@fsfx.com.br          Jejum não necessário.</p>	<p>Sim</p>
<p>Coleta até as 10:00 horas.          Procedimento não consta no rol da ANS.          Não colher sexta-feira, sábado ou véspera feriado.          Preencher e enviar questionário junto com amostra.</p> <p>Agendamento somente de segunda a quinta-feira até as 10h.          Não há coleta às 6ª feira, sábado ou véspera feriado.          Obs: Após agendamento atendente necessita comunicar ao laboratório por email para solicitar logística.</p> <p>Deve-se enviar o agendamento aos emails:</p>	<p>Sim</p>
<p>Este exame não necessita de preparo e é realizado somente com solicitação médica.          Necessita de autorização.          Necessário o preenchimento do questionário para cada amostra.          Colher ate as 10:00 horas de segunda a quinta feirado</p> <p>Agendamento somente de segunda a quinta-feira até as 10h.          Não há coleta às 6ª feira, sábado ou véspera feriado.          Obs: Após agendamento atendente necessita comunicar ao laboratório por email para solicitar logística.          Deve-se enviar o agendamento aos emails:          eliene.oliveira@fsfx.com.br          edna.martins@fsfx.com.br</p>	<p>Sim</p>
<p>Este teste é indicado para orientar a escolha terapêutica mais adequada para o tratamento de infecções por micobactérias, podendo ser solicitado juntamente com o exame de cultura para micobactérias de qualquer material clínico ou ser pedido isoladamente após um resultado positivo de cultura. Agendar coleta.</p> <p>Agendamento somente de segunda a quinta-feira até as 10h.          Não há coleta às 6ª feira, sábado ou véspera feriado.          Obs: Após agendamento atendente necessita comunicar ao laboratório por email para solicitar logística.          Deve-se enviar o agendamento aos emails:          eliene.oliveira@fsfx.com.br          edna.martins@fsfx.com.br</p>	<p>Sim</p>
<p>O teste pode ser realizado em amostras de sangue periferico ou de medula ossea.          Coleta permitida somente até as 10:00 horas.          Exame não consta no rol de cobertura, verificar no plano. Este exame não necessita de preparo.          Não colher à 6ª feira, sábado ou véspera de feriado;</p> <p>Agendamento somente de segunda a quinta-feira até as 10h.          Não há coleta às 6ª feira, sábado ou véspera feriado.          Obs: Após agendamento atendente necessita comunicar ao laboratório por email para solicitar logística.          Deve-se enviar o agendamento aos emails:          eliene.oliveira@fsfx.com.br</p>	<p>Sim</p>

<p>Exame realizado em medula óssea, sangue periférico ou material em bloco de parafina.  É IMPRESCINDÍVEL enviar uma cópia da solicitação médica juntamente com o questionário .  - Jejum de 8 horas.  Coleta permitida somente até as 10:00  Não colher às 6ª feira, sábado ou véspera feriado.</p> <p>Agendamento somente de segunda a quinta-feira até as 10h.  Não há coleta às 6ª feira, sábado ou véspera feriado.</p> <p>Obs: Após agendamento atendente necessita comunicar ao laboratório por email para solicitar logística.  Deve-se enviar o agendamento aos emails:  <del>eliene.oliveira@fsfx.com.br</del></p>	<p>Sim</p>
<p>Coleta é realizado por procedimento médico.  Coleta permitida somente até as 10:00 horas. Agendar coleta.</p> <p>Agendamento somente de segunda a quinta-feira até as 10h.  Não há coleta às 6ª feira, sábado ou véspera feriado.</p> <p>Obs: Após agendamento atendente necessita comunicar ao laboratório por email para solicitar logística.  Deve-se enviar o agendamento aos emails:  eliene.oliveira@fsfx.com.br  edna.martins@fsfx.com.br  labhmc@fsfx.com.br  Jejum não obrigatório.</p>	<p>Sim</p>
<p>Para esse exame, preencher, e enviar junto com a amostra, o Questionário Formulário de Solicitação de Teste genético e a cópia da solicitação médica.  Solicitar autorização do plano. Agendar coleta.</p> <p>Agendamento somente de segunda a quinta-feira até as 10h.  Não há coleta às 6ª feira, sábado ou véspera feriado.</p> <p>Obs: Após agendamento atendente necessita comunicar ao laboratório por email para solicitar logística.  Deve-se enviar o agendamento aos emails:  eliene.oliveira@fsfx.com.br  <del>edna.martins@fsfx.com.br</del></p>	<p>Sim</p>
<p>Coleta até as 10:00 horas de segunda a quinta-feira.  É necessário o envio de questionário específico e envio da cópia da receita médica.  Exame realizado em medula óssea ou em sangue periférico.  Exame de alto custo, solicitar autorização do plano.</p> <p>Agendamento somente de segunda a quinta-feira até as 10h.  Não há coleta às 6ª feira, sábado ou véspera feriado.</p> <p>Obs: Após agendamento atendente necessita comunicar ao laboratório por email para solicitar logística.  Deve-se enviar o agendamento aos emails:  <del>eliene.oliveira@fsfx.com.br</del></p>	<p>Sim</p>
<p>Exame não consta no rol de cobertura, verificar no plano.  Coleta permitida somente até as 10:00 horas de segunda a quinta.</p> <p>Agendamento somente de segunda a quinta-feira até as 10h.  Não há coleta às 6ª feira, sábado ou véspera feriado.</p> <p>Obs: Após agendamento atendente necessita comunicar ao laboratório por email para solicitar logística.  Deve-se enviar o agendamento aos emails:  eliene.oliveira@fsfx.com.br  <del>edna.martins@fsfx.com.br</del></p>	<p>Sim</p>

<p>Jejum não obrigatório, é realizado somente com solicitação médica.</p> <p>Preencher questionário para Teste de Histocompatibilidade.          Não colher às 6ª feira, sábado ou véspera feriado.          Colher até as 11:00 horas de segunda a quinta-feira.</p> <p>Agendamento somente de segunda a quinta-feira até as 10h.          Não há coleta às 6ª feira, sábado ou véspera feriado.</p> <p>Obs: Após agendamento atendente necessita comunicar ao laboratório por email para solicitar logística.</p> <p>Deve-se enviar o agendamento aos emails:  <a href="mailto:eliene.oliveira@fsfx.com.br">eliene.oliveira@fsfx.com.br</a></p>	<p>Sim</p>
<p>Jejum não obrigatório, é realizado somente com solicitação médica.</p> <p>Preencher questionário para Teste de Histocompatibilidade.          Não colher às 6ª feira, sábado ou véspera feriado.          Colher até as 11:00 horas de segunda a quinta-feira.</p> <p>Agendamento somente de segunda a quinta-feira até as 10h.          Não há coleta às 6ª feira, sábado ou véspera feriado.</p> <p>Obs: Após agendamento atendente necessita comunicar ao laboratório por email para solicitar logística.</p> <p>Deve-se enviar o agendamento aos emails:  <a href="mailto:eliene.oliveira@fsfx.com.br">eliene.oliveira@fsfx.com.br</a>  <a href="mailto:edna.martins@fsfx.com.br">edna.martins@fsfx.com.br</a></p>	<p>Sim</p>
<p>Não é necessário preparo para este exame.</p> <p>Exame não consta no Rol da ANS, verificar nos Convênios.</p> <p>Não colher às 6ª feira, sábado ou véspera feriado. Coleta de segunda a quarta-feira até as 11:00</p> <p>Este exame é realizado somente com solicitação médica;          É necessário o envio do questionário devidamente preenchido.</p> <p>Agendamento somente de segunda a quinta-feira até as 10h.          Não há coleta às 6ª feira, sábado ou véspera feriado.</p> <p>Obs: Após agendamento atendente necessita comunicar ao laboratório por email para solicitar logística.</p> <p>Deve-se enviar o agendamento aos emails:</p>	<p>Sim</p>
<p>Não é necessário jejum para realização do exame. Esse exame só pode ser coletado às segundas-feiras.</p> <p>Procedimento não consta no rol da ANS, verificar no plano.          É obrigatória a solicitação médica para realização do exame.</p> <p>Este exame destina-se apenas a gestações de feto único, incluindo casos de fertilização in vitro (ovócitos próprios ou não).</p> <p>Teste não realizado para Gestações gemelares          Gestações gemelares com óbito de um dos embriões/fetos não deve ser realizado o teste.          A coleta pode ser feita a partir de dez semanas de gestação e não há limite de idade gestacional superior.</p> <p>Para esse exame é OBRIGATÓRIO o preenchimento e envio dos dois formulários.</p> <p>Agendar coleta</p>	<p>Sim</p>
<p>Confirmar antes da coleta para o agendamento da logística.</p> <p>Fezes de 24h, 48h ou 72h;          Utilizar vasilhame limpo e seco (amostra deve ser colhida em apenas um vasilhame)          Conservar material na geladeira;          Seguir dieta (verificar laboratório).</p> <p>Agendamento somente de segunda a quinta-feira até as 10h.          Não há coleta às 6ª feira, sábado ou véspera feriado.</p> <p>Obs: Após agendamento atendente necessita comunicar ao laboratório por email para solicitar logística.</p> <p>Deve-se enviar o agendamento aos emails:  <a href="mailto:eliene.oliveira@fsfx.com.br">eliene.oliveira@fsfx.com.br</a></p>	<p>Sim</p>

<p>Jejum não obrigatório,          Procedimento não consta no rol da ANS;          Este exame não se destina a finalidades médico-legais;          Não colher às 6ª feira, sábado ou véspera feriado.          A coleta deve ser realizada até 10 horas</p> <p>Agendamento somente de segunda a quinta-feira até as 10h.          Não há coleta às 6ª feira, sábado ou véspera feriado.          Obs: Após agendamento atendente necessita comunicar ao laboratório por email para solicitar logística.</p>	<p>Sim</p>
<p>Deve-se enviar o agendamento aos emails:          Este exame não necessita de qualquer tipo de preparo.          Não colher sexta-feira, sábado ou véspera de feriado.          Necessário o envio do questionário preenchido.          Necessário o envio da cópia da solicitação médica. Agendar coleta.</p> <p>Agendamento somente de segunda a quinta-feira até as 10h.          Não há coleta às 6ª feira, sábado ou véspera feriado.          Obs: Após agendamento atendente necessita comunicar ao laboratório por email para solicitar logística.</p> <p>Deve-se enviar o agendamento aos emails:          eliene.oliveira@fsfx.com.br          edna.martins@fsfx.com.br</p>	<p>Sim</p>
<p>Este exame não necessita de preparo e é realizado somente com solicitação médica.          Fornecer questionário para o cliente preencher. Necessário o preenchimento do questionário para cada amostra. Agendar coleta.</p> <p>Agendamento somente de segunda a quinta-feira até as 10h.          Não há coleta às 6ª feira, sábado ou véspera feriado.          Obs: Após agendamento atendente necessita comunicar ao laboratório por email para solicitar logística.</p> <p>Deve-se enviar o agendamento aos emails:          eliene.oliveira@fsfx.com.br          edna.martins@fsfx.com.br          labhmc@fsfx.com.br</p>	<p>Sim</p>
<p>Jejum não obrigatório,          Procedimento contém DUT, é necessário verificar no plano. Agendar coleta.          Para esse exame, preencher, e enviar junto com a amostra, o questionário disponível no site Fleury/Laboratório de Referência/Instruções e Questionários Formulário de Solicitação de Teste genético.          Enviar cópia da solicitação médica.</p> <p>Agendamento somente de segunda a quinta-feira até as 10h.          Não há coleta às 6ª feira, sábado ou véspera feriado.          Obs: Após agendamento atendente necessita comunicar ao laboratório por email para solicitar logística.</p>	<p>Sim</p>
<p>Este exame necessita de jejum mínimo de 4 horas.          Verificar cobertura no plano.</p> <p>Agendamento somente de segunda a quinta-feira até as 10h.          Não há coleta às 6ª feira, sábado ou véspera feriado.          Obs: Após agendamento atendente necessita comunicar ao laboratório por email para solicitar logística.</p> <p>Deve-se enviar o agendamento aos emails:          eliene.oliveira@fsfx.com.br          edna.martins@fsfx.com.br          labhmc@fsfx.com.br</p>	<p>Sim</p>

<p>Jejum não obrigatório, É necessário o envio de questionário específico e o envio do pedido médico. Solicitar autorização nos planos. Agendar coleta.</p> <p>Agendamento somente de segunda a quinta-feira até as 10h. Não há coleta às 6ª feira, sábado ou véspera feriado.</p> <p>Obs: Após agendamento atendente necessita comunicar ao laboratório por email para solicitar logística.</p> <p>Deve-se enviar o agendamento aos emails: eliene.oliveira@fsfx.com.br edna.martins@fsfx.com.br</p>	<p>Sim</p>
<p>Jejum não obrigatório. Coleta até as 10:00 horas. Procedimento não consta no rol da ANS. Não colher sexta-feira, sábado ou véspera feriado. Preencher e enviar questionário, termo de consentimento e uma cópia do pedido junto à amostra.</p> <p>Agendamento somente de segunda a quinta-feira até as 10h. Não há coleta às 6ª feira, sábado ou véspera feriado.</p> <p>Obs: Após agendamento atendente necessita comunicar ao laboratório por email para solicitar logística.</p> <p>Deve-se enviar o agendamento aos emails:</p>	<p>Sim</p>
<p>Jejum não obrigatório, não colher sábado, domingo ou véspera feriado. Não consta no rol da ANS verificar cobertura no plano ESTE EXAME SÓ É REALIZADO EM MULHERES GRÁVIDAS NO 1º TRIMESTRE. Este exame não necessita de preparo. Este exame não pode ser realizado em gestações com três fetos ou mais(trigêmeos ou mais). Agendar coleta.</p> <p>Agendamento somente de segunda a quinta-feira até as 10h. Não há coleta às 6ª feira, sábado ou véspera feriado.</p> <p>Obs: Após agendamento atendente necessita comunicar ao laboratório por email para solicitar logística.</p> <p>Deve-se enviar o agendamento aos emails:</p>	<p>Sim</p>
<p>Jejum não obrigatório, não coletar sábado, domingo ou véspera feriado, Procedimento não consta no rol da ANS verificar cobertura; ESTE EXAME SÓ É REALIZADO EM MULHERES GRÁVIDAS NO 1º TRIMESTRE. Este exame não necessita de preparo. Exame realizado apenas para gestação de feto único. (NÃO= gêmeos, trigêmeos ou mais). Agendar coleta.</p> <p>Agendamento somente de segunda a quinta-feira até as 10h. Não há coleta às 6ª feira, sábado ou véspera feriado.</p> <p>Obs: Após agendamento atendente necessita comunicar ao laboratório por email para solicitar logística.</p> <p>Deve-se enviar o agendamento aos emails:</p>	<p>Sim</p>
<p>Não é necessário preparo para este exame; É necessário o envio do questionário devidamente preenchido e da solicitação médica. NÃO pode ser coletado às quintas e sextas-feiras, vésperas de feriado e dias de feriado. Procedimento não consta no rol de cobertura da ANS, verificar no plano. Agendar coleta.</p> <p>Agendamento somente de segunda a quinta-feira até as 10h. Não há coleta às 6ª feira, sábado ou véspera feriado.</p> <p>Obs: Após agendamento atendente necessita comunicar ao laboratório por email para solicitar logística.</p> <p>Deve-se enviar o agendamento aos emails:</p>	<p>Sim</p>

<p>Não comer às 6ª feira, sábado ou véspera feriado. A coleta deve ser realizada até 11 horas de segunda a quinta.</p> <p>Este exame não necessita de qualquer tipo de preparo. Necessário o envio do questionário preenchido. Necessário o envio da cópia da solicitação médica.</p> <p>Exame não consta no Rol, verificar cobertura do plano. Agendar coleta.</p> <p>Agendamento somente de segunda a quinta-feira até as 10h. Não há coleta às 6ª feira, sábado ou véspera feriado.</p> <p>Obs: Após agendamento atendente necessita comunicar ao laboratório por email para solicitar logística.</p> <p>Deve-se enviar o agendamento aos emails: labhmc@fsfx.com.br</p>	<p>Sim</p>
<p>A coleta deve ser realizada até 11 horas de segunda a quinta. Agendar coleta.</p> <p>Agendamento somente de segunda a quinta-feira até as 10h. Não há coleta às 6ª feira, sábado ou véspera feriado.</p> <p>Obs: Após agendamento atendente necessita comunicar ao laboratório por email para solicitar logística.</p> <p>Deve-se enviar o agendamento aos emails: eliene.oliveira@fsfx.com.br edna.martins@fsfx.com.br labhmc@fsfx.com.br</p>	<p>Sim</p>
<p>Procedimento não consta no rol de cobertura da ANS, verificar nos planos. Código CBHPM: 40314375</p> <p>Colher até as 10:00 horas de segunda a quinta-feira</p> <p>Agendamento somente de segunda a quinta-feira até as 10h. Não há coleta às 6ª feira, sábado ou véspera feriado.</p> <p>Obs: Após agendamento atendente necessita comunicar ao laboratório por email para solicitar logística.</p> <p>Deve-se enviar o agendamento aos emails: eliene.oliveira@fsfx.com.br</p>	<p>Sim</p>
<p>Este exame não necessita de qualquer tipo de preparo. Necessário o envio do questionário preenchido. Necessário o envio da cópia da solicitação médica. Não consta no Rol, verificar cobertura Agendar coleta.</p> <p>Agendamento somente de segunda a quinta-feira até as 10h. Não há coleta às 6ª feira, sábado ou véspera feriado.</p> <p>Obs: Após agendamento atendente necessita comunicar ao laboratório por email para solicitar logística.</p> <p>Deve-se enviar o agendamento aos emails: eliene.oliveira@fsfx.com.br</p>	<p>Sim</p>
<p>Este exame não necessita de preparo. Agendar coleta.</p> <p>Agendamento somente de segunda a quinta-feira até as 10h. Não há coleta às 6ª feira, sábado ou véspera feriado.</p> <p>Obs: Após agendamento atendente necessita comunicar ao laboratório por email para solicitar logística.</p> <p>Deve-se enviar o agendamento aos emails: eliene.oliveira@fsfx.com.br edna.martins@fsfx.com.br labhmc@fsfx.com.br</p>	<p>Sim</p>

<p>É necessário enviar os impressos de Autorização e o Questionário do FISH devidamente preenchidos pela cliente. Enviar também o Questionário do respectivo cariótipo.          Não consta no Rol da ANS verificar cobertura no plano.          Não colher às 6ª feira, sábado ou véspera feriado, coleta até as 11:00</p> <p>Agendamento somente de segunda a quinta-feira até as 10h.          Não há coleta às 6ª feira, sábado ou véspera feriado.</p> <p>Obs: Após agendamento atendente necessita comunicar ao laboratório por email para solicitar logística.          Deve-se enviar o agendamento aos emails:          eliene.oliveira@fsfx.com.br          edna.martins@fsfx.com.br</p>	<p>Sim</p>
<p>Jejum não obrigatório;          É necessário coletar material dos pais também;          Exame não consta no Rol da ANS, verificar cobertura nos planos.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 4 horas.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.          Se solicitado exame APÓS ESFORÇO, é necessário que o médico especifique a atividade e o tempo de realização.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.          Se tiver solicitação de HEMOGRAMA, não agendar LEUCOGRAMA, agendar apenas HEMOGRAMA.</p>	<p>Não</p>



<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Tempo de execução do exame 24h, NAO MARCAR urgência para o mesmo dia.</p>	<p>Não</p>
<p>A coleta do material líquor é um procedimento médico. A amostra coletada deve chegar ao laboratório o mais rápido possível, no máximo em 2 horas após a coleta.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Informar medicamentos em uso.</p>	<p>Não</p>

<p>Jejum não obrigatório. Aos sábados: NÃO pode ser coletado na Unidade do Ideal, Canaã, Coronel Fabriciano e Timóteo depois de 09:00. De segunda a sexta feira para Ideal, Canaã, Coronel Fabriciano e Timóteo A marcação e a coleta só podem ser realizados até as 13h30min</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>

<p>Jejum não obrigatório. Exame possui DUT, necessita autorização do plano, exceto PM.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>A coleta do material líquido é um procedimento médico. A amostra coletada deve chegar ao laboratório o mais rápido possível, no máximo em 2 horas após a coleta.</p>	<p>Não</p>

<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Exame não consta no Rol de cobertura da ANS.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>

<p>A coleta do material é um procedimento médico. Após coleta, a amostra deve ser imediatamente entregue ao Laboratório.</p>	<p>Não</p>
<p>A coleta do material é um procedimento médico. Após coleta, a amostra deve ser imediatamente entregue ao Laboratório.</p>	<p>Não</p>
<p>Exame não necessita de preparo.</p>	<p>Não</p>
<p>Não coletado de 11:30 a 13:30 horas. Evitar uso de medicamentos na lesão no dia do exame. Informar medicamentos em uso. Dependendo do local da lesão, o Laboratório não executa a coleta. Exemplo: mucosas, língua, face. Nestes casos a coleta deve ser realizada pelo médico.</p>	<p>Sim</p>
<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>

<p>A coleta do material é um procedimento médico. Após coleta, a amostra deve ser imediatamente entregue ao Laboratório.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b> ATENÇÃO! Não confundir com Tempo de Tromboplastina Parcial (TTP). Quando solicitado teste de mistura, deve-se marcar um TPP e um TTPM.</p>	<p>Não</p>

<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b> Marcação exclusiva para crianças até 01 ano de idade.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>

<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>A coleta do material é um procedimento médico. Após coleta, a amostra deve ser imediatamente entregue ao Laboratório.</p>	<p>Não</p>
<p>A coleta do material é um procedimento médico. Após coleta, a amostra deve ser imediatamente entregue ao Laboratório.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>



<p>Urina 24h</p> <p>Exame poderá ser entregue de segunda a quinta-feira e sexta até as 11:00 horas.</p> <p>Não fazer esforço físico durante a coleta.</p> <p>O cliente deve manter sua rotina diária.</p> <p>Manter a urina refrigerada durante todo o procedimento de coleta. Não é necessário aumentar a ingestão de líquidos, exceto sob orientação médica.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.</p> <p>Procedimento não realizado pelo SUS</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>

<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Informar medicamentos em uso. Repouso de 5 a 15 minutos sentado ou conforme orientação médica. A critério médico, devem ser suspensos, pelo menos duas semanas antes da realização do exame os antiinflamatórios não esteróides, antihipertensivos (beta bloqueadores, inibidores da enzima de conversão, agentes bloqueadores da ação da angiotensina II, diuréticos tiazídicos, poupadores de potássio e de alça, bloqueadores do canal de cálcio. A espironolactona deve ser suspensa 6 semanas antes da coleta.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Para mulher: Informar mês de gestação. Informar medicamentos em uso.</p>	<p>Não</p>

Jejum obrigatório de 8 horas ou conforme orientação médica.	Não
<b>Jejum não obrigatório.</b>	Não
Informar medicamentos em uso. Jejum não obrigatório.	Não
Urina 24 horas. Buscar orientação e frasco no laboratório. Encaminhar paciente ao laboratório. Jejum não obrigatório.	Não
<b>Jejum não obrigatório.</b>	Não

<p>Restrição do SUS: exame autorizado somente para pacientes internados ou em atendimento no pronto socorro. Urina 24 horas. Colher em frasco com conservante HCL 50% 3,5 mL para cada 1 litro de urina. Refrigerar. Buscar orientação (impressa) e frasco no laboratório.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas. Intervalo entre mamadas para lactentes.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Procedimento não consta no rol da ANS, necessário verificar cobertura no plano.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>

<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>1ª urina da manhã ou reter no mínimo 4 hs, colhida no laboratório. COLETA DOMICILIAR APENAS RECOLHE A AMOSTRA.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Informar medicamentos em uso.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>

<p>Jejum não obrigatório. Informar medicamentos em uso, Se mulher, informar se esta grávida ou se usa anticoncepcional. Informar se já realizou cirurgia de tireóide e há quanto tempo. Informar se já realizou esse exame anteriormente, e quando.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Informar medicamentos em uso.☒ Colher 2ª a 5ª feira, e 6ª até as 11:00 horas.</p>	<p>Não</p>
<p>Urina de 24 horas. Buscar frasco e orientações no laboratório.</p>	<p>Não</p>
<p>Fezes recente a fresco (todo o volume fecal após dieta específica). Buscar instruções no laboratório. Entregar o material de Segunda a Quinta, e Sexta Feira até as 11:00 horas.</p>	<p>Não</p>

<p>Entregar o material de Segunda a Quinta normalmente, e SextaFeira até as 11:00 horas.  Colher fezes recente sem conservante.  Volume necessário: metade do frasco.</p> <p>Antes de coletar as fezes, se necessário, urinar no vaso sanitário para evitar a contaminação do material. Em casos de crianças utilizar coletor de urina, se necessário.</p> <p>Evitar o uso laxantes e supositórios nos 3 dias que antecedem ao exame e no dia da coleta.  Defecar em vasilhame limpo e seco.</p>	<p>Não</p>
<p>Entregar o material de Segunda a Quinta normalmente, e SextaFeira até as 11:00 horas.  Colher fezes recente sem conservante.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 4 horas.</p> <p>Para mulheres: a coleta do sangue deve preferencialmente ser realizada entre o 20º e o 24º dia do ciclo menstrual, ou conforme orientação médica.</p>	<p>Não</p>
<p>Informar se é fumante e se é exposto ao Tiocianato.  Colher urina após retenção urinária mínima de 4 horas.</p> <p>Lavar as mãos, fazer higiene da genitália com água e sabão, secar, desprezar o 1º jato de urina e coletar o jato médio em frasco próprio.  Deve ser colhido após o 3º dia da exposição.</p> <p>Preconizase a coleta de duas amostras, uma de início e outra de final de jornada de trabalho. Se houver opção por uma única amostra, esta deverá ser a do final de jornada de trabalho.</p> <p>Informar se a urina é de início ou final de jornada.  Exame não consta no Rol da ANS verificar cobertura no plano.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>

Jejum obrigatório de 12 horas com prazo máximo de 16 horas ou conforme orientação médica. Abstinência de álcool 72 horas antes da coleta.	Não
Jejum não obrigatório. Coleta de Segunda a Quinta Feira normalmente e Sexta Feira até as 11:00 horas.	Não
Jejum obrigatório de 8 horas.	Não
Jejum não obrigatório.	Não
Jejum não obrigatório.	Não



<p style="text-align: center;"><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p style="text-align: center;">Não</p>
<p style="text-align: center;"><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p style="text-align: center;">Não</p>
<p>O paciente não deve estar em uso de medicamento a base de Iodo ou de Vitamina C nos 3 dias anteriores à coleta. A interrupção do uso do medicamento somente poderá ser feita com o consentimento do médico, caso contrário apenas relatar o uso.</p> <p style="padding-left: 40px;">Colher 1ª urina da manhã ou urina com o mínimo de 4 horas de retenção urinária.</p> <p style="padding-left: 40px;">Fazer higiene local com água e sabão, secar, desprezar o 1º jato e coletar o jato do meio.</p>	<p style="text-align: center;">Não</p>
<p style="text-align: center;">Jejum não obrigatório.</p> <p style="text-align: center;">Não colher às 6ª feira, sábado ou véspera feriado.</p> <p style="text-align: center;">Marcar Hemograma, se não foi solicitado.</p>	<p style="text-align: center;">Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.</p> <p style="text-align: right;">Não colher às 6ª feira após as 11:00 horas, sábado ou véspera feriado.</p>	<p style="text-align: center;">Não</p>

Jejum obrigatório de 4 horas.	Não
Jejum não obrigatório. Informar se já fez este exame anteriormente. Informar medicamentos em uso.	Não
Jejum obrigatório de 8 horas.	Não
Jejum obrigatório de 8 horas.	Não
Jejum não obrigatório.	Não

<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Coleta de Segunda a Quinta-Feira normalmente e Sexta--Feira até as 11:00 horas.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas. Intervalo entre mamadas para lactentes.</p>	<p>Não</p>

<p>Jejum não obrigatório. Coleta de Segunda a Quinta-Feira normalmente e Sexta-Feira até as 11:00 horas. Não colher sábado ou véspera feriado.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Colher urina após retenção urinária mínima de 4 horas. Lavar as mãos, fazer higiene da genitália com água e sabão, secar, desprezar o 1º jato de urina e coletar o jato médio em frasco próprio. Colher amostra de urina ao final do último dia de jornada de trabalho da semana. Evitar a primeira jornada de trabalho da semana.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>

<p style="text-align: center;"><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p style="text-align: center;">Não</p>
<p style="text-align: center;"><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p style="text-align: center;">Não</p>
<p>Entrega do material de Segunda a Quinta-Feira normalmente e Sexta-Feira até as 11:00 horas.          Não entregar sábado ou véspera feriado.          Urina 24 horas.          Buscar orientação e frasco no laboratório.          Colher em frasco seco (sem conservante),manter refrigerado.          - Refrigerar a urina desde o início da coleta.          - Não fazer esforço físico durante a coleta.          - O cliente deve manter sua rotina diária.          - Não é necessário aumentar a ingestão de líquidos, exceto sob orientação médica.</p>	<p style="text-align: center;">Não</p>
<p>Lavar as mãos antes de colher.          Colher urina após retenção urinária de 4 horas.          Fazer higiene da genitália com água e sabão, secar, desprezar o 1º jato de urina e coletar o jato médio.          Não colher em local de trabalho.          Retirar o uniforme antes de iniciar a coleta.          Recomenda-se iniciar a monitorização após 12 meses de exposição.          Informar se é exposto ocupacionalmente.          Informar se houve exposição acidental.          Informar tipo de urina coletada (início ou final de jornada).</p>	<p style="text-align: center;">Não</p>
<p style="text-align: center;">Jejum não obrigatório.</p> <p>Coleta de Segunda a Quinta-Feira normalmente e Sexta-Feira até as 11:00 horas.          Não colher sábado ou véspera feriado.</p>	<p style="text-align: center;">Não</p>

Jejum obrigatório de 4 horas.	Não
Jejum obrigatório de 8 horas.	Não
Urina dever ser coletada o mais próximo possível ao exame, preferencialmente no laboratório a 1ª urina da manhã ou com intervalo de 4 horas entre as micções. Fazer higiene da genitália com água e sabão, secar, desprezar o 1º jato de urina e coletar o jato do meio.	Não
Jejum não obrigatório. Dieta: durante 3 dias que antecedem a coleta da amostra, recomenda-se não ingerir frutos do mar. Não colher em local de trabalho.	Não
Jejum não obrigatório. Informar se é paciente exposto.	Não

Sangue: Jejum não obrigatório. Material líquido: colhido pelo médico.	Não
Jejum obrigatório de 8 horas.	Não
Jejum obrigatório de 8 horas.	Não
Jejum obrigatório de 8 horas. Intervalo entre mamadas para lactentes.	Não
Jejum obrigatório de 4 horas. .	Não

Jejum obrigatório de 8 horas.	Não
Jejum não obrigatório. Informar medicamentos em uso. Informar se já fez este exame anteriormente.	Não
<b>Jejum não obrigatório.</b>	Não
<b>Jejum não obrigatório.</b>	Não
Jejum obrigatório de 8 horas.	Não



Jejum não obrigatório.	Não
Jejum não obrigatório.	Não
Jejum não obrigatório.	Não
Jejum não obrigatório.	Não
Jejum obrigatório de 8 horas.	Não

Jejum não obrigatório.	Não
Jejum não obrigatório.	Não
Jejum não obrigatório.	Não
Jejum não obrigatório.	Não
Jejum não obrigatório.	Não

Jejum não obrigatório.	Não
Jejum não obrigatório.	Não
Jejum não obrigatório.	Não
Jejum não obrigatório.	Não
Jejum não obrigatório.	Não

<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas.</p>	<p>Não</p>
<p>Adultos: . Jejum obrigatório de 12 horas. Crianças: . Até 1 ano de idade, jejum mínimo necessário de 3 horas. . De 1 a 5 anos de idade, jejum mínimo necessário de 6 horas. . Acima de 5 anos de idade, jejum igual ao de adulto. Informar medicamentos em uso. Não ingerir bebida alcoólica nas últimas 24 horas. Não consta no Rol de cobertura da ANS.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>

Jejum obrigatório de 8 horas.	Não
A coleta do material líquido é um procedimento médico.	Sim
Jejum não obrigatório.	Não
Jejum não obrigatório.	Não
Jejum não obrigatório.	Não

<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas. Informar o uso de qualquer medicamento e dados clínicos disponíveis.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 4 horas.</p>	<p>Não</p>

<p>Jejum não obrigatório. Coleta de Segunda a Quinta-Feira normalmente e Sexta-Feira até as 11:00 horas. Não colher sábado ou véspera feriado.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas. Intervalo entre mamadas para lactentes.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Coleta de Segunda a Quinta-Feira normalmente e Sexta-Feira até as 11:00 horas. Não colher sábado ou véspera feriado.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Marcar hemograma, se não foi solicitado. Coleta: Procedimento médico. A informação sobre os dados clínicos e a cópia do hemograma são obrigatórios.</p>	<p>Sim</p>

<p>Jejum não obrigatório. Não é permitida a coleta domiciliar. Informar se é exposto ocupacionalmente. Informar se faz uso de algum medicamento. Informar se há suspeita da Doença de Wilson. Informar se a paciente é gestante.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Não coletar em véspera de feriados prolongados.</p>	<p>Não</p>
<p>Secreção de orofaringe Secreção de nasofaringe</p>	<p>Não</p>



<p>Aguardar 7 dias após o uso de antibióticos ou conforme orientação médica.</p> <p>* Coleta uretral: Vir para a coleta, preferencialmente pela manhã sem urinar, ou estar sem urinar há pelo menos 4 horas.</p> <p>* Coleta vulvar: Vir para a coleta, preferencialmente pela manhã sem urinar, ou estar sem urinar há pelo menos 4 horas;</p> <p>. Não usar desinfetantes ou medicações tópicas (caso esteja em uso, aguardar 48 horas após o término);</p> <p>. Não realizar higiene/banho no dia da coleta;</p> <p>. Não ter relação sexual nas últimas 24 horas anteriores ao exame.</p>	<p>Não</p>
<p>* Coleta em Vagina, fundo do saco vaginal, colo uterino e canal endocervical: Aguardar 7 dias após o uso de antibióticos ou conforme orientação médica.</p> <p>Ver instruções de acordo com o material solicitado pelo médico.</p> <p>* Coleta uretral: Vir para a coleta, preferencialmente pela manhã sem urinar, ou estar sem urinar há pelo menos 4 horas.</p> <p>* Coleta vulvar: Vir para a coleta, preferencialmente pela manhã sem urinar, ou estar sem urinar há pelo menos 4 horas;</p> <p>. Não usar desinfetantes ou medicações tópicas (caso esteja em uso, aguardar 48 horas após o término);</p> <p>. Não realizar higiene/banho no dia da coleta;</p> <p>. Não ter relação sexual nas últimas 24 horas anteriores ao exame.</p>	<p>Não</p>
<p>A coleta dos materiais de lavado broncoalveolar, aspirado traqueal e transtraqueal, líquido pleural e biópsias, são procedimentos médicos.</p> <p>Para a coleta de escarro buscar orientações no laboratório. - Escarro: Colher preferencialmente em sala aberta e bem ventilada. Colher preferencialmente pela manhã, ao se levantar e antes do desjejum. Lavar várias vezes a boca com água pura, gargarejando e bochechando abundantemente. Qualquer secreção nasal ou saliva, deve ser eliminada. Fazer várias inspirações profundas e tossir várias vezes, procurando obter o material do fundo do peito. Não usar pastas de dente ou antissépticos bucais.</p> <p>- As demais amostras são obtidas por procedimentos médicos. Coleta de Segunda a Quinta-Feira normalmente e Sexta-Feira até as 11:00 horas.</p> <p>Não colher sábado ou véspera feriado.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas.</p> <p>Intervalo entre mamadas para lactentes.</p> <p>Colher de segunda a sexta-feira até as 12:00 horas. Não colher sábado ou véspera feriado.</p>	<p>Não</p>
<p>Exame coletado somente no laboratório.</p> <p>Urina recente (jato médio).</p> <p>Colher a 1ª urina da manhã ou com intervalo de 4 horas entre as micções.</p> <p>Fazer higiene da genitália com água e sabão, secar.</p> <p>Para urina recente (jato médio), desprezar o 1º jato de urina e coletar o jato do meio.</p> <p>Manter a rotina normal de ingestão de líquidos, evitando excessos.</p> <p>O uso recente de dipirona e o uso de paracetamol em altas doses podem interferir nos níveis de creatinina dosada pelo método Enzimático.</p> <p>Para Urina de 24 horas: Coletar urina em frasco limpo e seco (com conservante).</p>	<p>Não</p>

<p>Jejum obrigatório de 8 horas.  Informar medicamentos em uso.  Intervalo entre mamadas para lactentes  Colher de segunda a sexta-feira até as 12:00 horas.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>
<p>Não entregar dias de sexta, sábado e feriado prolongado (estabilidade da amostra= 2 dias).  Fezes: Fezes recente a fresco (enviada em frasco âmbar). - Antes de coletar as fezes, se necessário, urinar no vaso sanitário para evitar a contaminação do material. Em casos de crianças utilizar coletor de urina, se necessário.  - Evitar o uso de talco, laxantes, antiácido, contraste oral (utilizado em exames radiológicos) e supositório nos 3 dias que antecedem ao exame e no dia da coleta.  - Defecar em vasilhame limpo e seco.  - Colher em frasco âmbar.  Urina recente: - Colher preferencialmente no laboratório a 1ª urina da manhã ou com intervalo de 4 horas entre as micções.  Fazer higiene local com água e sabão, secar, desinfetar e 1º jato e coletar o jato de meio</p>	<p>Não</p>
<p>Fezes recente, sem conservante em frasco âmbar. - Antes de coletar as fezes, se necessário, urinar no vaso sanitário para evitar a contaminação do material. Em casos de crianças utilizar coletor de urina, se necessário.  - Evitar o uso de talco, laxantes, antiácidos, contraste oral (utilizado em exames radiológicos) e supositórios nos 3 dias que antecedem ao exame e no dia da coleta.  - Defecar em vasilhame limpo, seco e protegido da luz (frasco âmbar).  Coleta de Segunda a Quinta-Feira normalmente e Sexta-Feira até as 11:00 horas.  Não colher sábado ou véspera feriado.</p>	<p>Não</p>

<p>Jejum não obrigatório.  Informar se o paciente é exposto ao chumbo.  Coletar em qualquer horário de trabalho a partir do 3º mês de exposição.  Coleta de Segunda a Quinta-Feira normalmente e Sexta-Feira até as 11:00 horas.  Não colher sábado ou véspera feriado.</p>	<p>Não</p>
<p>Urina recente (jato meio). Coletar 1ª urina da manhã ou urina com o mínimo de 4 horas de retenção urinária.  Fazer higiene local com água e sabão, secar, desprezar o 1º jato e coletar o jato do meio.  Colher em frasco âmbar, colhida no laboratório.  Urina de 24 horas: Não fazer esforço físico durante a coleta. O cliente deve manter sua rotina diária.  Colher em frasco âmbar.  Manter a urina refrigerada durante todo o procedimento de coleta. Não é necessário aumentar a ingestão de líquidos, exceto sob orientação médica.  - Buscar orientação e frasco no laboratório.  Exame possui cobertura pela ANS. Recebimento da amostra de Segunda a Quinta-Feira normalmente e Sexta-Feira até as 11:00 horas.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas.</p>	<p>Não</p>

Jejum obrigatório de 8 horas.	Não
Jejum obrigatório de 8 horas.	Não
<p>NÃO realizado véspera de FERIADO. Urina 24 horas. - Buscar frasco no laboratório (frasco seco) Orientação: Refrigerar a urina desde o início da coleta. Não fazer esforço físico durante a coleta. O cliente deve manter sua rotina diária. Não é necessário aumentar a ingestão de líquidos, exceto sob orientação médica. Mulheres: não realizar a coleta de urina durante o período menstrual. Entregar o material de segunda a sexta-feira até as 12:00 horas.</p>	Não
Jejum obrigatório de 8 horas. Intervalo entre mamadas para lactentes.	Não
Jejum não obrigatório.	Não

<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>
<p>Seguir orientação do laboratório. Escarro, lavado broncoalveolar, líquido pleural, líquor e 1º urina da manhã, colhidos em frasco estéril sem aditivo.</p>	<p>Não</p>
<p>Convênio Usisaúde: pegar guia e senha. Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas. Intervalo entre mamadas para lactentes. Procedimento não possui valor para SUS ambulatorial.</p>	<p>Não</p>

<p>Jejum obrigatório de 8 horas. Intervalo entre mamadas para lactentes. Procedimento não possui valor para SUS ambulatorial.</p>	<p>Não</p>
<p>As amostras só podem ser coletadas de 2ª a 5ª feira. Exame consta no Rol de cobertura. Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas. Informar se está em uso de anticoagulantes e qual a dosagem.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>

<p>De 0 ate 1 ano: jejum mínimo de 3 horas; De 1 ate 5 anos: jejum mínimo de 6 horas; Acima de 5 anos: jejum mínimo de 8 horas.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas. Não coletar sábado ou véspera de feriado.☒</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Exame consta no rol da ANS, porém necessita de autorização do plano.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Informar medicamentos em uso ou que usou recentemente, inclusive fórmulas para emagrecer. Se mulher, informar se está grávida ou se usa anticoncepcional.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas. Informar se esta em uso de anticoagulantes e qual a dosagem.</p>	<p>Não</p>

<p>Jejum não obrigatório.</p> <p>Informar medicamentos em uso, dosagem, dia e hora da última dose. A coleta deve ser realizada antes da próxima dose do medicamento ou conforme orientação médica.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 4 horas ou conforme orientação médica. Intervalo entre mamadas para lactentes.</p> <p>A coleta ideal deve ser realizada antes da administração da próxima dose do medicamento ou conforme orientação médica.</p> <p>Caso o medicamento seja tomado apenas uma vez ao dia, a coleta deve ser feita pelo menos 12 horas após a medicação.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 4 horas.</p> <p>A coleta ideal deve ser realizada antes da administração da próxima dose do medicamento ou conforme orientação do médico.</p> <p>Caso o medicamento seja tomado apenas uma vez ao dia, a coleta deve ser feita pelo menos 12 horas após a medicação.</p> <p>    Não é recomendado o uso concomitante com inibidores da MAO.</p> <p>    Antes da administração de oxcarbazepina, os IMAOS devem ser descontinuados por no mínimo 2 semanas, conforme orientação médica. No entanto, a descontinuidade do medicamento somente poderá ser autorizada pelo médico do paciente.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>



<p>Jejum obrigatório de 4 horas ou conforme orientação médica. A coleta ideal deve ser realizada antes da administração da próxima dose do medicamento ou conforme orientação médica. Caso o medicamento seja tomado apenas uma vez ao dia, a coleta deve ser feita pelo menos 12 horas após a medicação.</p>	Não
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	Não
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	Não
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	Não
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	Não

<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>

<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>

<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>

<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b> Informar medicamentos em uso,inclusive fórmulas para emagrecer. Se mulher, informar se esta grávida ou se usa anticoncepcional.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b> Informar medicamentos em uso,inclusive fórmulas para emagrecer. Se mulher, informar se esta grávida ou se usa anticoncepcional.</p>	<p>Não</p>

<p>Jejum obrigatório de 8 horas. Intervalo entre mamadas para lactentes.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 12 horas.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. informar uso de medicação e se houve mudança na medicação nos últimos meses Exame possui diretriz de utilização necessário solicitar autorização dos planos que seguem ANS.</p>	<p>Não</p>
<p>Urina recente: Colher a 1ª urina da manhã ou urina com o mínimo de 4 horas de retenção urinária.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Exame com diretriz de utilização, necessário pedir autorização ao plano. Tabela SUS não contempla este exame.</p>	<p>Não</p>

<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas. A amostra deverá ser Coletada de de Segunda-Feira a Quarta-Feiras até as 12:00 horas. Não coletar amostras em vésperas de feriados ou finais de semana, de forma a obedecer o prazo estipulado para conservação. Não consta no Rol de cobertura da ANS.</p>	<p>Não</p>

<p>Urina 24 horas.</p> <p>Buscar orientações e frasco no laboratório.</p> <p>Colher em frasco contendo HCL 50% 3,5 mL/L. Manter refrigerado desde o início da coleta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- O paciente deverá permanecer 24 horas antes e durante a coleta sem ingerir alimentos como café, chá, refrigerantes de cola e fumo, pois estes interferem no resultado.</li> <li>- O cliente deverá manter sua rotina diária evitando fazer esforço físico durante a coleta. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Não é necessário aumentar a ingestão de líquidos, exceto sob orientação médica.</li> </ul> </li> <li>- Informar horário inicial e final da coleta, peso, medicamentos em uso, dosagem, dia e hora da última dose.</li> </ul>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.</p> <p>Informar medicamentos em uso ou usados recentemente, inclusive fórmulas para emagrecer (Triostat, Thevier).</p> <p>Se mulher, informar uso de anticoncepcional ou se está grávida.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório:</p> <p>RN a 2 anos: jejum mínimo de 4 horas.</p> <p>De 2 a 8 anos: jejum mínimo de 8 horas.</p> <p>Acima de 8 anos: jejum mínimo de 12 horas.</p>	<p>Não</p>



Jejum obrigatório de 12 horas ou conforme orientação médica.	Não
Jejum obrigatório de 8 horas.☒ Exame no Rol de cobertura precisa de autorização do plano.	Não
Jejum obrigatório de 8 horas. Intervalo entre mamadas para lactentes.	Não
Colher urina após retenção urinária de 4 horas ( urina recente.	Não
<b>Jejum não obrigatório.</b>	Não

<p>Urina 24 horas.          Buscar orientação e frasco no laboratório.          Refrigerar a urina desde o início da coleta.          O cliente deve manter sua rotina diária.          Não é necessário aumentar a ingestão de líquidos, exceto sob orientação médica.          Mulheres: não realizar a coleta de urina no período menstrual.          COLETA DOMICILIAR O TÉCNICO APENAS RECOLHE O MATERIAL.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 4 horas.          Se o cliente submeteu a transfusão de sangue, ingestão de aspirina e derivados da Vitamina K.          Caso tenha submetido a transfusão, aguardar 120 dias.          No caso de uso de aspirina e derivados da Vitamina k deve ser relatado o uso.          A suspensão de qualquer medicação deverá ser feita sob a supervisão e autorização do médico responsável pelo paciente.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas.</p>	<p>Não</p>
<p>Urina 24 horas.          Colher em frasco ÂMBAR com conservante F653 contendo 10 mL ( frasco de 1L) ou 20 mL (frasco de 2L) de HCL 25%          Buscar orientação (impressa) e frasco ÂMBAR no laboratório.</p>	<p>Não</p>

<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Informar medicamentos em uso. Coletar antes da próxima dose do medicamento, observando o mínimo de seis horas após a última dose ou conforme orientação médica.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Buscar orientação e frasco no laboratório.</p> <p>Urina de 24 horas.</p>	<p>Não</p>

<p>Jejum não obrigatório. Questionários para testes genéticos.  Enviar pedido médico.  A interpretação do exame é direcionada pelo quadro clínico e desta forma, é essencial uma informação clínica detalhada.  Não consta no Rol de cobertura da ANS.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.  Preencher completamente e enviar o questionário de coleta assistida em meio físico (obrigatório).  Não há necessidade de questionário para a dosagem de etanol na urina, apenas para a dosagem no plasma.  Informar se o cliente é exposto ocupacionalmente. Para casos em que a dosagem se destina à pesquisa de suspeita de ingestão de bebida alcoólica, a coleta deve ser realizada o mais próxima possível do momento do consumo.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>

<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 12 horas. Não colher às 6ª feira, sábado ou véspera feriado.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>

<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório desejável de 4 horas.</p>	<p>Não</p>
<p>A coleta deve ocorrer preferencialmente entre 7:30h e 12:00h. Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Informar medicamento em uso.</p>	<p>Não</p>

<p>Jejum obrigatório de 4 horas.</p>	<p>Não</p>
<p>Urina 24 horas. Buscar orientação e frasco no laboratório.</p>	<p>Não</p>
<p>Urina recente: Urina início ou final de jornada de trabalho. Dieta: durante 3 dias que antecedem a coleta da amostra, Recomenda-se não ingerir frutos do mar. Não colher em local de trabalho. Retirar o uniforme, lavar as mãos e a genitália antes de colher. Recomenda-se colher o material no início ou final da última jornada semanal de trabalho. Recomenda-se iniciar a monitorização após 6 meses de exposição. Especificar o tipo de urina enviada ( se início ou final da jornada de trabalho).</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Urina 24 horas. Buscar orientação e frasco no laboratório. Informar medicamentos em uso.</p>	<p>Não</p>

<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Fazer higiene da genitália com água e sabão, secar, desprezar o 1º jato de urina, coletar o jato médio em frasco próprio. Colher o jato médio da urina com retenção de 4 horas entre as micções. Colher urina de final de jornada de trabalho. Recomenda-se evitar a primeira jornada de trabalho da semana. Informar se o paciente é exposto ocupacionalmente.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>



<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas. Não consta no Rol da ANS verificar cobertura no plano.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de no mínimo 8 horas. Informar medicamentos em uso. À equipe de marcação presencial: Solicitar autorização para Convênio USISAUDE</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Informar se o paciente é exposto.</p>	<p>Não</p>

<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 12 horas para amostra basal. Jejum obrigatório de 2 horas para amostra pósprandial.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas. Intervalo entre mamadas para lactentes.</p>	<p>Não</p>
<p>1ª urina da manhã ou reter no mínimo 4 hs, colhida no laboratório. Não deve estar em uso de medicamentos como aspirina, Ldopa e ácido ascórbico. Verificar com o médico se é possível suspender a medicação por 3 dias antes da coleta. Caso não seja possível informar o uso. Entregar o material de segunda a sexta-feira até as 12:00 horas. Não coletar em véspera de feriados.</p>	<p>Não</p>

<p style="text-align: center;">Urina 24 horas.</p> <p style="text-align: center;">Buscar orientação e frasco no laboratório.</p> <p style="text-align: center;">Dieta e Orientações:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- O paciente deverá permanecer durante as 24 horas de coleta sem ingerir ou utilizar: Álcool, fumo, refrigerantes com coca, café e chá.</li> <li>- O paciente deverá permanecer 7 dias sem ingerir os seguintes medicamentos, conforme orientação do médico: descongestionantes nasais, broncodilatadores, metildopa, tetraciclina, clorpromazina, quinidina, aspirina, dissulfiran, reserpina, piridoxina e levodopa.</li> <li>- A suspensão ou não de medicamentos é critério exclusivo do médico.</li> <li>- Não fazer esforço físico durante a coleta.</li> <li>- O cliente deverá manter sua rotina diária.</li> </ul>	<p>Não</p>
<p style="text-align: center;">Urina 24 horas.</p> <p>Buscar orientação e frasco no laboratório, Frasco seco (Sem conservante) e refrigerar amostra.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Não fazer esforço físico durante a coleta.</li> <li>- O cliente deve manter sua rotina diária.</li> <li>- Não é necessário aumentar a ingestão de líquidos, exceto sob orientação médica.</li> <li>- Refrigerar a amostra desde o início da coleta.</li> <li>- Mulheres: não realizar a coleta de urina no período menstrual.</li> </ul>	<p>Não</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1ª urina da manhã ou reter no mínimo 4 h, colhida no laboratório.</li> <li>- Não é permitida a coleta domiciliar.</li> <li>- Coleta assistida por um técnico.</li> <li>- Atenção! Preencher questionário.</li> </ul> <p>- No caso de paciente menor de 18 anos, é necessário a assinatura do menor e do responsável</p>	<p>Não</p>
<p style="text-align: center;">Jejum obrigatório desejável de 4 horas.</p> <p>Para realização do exame é importante informar a idade e a hipótese diagnóstica.</p>	<p>Não</p>
<p style="text-align: center;"><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>

<p style="text-align: center;"><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p style="text-align: center;">Não</p>
<p style="text-align: center;">Jejum obrigatório de 8 horas. Informar o uso de qualquer medicamento e dados clínicos disponíveis.</p>	<p style="text-align: center;">Não</p>
<p style="text-align: center;">- 1ª urina da manhã ou reter no mínimo 4 h, colhida no laboratório. - Não é permitida a coleta domiciliar. - Coleta assistida por um técnico. - Atenção! Preencher questionário.</p> <p>- No caso de paciente menor de 18 anos, é necessário a assinatura do menor e do responsável É obrigatório o preenchimento completo do formulário de identificação de coleta assistida juntamente com o cliente.</p>	<p style="text-align: center;">Não</p>
<p style="text-align: center;">- 1ª urina da manhã ou reter no mínimo 4 h, colhida no laboratório. - Não é permitida a coleta domiciliar. - Coleta assistida por um técnico. - Atenção! Preencher questionário.</p> <p>- No caso de paciente menor de 18 anos, é necessário a assinatura do menor e do responsável É obrigatório o preenchimento completo do formulário de identificação de coleta assistida juntamente com o cliente.</p>	<p style="text-align: center;">Não</p>
<p style="text-align: center;">Obrigatório envio do Questionário para exame Oncogenético. Jejum não obrigatório. Exame não consta no rol da ANS verificar autorização no plano, Horário para coleta: segunda à quinta de 7h às 21h; sexta até 12h. Não colher aos sábados ou vésperas de feriados.</p>	<p style="text-align: center;">Não</p>

<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas. Intervalo entre mamadas para lactentes.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>

<p>Jejum não obrigatório. Coleta de segunda a sexta-feira até as 12:00 horas. Não coletar em véspera de feriados.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b> Não consta no Rol da ANS verificar cobertura no plano.</p>	<p>Não</p>

<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Exame necessita de autorização do plano. Obrigatório preenchimento na coleta e envio do questionário para exames citogenéticos. Enviar junto o xerox do pedido médico. Informar a idade gestacional. Coleta apenas de segunda a quinta. Proibido coleta em véspera de feriado.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Não colher sábado ou véspera de feriado. Atenção! Preencher questionário no ato da coleta, Necessário enviar cópia do pedido médico. À equipe de marcação: é necessário autorização dos Convênioênios, incluindo USISAUDE Coleta restrita até 10:00 horas (Segunda a Sexta Feira), material de baixa estabilidade!</p>	<p>Não</p>

<p>Jejum não obrigatório.  Á equipe da marcação:  Solicitar autorização para Convênioênio da USISAUDE.  Atenção! Preencher questionário no ato da coleta e cópia do pedido médico.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas.  Informar medicamentos em uso.</p>	<p>Não</p>
<p>informar se paciente é fumante, se é exposto ocupacionalmente.  Urina recente: -Preferencialmente  1ª urina da manhã ou reter no mínimo 4 hs, colhida no laboratório.Lavar as mãos antes de colher.  - Fazer higiene da genitália com água e sabão, secar, desprezar o 1º jato de urina, coletar o jato médio em frasco próprio.  - Urina início ou final de jornada de trabalho.  - Especificar tipo de urina colhida.  - Não colher em local de trabalho.  - Retirar o uniforme de trabalho antes da coleta.  - O horário de coleta não é crítico, desde que o trabalhador esteja em trabalho contínuo nas últimas 4 semanas com afastamento maior que 4 dias</p>	<p>Não</p>
<p>As amostras deverão ser coletadas de 2ª a 5ª feira até as 12:00 horas.  Jejum não obrigatório.  Não colher às 6ª feira, sábado ou véspera feriado. Não colher Oncologia  Marcar Hemograma, se não foi solicitado.  Necessita autorização para o USIDAUDE</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>



<p>Jejum não obrigatório.</p> <p>Informar se está tomando medicamentos de nome Sandimun, Sigmasporim ou outros medicamentos que contenha Ciclosporina em sua fórmula. Informar qual a dosagem diária total e em qual horário tomou o último comprimido.</p> <p>Colher antes da próxima dose do medicamento ou conforme orientação médica.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Não realizamos a coleta do material, lavado broncoalveolar, aspirado de nasofaringe, líquido pleural e biópsia de pulmão, pois tratase de um procedimento médico.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas.</p> <p>Informar se está grávida e se já fez o exame anteriormente.</p> <p>Precisa de autorização do Usisaúde.</p>	<p>Não</p>

<p>Jejum não obrigatório ou conforme orientação médica.  Informar medicamentos em uso, dosagem, dia e hora da última dose.  A coleta ideal deve ser realizada antes da administração da próxima dose do medicamento ou conforme orientação médica.  Caso o medicamento seja tomado apenas uma vez ao dia, a coleta deve ser feita pelo menos 12 horas após a medicação.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Urina 24 horas. <span style="float: right;">Buscar orientação e</span>  frasco no laboratório, Frasco Seco (sem conservante ) e refrigerar amostra.  - Não fazer esforço físico durante a coleta.  - O cliente deve manter sua rotina diária.  - Não é necessário aumentar a ingestão de líquidos, exceto sob orientação médica.</p> <p>COLETA DOMICILIAR O TÉCNICO APENAS RECOLHE O MATERIAL.</p>	<p>Não</p>
<p>Colher preferencialmente no laboratório a 1ª urina da manhã ou com Intervalo de 4 horas entre as micções.  Fazer higiene local com água e sabão, secar, desprezar o 1º jato e coletar o jato do meio, desprezar o terceiro jato.  Utilizar frasco limpo e próprio para coleta de urina. <span style="float: right;">-Coleta realizada no laboratório.</span></p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas. <span style="float: right;">Aos sábados a coleta</span>  deste exame é realizada até as 9 horas  Informar se é exposto ocupacionalmente.  Informar se faz uso de algum medicamento.</p>	<p>Não</p>

<p>Restrição do SUS. Exame autorizado somente para pacientes internados ou em atendimento no pronto socorro. Jejum obrigatório de 8 horas.</p> <p>O paciente deverá permanecer 2 dias antes e durante a coleta sem ingerir os alimentos relacionados, pois estes alimentos interferem no resultado: café, chá, chocolates, refrigerantes, frutas em geral (especialmente manga, banana e abacate), sorvetes, sucos de frutas naturais ou artificiais, baunilha e alimentos aromatizados com vanila.</p> <p>Caso o cliente faça uso contínuo de algum dos medicamentos abaixo, deve entrar em contato com o médico assistente para avaliar a suspensão do mesmo. A suspensão, assim como o seu período, fica exclusivamente a critério do médico.</p> <p>O cliente deverá permanecer em repouso (relaxado), com o scalp no braço, por no mínimo 30 minutos em ambiente calmo.</p>	<p>Não</p>
<p>Coletar 2º jato da 1ª Urina da manhã.</p>	<p>Não</p>
<p>Colher urina após retenção urinária de 4 horas .</p> <p>Fazer higiene da genitália com água e sabão, secar, desprezar o 1º jato de urina, coletar o jato médio em frasco próprio.</p> <p>Não colher em local de trabalho.</p> <p>Retirar o uniforme de trabalho antes da coleta</p> <p>Colhido em urina de 24 horas se o médico solicitar, (Buscar orientações no laboratório).</p> <p>Informar se é exposto ocupacionalmente.</p> <p>Informar medicamentos em uso.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>

<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Procedimento de alto custo, solicitar autorização dos convênios.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. O uso de Carbamazepina pode interferir na análise do Diazepam e Nordiazepam. A coleta deve ser realizada antes da administração da próxima dose ou conforme orientação médica. No momento do cadastro informar os medicamentos em uso.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>

<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Obrigatório questionário para testes genéticos.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>- Fezes recente a fresco. Antes de coletar as fezes, se necessário, urinar no vaso sanitário para evitar a contaminação do material. Em casos de crianças utilizar coletor de urina, se necessário. Evitar o uso de laxantes ou supositórios no mínimo 3 dias antes e no dia da coleta das fezes ou conforme orientação médica. Defecar em vasilhame limpo e seco. Retirar frações de fezes em diferentes partes do bolo fecal (início, meio e fim) e colocar em frasco fornecido pelo laboratório ou adquirido em farmácia, sem líquido conservante, de modo que complete pelo menos meio frasco. Procedimento não consta no rol da ANS, verificar cobertura do plano.</p>	<p>Não</p>

Jejum não obrigatório.	Não
Jejum não obrigatório.	Não
Jejum não obrigatório.	Não
Jejum não obrigatório.	Não
Jejum não obrigatório.	Não

<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas. Não coletar nas sextas de tarde, aos sábados, domingos e véspera de feriados.</p>	<p>Não</p>

Jejum obrigatório desejável de 4 horas.	Não
Jejum obrigatório de 8 horas.	Não
Jejum obrigatório de 4 horas ou conforme orientação do médico. Informar medicamentos em uso, dosagem, dia e hora da última dose. A coleta ideal deve ser realizada antes da administração da próxima dose do medicamento ou conforme orientação médica. Caso o medicamento seja tomado apenas uma vez ao dia, a coleta deve ser feita pelo menos 12 horas após a medicação.	Não
Jejum obrigatório desejável de 4 horas.	Não
Jejum não obrigatório.	Não



<p>Material: Esperma.          Não precisa de abstinência.          Antes da coleta, urinar e higienizar as mãos e o pênis usando água e sabão, distendendo todo o prepúcio.          Enxaguar abundantemente com água e secar o pênis cuidadosamente com toalha limpa.          Não colher em preservativos, não usar lubrificantes (inclusive saliva) e não colher através de coito interrompido (relação sexual interrompida).          A forma de coleta do material é por masturbação, sem que haja perda do material.          Colher o material diretamente no frasco estéril.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas.☒</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.          Obrigatório o envio do Questionário para cariótipos e FISH e cópia do pedido médico.          Colher de Segunda a Quinta normalmente, e SextaFeira até as 11:00 horas.          Não colher aos sábados ou vésperas de feriados.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 4 horas.          Exige guia autorizada para convênio da PM.</p>	<p>Não</p>

<p style="text-align: center;"><b>Jejum não obrigatório.</b></p> <p>- Informar medicamentos em uso ou que usou nas últimas duas semanas.</p> <p>Antes da coleta, o cliente deverá suspender o uso de medicamentos inibidores da bomba protonica (omeprazol e correlatos) por um período mínimo de 7 dias e desejável de 14 dias ou conforme orientação médica.</p> <p>Medicamentos bloqueadores H2 (cimetidina, ranitidina e correlatos) devem ser suspensos por um período mínimo de 4 dias e desejável de 7 dias ou conforme orientação médica.</p> <p>Informar medicamentos em uso ou que usou nas últimas duas semanas.</p>	Não
<p style="text-align: center;">Jejum não obrigatório.</p> <p style="text-align: center;">Não consta no Rol de cobertura da ANS.</p>	Não
<p style="text-align: center;">Jejum não obrigatório.</p> <p>Necessário autorização do convênio: pegar guia e senha.Exame com diretriz de utilização necessário verificar no plano.</p>	Não
<p style="text-align: center;">Jejum obrigatório de 4 horas.</p>	Não
<p style="text-align: center;">Jejum obrigatório de 4 horas.</p>	Não

<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Não consta no Rol de cobertura da ANS.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>

<p>Jejum não obrigatório. Marcar Hemograma, se não foi solicitado e indicação clínica para a realização doExame.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Não consta no Rol de cobertura da ANS.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório Convênio. Usisaúde: pegar guia e senha. Exame possui diretriz de utilização solicitar autorização para planos que seguem rol da ANS.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>

<p>Colher preferencialmente no laboratório a 1ª urina da manhã ou com intervalo de 4 horas entre as micções.</p> <p>Fazer higiene local com água e sabão, secar, desprezar o 1º jato e coletar o jato do meio, desprezar o terceiro jato.</p> <p>Utilizar frasco limpo e próprio para coleta de urina.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.</p> <p>Exame necessita de autorização (somente guia e senha).</p> <p>Não colher às 6ª feira, sábado ou véspera feriado.</p> <p>Exame colhido de 2ª a 5ª feira.</p> <p>A coleta deve ser realizada até 11 horas. Obrigatório envio do questionário para exame Oncohematológico.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.</p> <p>É necessário o envio de carga viral para a realização do exame de até 30 dias.</p> <p>Colher de Segunda a Quinta normalmente, e SextaFeira até as 11:00 horas.</p> <p>Não colher aos sábados ou vésperas de feriados.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.</p> <p>À equipe de marcação presencial:</p> <p>Conv. Usisaúde solicitar guia e senha</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.</p> <p>Convênio. Usisaúde solicitar guia e senha</p>	<p>Não</p>

<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Enviar pedido médico. Obrigatório questionário para testes genéticos.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas. A coleta ideal deve ser realizada imediatamente antes da administração da próxima dose do medicamento ou conforme orientação médica.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas. Informar medicamentos em uso.</p>	<p>Não</p>

<p>Jejum não obrigatório. Exame possui DUT para cobertura, necessita de autorização.</p>	<p>Não</p>
<p>Colher urina após retenção urinária mínima de 4 horas. Lavar as mãos, fazer higiene da genitália com água e sabão, secar, desprezar o 1º jato de urina e coletar o jato médio em frasco próprio. A urina pode ser de início ou final de jornada de trabalho, conforme pedido médico. Recomenda-se coletar material do final da última jornada de trabalho da semana.</p>	<p>Não</p>
<p>Informar medicamentos em uso. A coleta deve ser realizada imediatamente antes da administração da próxima dose ou conforme orientação médica. Jejum não obrigatório ou conforme orientação médica.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas. Intervalo máximo entre as mamadas para lactentes. Não consta no Rol de cobertura da ANS. PARTICULAR para todos os convênios.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas. Intervalo entre mamadas para lactentes.</p>	<p>Não</p>

Jejum obrigatório de 8 horas.	Não
Jejum obrigatório de 8 horas.	Não
Coleta de 07.00 as 11.00 Procedimento necessita de autorização do plano. Obrigatório envio cópia do pedido médico e questionário. Mínimo de 08 horas sem higiene local para coleta peniana, anal ou genitália externa feminina. Se coleta uretral, permanecer 4 horas sem urinar. Não estar menstruada. Aguardar 48 horas após o término da menstruação para realizar a coleta; Nas 72 horas que antecedem a coleta: . Não fazer exame digital (toque) ou assepsia endovaginal; . Manter abstinência sexual; Não usar creme/óvulo vaginal, ducha ou realizar lavagem interna (endovaginal).	Sim
Jejum não obrigatório. A coleta do material é um procedimento médico .	Não
Jejum obrigatório de 4 horas.	Não



<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Solicitar autorização no plano.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Não consta no Rol de cobertura da ANS.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas.</p>	<p>Não</p>
<p>Urina dever ser coletada o mais próximo possível ao exame Coletar em frasco estéril a primeira urina da manhã após higienização da genitália. - Usar apenas frascos e tubos estéreis. Até 1 hora em temperatura ambiente. Até 72 horas entre 2 e 8 °C.</p>	<p>Não</p>

<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. A coleta do material líquido é um procedimento médico.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas. Procedimento necessita de autorização do plano.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>

<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas. Intervalo entre mamadas para lactentes.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 4 horas. A coleta ideal deve ser realizada imediatamente antes da administração da próxima dose do medicamento ou conforme orientação médica. Caso o medicamento seja tomado apenas uma vez ao dia, a coleta deve ser feita pelo menos 12 horas após a medicação. Não consta na tabela do SUS encaminhar paciente a secretaria de saúde para solicitar autorização.</p>	<p>Não</p>

<p>Jejum obrigatório de 8 horas. Intervalo entre mamadas para lactentes.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Necessário autorização do convênio procedimento possui DUT.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 4 horas.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 12 horas. Não consta no Rol de cobertura da ANS.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 4 horas.</p>	<p>Não</p>

<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas ou a critério médico.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas ou a critério médico.</p>	<p>Não</p>

Jejum obrigatório de 8 horas ou a critério médico.	Não
Jejum não obrigatório. Informar medicamentos em uso.	Não
Jejum não obrigatório. Informar medicamentos em uso.	Não
Jejum não obrigatório. Exame não consta no Rol da ANS, verificar cobertura do plano.	Não
Colher urina após retenção mínima de 4 horas. Lavar as mãos, fazer higiene da genitália com água e sabão, secar, desprezar o 1º jato de urina e coletar o jato médio em frasco próprio. Colher urina no final de jornada de trabalho. Recomenda-se evitar a primeira jornada da semana.	Não

<p>Jejum obrigatório de 8 horas. Intervalo entre mamadas para lactentes.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum recomendável de 4 horas.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Preencher Questionários para testes genéticos.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 12 horas. Exame não consta no Rol da ANS, verificar cobertura do plano.</p>	<p>Não</p>
<p>Seguir orientação do laboratório. <b>Urina recente:</b> - Colher 1ª urina da manhã ou urina com o mínimo de 4 horas de retenção urinária - Fazer higiene local com água e sabão, secar, desprezar o 1º jato e coletar o jato do meio. <b>Urina de 12 horas:</b> Coletada em frasco limpo e seco (sem conservante), refrigerar durante toda coleta. Manter a urina refrigerada durante todo o procedimento de coleta. - Não fazer esforço físico durante a coleta. - O cliente deve manter sua rotina diária. - Não é necessário aumentar a ingestão de líquidos, exceto sob orientação médica. - Entregar a urina no laboratório no mesmo dia do término da coleta. <b>Urina de 24 horas:</b> Coletada em frasco limpo e seco (sem conservante), refrigerar durante toda</p>	<p>Não</p>

<p>Jejum não obrigatório. Não consta no Rol de cobertura dos Convênios.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b> Não consta no Rol da ANS verificar cobertura no plano.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 4 horas. Não consta no Rol de cobertura da ANS.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Observação para equipe de marcação: Não consta no Rol de cobertura da ANS, verificar no plano Código CBHPM 40324338 IgG e 40324346 IGM</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório desejável de 4 horas. Exame colhido somente de 2ª a 4ª feira até as 12:00. Não deve ser colhido e aceito nos feriados ou em vésperas de feriados. Não consta no Rol de cobertura da ANS. Informar medicamento em uso. É obrigatório informar dados clínicos, data e horário da coleta.</p>	<p>Não</p>



<p><b>Jejum não obrigatório.</b> Não consta no Rol da ANS verificar cobertura no plano.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b> Exame consta no Rol da ANS, porém é necessário verificar cobertura nos planos.</p>	<p>Não</p>
<p>O paciente não deve estar em uso de medicamentos tópicos. A sensibilidade do exame é muito baixa quando a coleta é feita em lesões após a eclosão das vesículas. Informar medicamentos em uso.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b> Marcação presencial: exame não consta na tabela de cobertura da Polícia Militar verificar junto ao IPSM.</p>	<p>Não</p>

<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Não consta no Rol de cobertura da ANS.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Não consta no Rol de cobertura da ANS.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Não consta no Rol de cobertura da ANS.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>



<p>Exame não consta no rol da ANS, verificar cobertura no plano. É necessário solicitar kit, verificar no laboratório. Se concurso verificar o nº de inscrição e edital. Cabelo ou pelos, conforme a janela de detecção informada no edital.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum alimentar obrigatório de 4 horas ou conforme orientação do médico. A coleta ideal deve ser realizada imediatamente antes da administração da próxima dose do medicamento ou conforme orientação médica. Informar medicamentos em uso, dosagem, dia, hora da última dose. Caso o medicamento seja tomado apenas uma vez ao dia, a coleta deve ser feita pelo menos 12 horas após a medicação.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 4 horas.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 4 horas. E obrigatório o preenchimento do questionário pelo médico da paciente.</p>	<p>Não</p>

<p>Jejum obrigatório de 8 horas. Intervalo entre mamadas para lactentes. Não consta no Rol da ANS verificar cobertura no plano.</p>	<p>Não</p>
<p>Colher urina após retenção urinária mínima de 4 horas, colhida no laboratório. Lavar as mãos, fazer higiene da genitália com água e sabão, secar, desprezar o 1º jato de urina e coletar o jato médio em frasco próprio. Colher urina ao final do último dia da jornada de trabalho da semana. Evitar a primeira jornada de trabalho da semana.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 4 horas.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Exame com diretriz de utilização, deve solicitar autorização do plano. Não colher às 6ª feira, sábado ou véspera feriado.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Não consta no Rol de cobertura da ANS.</p>	<p>Não</p>

<p>Jejum obrigatório de 8 horas. Intervalo entre mamadas para lactentes. Informar se esta grávida e se já fezExame anteriormente.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas. Intervalo entre mamadas para lactentes. Informar se esta grávida e se já fezExame anteriormente.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. É obrigatório pedido médico. O comprimido de dexametasona é fornecido pelo laboratório, juntamente com o formulário de instruções. Em caso de crianças, a dose a ser administrada deve ser prescrita pelo médico solicitante.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Não consta no Rol de cobertura da ANS. É obrigatório enviar questionário e termo de consentimento Questionário para testes genéticos.</p>	<p>Não</p>

<p>Jejum não obrigatório. Para pesquisa de microfilárias, o período ideal para coleta está entre 22:00 e 4:00 horas.</p>	Não
<p>Colher urina após retenção urinária de 4 horas. Fazer higiene da genitália com água e sabão, secar, desprezar o 1º jato de urina, coletar o jato médio em frasco próprio. Colher preferencialmente durante as últimas 4 horas da jornada de trabalho. Informar se é urina início ou final de jornada, quando for exposição ocupacional. Informar se paciente é exposto.</p>	Não
<p>Fezes recente a fresco. Antes de coletar as fezes, se necessário, urinar no vaso sanitário para evitar a contaminação do material. Em casos de crianças utilizar coletor de urina, se necessário. Defecar em vasilhame limpo e seco sem conservante. Entrega do material de segunda a quinta normalmente e sexta até 12:00 horas.</p>	Não
<p>Sangue: Jejum não obrigatório.</p>	Não
<p>Jejum obrigatório de 8 horas. Exame não consta no Rol da ANS, verificar autorização nos planos.</p>	Não

<p>Urina 24 horas (Frasco Âmbar com Bicarbonato de Sódio). Buscar orientação e frasco (frasco âmbar) no laboratório. Encaminhar paciente ao laboratório. Não entregar dias de sexta, sábado e préferiado prolongado (estabilidade da amostra= 2 dias).</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Exame não consta no rol da ANS, verificar cobertura no plano.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório desejável de 8 horas.</p>	<p>Não</p>
<p>A coleta ideal deve ser realizada imediatamente antes da administração da próxima dose do medicamento ou conforme orientação médica. Caso o medicamento seja tomado apenas uma vez ao dia, a coleta deve ser feita pelo menos 12 horas após a medicação. Informar medicamentos em uso. Jejum obrigatório de 4 horas.☒</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas. Exame não consta no rol da ANS, verificar cobertura do plano.</p>	<p>Não</p>



<p>Vermes adultos, larvas ou fragmentos de vermes isolados ou juntamente com as fezes.</p> <p>Colher em frasco limpo, adicionando salina ou formol a 10% para verme adulto de origem intestinal e fragmentos isolados de origem intestinal. Não utilizar álcool, pois ele pode desidratar a amostra dificultando a realização do exame. Recolher frasco e orientação no laboratório.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas.</p> <p>Não consta no Rol de cobertura da ANS.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 4 horas.</p> <p>Não consta no Rol de cobertura da ANS.</p>	<p>Não</p>
<p>Não realizamos a coleta, pois tratase de um procedimento médico.</p>	<p>Não</p>
<p>Repouso de 30 minutos para quem fez exercício físico.</p> <p>Jejum não obrigatório.</p> <p>Se solicitado Macroprolactina e Prolactina, marcar somente MACROPROLACTINA, pois nesseExame é liberado o resultado da Prolactina.</p>	<p>Não</p>

<p>A coleta do material líquor é um procedimento médico.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 12 horas ou conforme orientação médica. Exame não consta no Rol de cobertura dos planos.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas. É desejável que o paciente não esteja usando anticoagulante oral por pelo menos 2 semanas e heparina por 48 horas. A suspensão de qualquer medicação deverá ser feita apenas com a autorização do médico responsável pelo paciente.</p>	<p>Não</p>
<p>A triagem neonatal deve ser coletada preferencialmente entre o 3° a 5° dia de vida, podendo ser realizada entre zero e 28 dias de vida.</p>	<p>Não</p>
<p>Fezes recente a fresco em frasco sem conservante. Aproximadamente metade do frasco de fezes (frasco próprio).</p>	<p>Não</p>

<p>Jejum obrigatório de 8 horas.</p>	<p>Não</p>
<p>A triagem neonatal deve ser coletada preferencialmente entre o 3° a 5° dia de vida, podendo ser realizada entre zero e 28 dias de vida. Jejum: Intervalo máximo entre as refeições.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Exame com diretriz de utilização, verificar cobertura no plano. Atenção se no pedido médico estiver solicitando Hemocromatose Plus HEMOP, não é necessário marcar o HEMOC, pois o Plus contempla as mutações C282Y, H63D e S65D. Preencher questionário.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>

<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Urina recente. Fazer higienização da genitália com água e sabão neutro, antes de efetuar a coleta da urina. Desprezar o primeiro jato e colher o jato médio da urina. Exame não consta no Rol de cobertura dos convênios.</p>	<p>Não</p>
<p>Fezes recente em frasco estéril .Entregar em até 2 horas após a coleta. Não consta no Rol de cobertura da ANS, verificar no plano.</p>	<p>Não</p>

<p>Amostras de sangue: jejum não obrigatório. Procedimento não consta no rol de cobertura da ANS, verificar nos planos. Código CBHPM: 40314375</p>	<p>Sim</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas Intervalo entre mamadas para lactentes. Não consta no Rol de cobertura.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Exame com diretrizes de utilização necessita de autorização do plano.</p>	<p>Não</p>
<p>Abstinência sexual de 2 a 7 dias. Não consta no Rol de cobertura da ANS. Marcar Espermograma, se não solicitado no pedido médico.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Informar se paciente está grávida. Caso a resposta seja afirmativa, Informar a idade gestacional.</p>	<p>Não</p>

<p>Jejum obrigatório 8 horas. Intervalo máxima entre mamadas para lactentes. Solicitar autorização do plano.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório desejável de 4 horas. Indicar o peso e altura no campo observação. Não consta no Rol de cobertura dos Convênioônios</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas. Não consta no Rol de cobertura da ANS. Informar medicamentos em uso. Não ingerir bebida alcoólica nas últimas 24 horas. Colher apenas de 2ª a 6ª feira. Não colher em véspera de feriados.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Obrigatório informar nome dos medicamentos em uso. Exame não consta no Rol de cobertura.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Exame não consta no Rol de cobertura da ANS;</p>	<p>Não</p>

<p><b>Jejum não obrigatório.</b> Não consta no Rol da ANS verificar cobertura no plano.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Não consta no Rol de cobertura da ANS. Não corresponde ao Exame AntiMOG</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Não consta no Rol de cobertura da ANS. Não corresponde ao Exame AntiMOG</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas.</p>	<p>Não</p>

<p>Seguir orientação do laboratório.      Tecido capilar.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 12 horas. Coletar somente na 2ª e 3ª feira. Não consta no Rol de cobertura da ANS.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Não consta no Rol de cobertura da ANS.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Colher de 2ª a 5ª feira até as 12:00. Não consta no Rol de cobertura da ANS, verificar cobertura no plano.</p>	<p>Não</p>
<p>Não consta no Rol de cobertura dos convênios. 1ª urina da manhã ou reter no mínimo 4 hs, colhida no laboratório. Coleta assistida por um técnico. No caso de paciente menor de 18 anos, é necessário a assinatura do menor e do responsável. Detecção após exposição: 1 a 3 dias.</p>	<p>Não</p>



<p>Jejum obrigatório de 8 horas. Informar o uso de qualquer medicamento e dados clínicos disponíveis. Exame não consta no Rol da ANS.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Não consta no Rol de cobertura da ANS.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Exame não consta no Rol de cobertura dos Convênios.</p>	<p>Não</p>
<p>Urina recente: Colher a 1ª urina da manhã ou urina com o mínimo de 4 horas de retenção urinária. Fazer higiene local com água e sabão, secar, desprezar o 1º jato e coletar o jato do meio. Utilizar frasco protegido da luz (âmbar). Urina 24 horas: Buscar orientação e frasco (frasco âmbar) no laboratório. Encaminhar paciente ao laboratório.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Não consta no Rol de cobertura da ANS.</p>	<p>Não</p>

<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas. Não consta no Rol de cobertura da ANS.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas. Não consta no Rol de cobertura da ANS.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.</p> <p>A coleta do material líquor é um procedimento médico.</p>	<p>Não</p>

<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Exame com diretriz de utilização, verificar cobertura no plano. Atenção: Se no pedido médico estiver solicitando Hemocromatose Plus, não é necessário marcar o S65C, pois oExame PLUS contempla as mutações S65C, C282Y e H63D.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b> Não consta no Rol da ANS verificar cobertura no plano.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Informar se é exposto ocupacionalmente. Informar se faz uso de algum medicamento. Exame não consta no Rol de cobertura da ANS;</p>	<p>Não</p>

<p>Jejum obrigatório de 8 horas.          Não consta no Rol de cobertura dos Convênioênios.          O paciente deverá permanecer 24 horas sem ingerir os alimentos relacionados, pois estes interferem no resultado: abacate, ameixa, banana, berinjela, chocolate, frutos secos, mexilhões, nozes, pickles, tomate.          O paciente deverá permanecer 7 dias sem ingerir os seguintes medicamentos conforme orientação do seu médico assistente: Paracetamol, Guafenesin, Imipramina, Inibidores da MAO, Lítio, Metildopa, Morfina, Naproxeno (Naprosyn), Reserpina.</p>	<p>Não</p>
<p>A triagem neonatal deve ser coletada preferencialmente entre o 3° a 5° dia de vida, podendo ser realizada entre zero e 28 dias de vida.          Jejum: Intervalo máximo entre as mamadas.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.          Informar medicamentos em uso e, se mulher, Informar se esta grávida ou se usa anticoncepcional. Informar qualquer outro medicamento que usa ou usou recentemente, inclusive fórmulas para emagrecer (Triostat, Thevier).</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 4 horas ou conforme orientação médica.          Intervalo entre mamadas para lactentes.          A coleta ideal deve ser realizada imediatamente antes da administração da próxima dose do medicamento ou conforme orientação médica.          A meio vida é variável: de 4 até mais de 16 horas.          Caso o medicamento seja tomado apenas uma vez ao dia, a coleta deve ser feita pelo menos 12 horas após a medicação.          Informar medicamentos em uso, dia e hora da última dose.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório desejável de 8 horas ou conforme orientação médica.          Coletar preferencialmente antes da próxima dose do medicamento ou conforme orientação médica.</p>	<p>Não</p>

<p>Jejum não obrigatório. Não colher vésperas de feriado prolongado.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 4 horas. Se grávida, Informar tempo de gestação. Não colher vésperas de feriado prolongado.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Marcar hemograma, se não foi solicitado.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas. Não consta no Rol de cobertura da ANS.</p>	<p>Não</p>

<p>A coleta ideal deve ser realizada imediatamente antes da administração da próxima dose do medicamento ou conforme orientação médica.</p> <p>Caso o medicamento seja utilizado apenas uma vez ao dia, a coleta deve ser efetuada no mínimo 12 horas após a última dose (12 a 24 horas após tomada).</p> <p>Jejum não obrigatório.</p> <p>Informar medicamentos em uso, dia e hora da última dose.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>

<p>Jejum não obrigatório . Plasma (Heparina) + urina recente Coleta permitida somente segunda a terça feira de manhã.</p>	<p>Não</p>
<p>Não utilizar quimioterápicos durante 7 dias que antecedem oExame. A suspensão fica exclusivamente a critério do médico. Não consta no Rol de cobertura da ANS. Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>
<p>Refrigerar a urina desde o início da coleta. Não fazer esforço físico durante a coleta. O cliente deve manter sua rotina diária. Não é necessário aumentar a ingestão de líquidos, exceto sob orientação médica.</p>	<p>Não</p>
<p>Refrigerar a urina desde o início da coleta. Não fazer esforço físico durante a coleta. O cliente deve manter sua rotina diária. Não é necessário aumentar a ingestão de líquidos, exceto sob orientação médica.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>

<p>A coleta do material líquor é um procedimento médico.</p>	<p>Não</p>
<p>1ª urina da manhã ou reter no mínimo 4 horas. Não consta no Rol de cobertura da ANS.</p>	<p>Não</p>
<p>Não consta no Rol de cobertura da ANS. Jejum não obrigatório. Informar medicamento em uso.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Não consta no Rol de cobertura da ANS.</p>	<p>Não</p>



<p>Urina recente: Colher o jato médio da urina com retenção de 4 horas entre as micções.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Não colher em local de trabalho.</li> <li>- Retirar o uniforme antes da coleta.</li> <li>- Lavar as mãos e genitália antes de colher.</li> <li>- Colher urina de início ou final de jornada de trabalho.</li> </ul> <p>Urina de 24 horas: buscar frasco e orientações no laboratório. Se criança até 10 anos, Informar peso e altura.</p>	<p>Não</p>
<p>Exame não necessita de preparo. Não consta no Rol de cobertura da ANS. Informar medicamentos em uso (o cliente não deve estar usando GNRH ou medicação imunossupressora).</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum de pelo menos 8h Colher pela manhã Não consta no roll de cobertura, verificar autorização no plano.</p>	<p>Não</p>
<p>Não colher às 6ª feira, sábado ou véspera de feriado Necessário autorização da PASA/VALE, USISAUDE.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>

Jejum não obrigatório.	Não
Jejum não obrigatório.	Não
Exame não necessita de preparo.	Não
Exame não necessita de preparo.	Não
Jejum não obrigatório.	Não

<p>Material coletado pelo médico      Líquor</p>	<p>Não</p>
<p>Material coletado pelo médico      Líquor</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Não consta no Rol de cobertura da ANS.</p>	<p>Não</p>
<p>Trazer cópia do laudo Histopatológico. Exame realizado em material anatomopatológico. Verificar cobertura no plano Obrigatório envio do questionário para exame de Oncologia Molecular.</p>	<p>Não</p>
<p>Não consta no Rol de cobertura da ANS. Encaminhar paciente ao plano para verificar cobertura. Biopsia fixada em bloco de parafina. A amostra deverá ser, obrigatoriamente, acompanhada de uma cópia do laudo histopatológico e pedido medico.</p>	<p>Não</p>

<p>Jejum obrigatório de 12 horas. Não consta no Rol de cobertura da ANS.</p>	<p>Não</p>
<p>Urina de amostra isolada. Colher preferencialmente no laboratório a 1ª urina da manhã ou com intervalo de 4 horas entre as micções. Fazer higiene da genitália com água e sabão, secar, desprezar o 1º jato de urina e coletar o jato do meio.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Não consta no Rol de cobertura dos convênios. Não colher sábado ou feriado.</p>	<p>Não</p>
<p>Exame necessita de autorização do plano. Possui diretriz de utilização. Material de aborto ou restos ovulares + sangue total em EDTA da mãe.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Intervalo entre mamadas para lactentes.</p>	<p>Não</p>

<p>Não consta no Rol de cobertura da ANS. Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Não consta no Rol de cobertura da ANS. Coleta no período da manhã.</p>	<p>Sim</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>

<p>Não realizamos a coleta do material, pois tratase de um procedimento médico.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Volume recomendavel: aproximadamente metade do frasco. Coleta em pote limpo e seco, refrigerar a amostra imediatamente após a coleta. Véspera de feriado: verificar possibilidade de coleta. Não consta no Rol de cobertura da ANS, verificar cobertura no plano. Código CBHPM: 40303330</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório Não consta no Rol de cobertura dos convênios</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 4 horas. Não consta no Rol de cobertura da ANS.</p>	<p>Não</p>

Jejum não obrigatório. Não consta no Rol de cobertura da ANS.	Não
Fezes recente, sem conservante; Véspera de feriado: verificar possibilidade de coleta; Até 2 horas após a coleta em temperatura ambiente.	Não
<b>Jejum não obrigatório.</b>	Não
Exame não necessita de preparo.	Não
<b>Jejum não obrigatório.</b>	Não

Não realizamos a coleta do material pois tratase de um procedimento médico.	Sim
Jejum não obrigatório.	Não
Jejum não obrigatório.	Não
Jejum obrigatório de 8 horas.	Não
Jejum não obrigatório.	Não



<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Líquor: Material deve ser coletado pelo médico. Verificar cobertura do plano.</p>	<p>Sim</p>
<p>Jejum não obrigatório. Exame não consta no Rol da ANS, verificar cobertura no plano.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>A coleta deve ser realizada pelo médico.</p>	<p>Sim</p>

<p>Jejum não obrigatório. Exame de alto custo necessita autorização do plano</p>	<p>Não</p>
<p>Amostras de sangue: jejum não obrigatório. Exame consta no rol da ANS, porém necessita de autorização do plano. A coleta dos materiais líquor, líquido amniótico, fragmento de biópsia, lavado brônquico alveolar são procedimentos que devem ser colhidos pelos médicos.</p>	<p>Não</p>
<p>Sangue: Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Colhido de segunda a quarta-feira. Indicado para mulheres que se encontrem a partir da 10ª semana de gestação, incluindo por fertilização in vitro, com ou sem doação de óvulos. Obrigatório o questionário do exame preenchido pelo médico. Obrigatória a assinatura do médico no questionário ou o envio do pedido médico. Obrigatório o envio da copia do RG e CPF do paciente.</p>	<p>Sim</p>
<p>Jejum não obrigatório. Questionário e termo de consentimento obrigatório. Colhido de segunda a quarta-feira. Obrigatório o questionário do exame preenchido pelo médico. Obrigatória a assinatura do médico no questionário ou o envio do pedido médico. Obrigatório o envio da copia do RG e CPF do paciente.</p>	<p>Sim</p>

<p>Biopsia fixada em bloco de parafina. A amostra deverá ser, obrigatoriamente, acompanhada de uma cópia do laudo histopatológico e pedido medico.</p>	<p>Sim</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Exame não consta no Rol de cobertura. Jejum não obrigatório</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório Coletas realizadas de segunda à quarta-feira até 12:00. Não devem ser coletadas em véspera de feriados. Antes do agendamento, deve-se entrar em contato com o Laboratório HMC I para disponibilização do material necessário à coleta.</p>	<p>Sim</p>

<p>Líquido amniótico. Idade Gestacional recomendada entre 15 e 20 semanas de gestação. Informar idade gestacional. Enviar cópia do pedido médico e questionário obrigatório para cariótipos e FISH.</p>	<p>Sim</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Estabilidade: Até 72 horas.</p>	<p>Não</p>

<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Não consta no Rol de cobertura da ANS.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b> Questionários para testes genéticos. Enviar pedido médico. Exame não consta no Rol de cobertura dos planos;</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Necessita de autorização do plano.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>

<p style="text-align: center;"><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p style="text-align: center;">Não</p>
<p style="text-align: center;">Verificar cobertura do plano. Jejum não obrigatório.</p> <p style="text-align: center;">Sangue total (EDTA) + Fragmento de tumor coloretal em bloco de parafina. É obrigatório enviar cópia do relatório do exame anatomopatológico com o bloco. É obrigatório o envio do termo de declaração intitulado TERMO DE CIÊNCIA PARA AMOSTRAS ESPECIAIS BLOCO DE PARAFINA (disponível no link Formulários e Questionários Obrigatórios) informando estar ciente de que pode não ser possível obter o DNA deste material e que neste caso, o valor pago pelo exame não será devolvido. Preencher questionário para exame de Oncologia Molecular.</p>	<p style="text-align: center;">Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. <span style="float: right;">É obrigatório o envio de pedido médico para realização deste exame.</span></p> <p style="text-align: center;">Exame não consta no rol de cobertura da ANS, verificar cobertura do plano. Exame colhido somente de 2ª a 4ª feira. Não deve ser colhido e aceito em feriados ou véspera de feriados.</p>	<p style="text-align: center;">Não</p>
<p style="text-align: center;">Não é necessárioJejum.</p>	<p style="text-align: center;">Não</p>
<p style="text-align: center;">Não colher logo após alimentação. <span style="float: right;">Jejum não obrigatório.</span> Não consta no rol, solicitar autorização do plano</p>	<p style="text-align: center;">Não</p>

<p>Jejum não obrigatório. Exame incluso no Rol da ANS com DUT, verificar cobertura no plano. O exame deve ser realizado na fase aguda de viremia, pois após este período pode ocorrer a não detecção de copias virais, impossibilitando a detecção do vírus.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Necessário solicitar autorização do plano.</p>	<p>Não</p>
<p>Não colher durante episódio diarréico. Exame realizado somente de 2ª a 5ª feira (não colher véspera de feriado). Conservação da amostra: À temperatura ambiente até 2 horas após a coleta. Aceitável até 24 horas após a coleta se refrigerado entre 2 a 8 C. usar, laxantes ou supositório. Defecar em vasilhame limpo e seco. Retirar frações de fezes em diferentes partes do bolo fecal (início, meio e fim) e colocar em frasco fornecido pelo laboratório ou adquirido em farmácia, sem líquido conservante, de modo que complete pelo menos 1/4 do frasco. COLETA DOMICILIAR O TÉCNICO APENAS RECOLHE O MATERIAL.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>

<p style="text-align: center;"><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p style="text-align: center;">Não</p>
<p style="text-align: center;">Exame não consta no Rol de cobertura verificar com plano.  Jejum não obrigatório. Estabilidade : até 2 dias refrigerados.  Exame colhido somente de 2ª a 5ª feira ate as 13:00 horas. Não colher nos feriados e vésperas de feriados.  Não enviar as sextas, sábados, feriados e vésperas de feriados.</p>	<p style="text-align: center;">Não</p>
<p style="text-align: center;">Jejum não obrigatório.  Exame fora do Rol da ANS verificar cobertura no plano.  Informar medicamentos em uso (inclusive pomadas e cremes).  Para mulher (informar uso de anticoncepcional).  Informar dia e hora da última medicação.</p>	<p style="text-align: center;">Não</p>
<p style="text-align: center;">Não consta no Rol de cobertura da ANS. Jejum não obrigatório.</p>	<p style="text-align: center;">Não</p>
<p style="text-align: center;">Não consta no Rol de cobertura. Jejum não obrigatório.</p>	<p style="text-align: center;">Não</p>



<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b> Este exame deve ser realizado na fase aguda da viremia. Não consta no Rol de cobertura da ANS, verificar cobertura no plano.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b> Colher pela manhã. Colher preferencialmente nos primeiros 5 dias de evolução dos sintomas clínicos. Não colher sábado e véspera de feriado. Não consta no Rol de cobertura dos Convênioênios.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum obrigatório de 8 horas.</b> Não consta no Rol de cobertura.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b> Não consta no Rol de cobertura da ANS, verificar no plano.</p>	<p>Não</p>

<p style="text-align: center;"><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p style="text-align: center;">Não</p>
<p style="text-align: center;">Não consta no Rol de cobertura da ANS.</p>	<p style="text-align: center;">Não</p>
<p style="text-align: center;">Jejum não obrigatório. Exame com DUT, necessita de autorização do plano. Obrigatório laudo com a mutação familiar. Horário para coleta: segunda à quarta de 7h às 22h; quinta até 12h. Não colher às 6ª feiras, sábados ou vésperas de feriados.</p>	<p style="text-align: center;">Não</p>
<p>É necessário que o paciente busque em uma das unidades o frasco e orientação para realização da coleta de saliva. Por um período de 30 minutos antes da coleta não será permitido qualquer tipo de alimentação ou bebida (com exceção de água). Permanecer em repouso por uma hora antes da coleta. Imediatamente antes da coleta é aconselhável lavar a boca com água através de bochechos leves. A coleta não é recomendável em caso de lesões orais com sangramento ativo ou potencial. Evitar escovar os dentes pelo menos duas horas antes da coleta para evitar sangramento gengival.</p> <p style="text-align: center;"><del>Exame não consta no Rol de cobertura</del></p>	<p style="text-align: center;">Não</p>
<p style="text-align: center;"><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p style="text-align: center;">Não</p>

<p>Não consta no Rol de cobertura dos planos; Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Procedimento colhido pelo médico. Exame não consta no Rol da ANS verificar cobertura no plano. preencher Questionário Proteína 14.3.3</p> <p>Obrigatório</p>	<p>Sim</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>

<p>Não consta no Rol de cobertura da ANS. Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 3 horas. O cliente deve manter o horário habitual de tomada do medicamento e fazer oExame até uma hora antes deste horário, a não ser que existam outras orientações do médico assistente. Em caso de suspeita de intoxicação, a amostra pode ser colhida em qualquer horário e sem jejum. Não consta no Rol de cobertura da ANS, verificar cobertura no plano.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas Intervalo entre mamadas para lactentes. Não possui cobertura da ANS código CBHPM 40321258</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas. Exame incluso no Rol da ANS com DUT, verificar cobertura no plano.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas. Exame incluso no Rol da ANS com DUT, verificar cobertura no plano.</p>	<p>Não</p>

<p>Jejum obrigatório de 8 horas. Até 2 anos: colher antes da próxima alimentação.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.</p> <p>A coleta do material líquor é um procedimento médico</p>	<p>Sim</p>
<p>A coleta do material líquor é um procedimento médico.</p>	<p>Sim</p>
<p>Exame colhido somente de 2ª a 3ª feira no período da manhã. Não colher véspera de feriados. Não é necessário jejum à equipe de marcação presencial: Solicitar autorização para convênio USISAUDE</p>	<p>Sim</p>
<p>Jejum não obrigatório. Enviar questionário para testes genéticos.</p>	<p>Não</p>

<p>Jejum obrigatório de 8 horas. Exame não consta na ANS, verificar cobertura no plano.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas. Informar se a amostra biológica colhida é pré ou pós vacina.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. * É recomendável a abstinência de álcool 72 horas antes da coleta, pois o álcool, qualquer tipo ou quantidade, pode interferir no Exame. A abstinência alcoólica não é obrigatória. O cliente pode optar pela realização do Exame apesar do consumo de álcool, ou procurar orientação do seu médico.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório desejável de 4 horas. Exame não consta na ANS. Verificar cobertura do plano. Exame colhido somente de 2ª a 4ª feira. Não colher em vésperas de feriados. Estabilidade: Até 2 dias congelado.</p>	<p>Não</p>

<p>A coleta do material líquor é um procedimento médico. Jejum não obrigatório.</p>	<p>Sim</p>
<p>Para a saúde solicitar autorização          Para os outros convênios verificar cobertura do plano          Coleta uretral: colher preferencialmente pela manhã sem urinar, ou com retenção urinária de 4 horas.          Coleta de secreção endocervical:          . A paciente não deverá ter feito ducha vaginal nas 24 horas anteriores ao exame;          . Não fazer uso de desinfetantes ou medicações tópicas (caso estiver, aguardar 48 horas após o término);          . Não manter relação sexual nas últimas 24 horas anteriores ao exame;          . Não deve ter feito exame ginecológico com o uso de iodo ou ácido acético nas últimas 24 horas;          . Não estar menstruada (caso estiver, aguardar 48 horas após o término da menstruação)</p>	<p>Não</p>
<p>Urina dever ser coletada o mais próximo possível ao exame, retenção urinária de 4 horas.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.          Exame não consta no Rol da ANS. Verificar cobertura no plano.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.          Exame não consta no Rol da ANS verificar cobertura no plano.</p>	<p>Não</p>

<p>Marcação somente para convênios e particular. Jejum não obrigatório. Colher de preferência antes da próxima dose do medicamento ou conforme orientação médica. Informar medicamento em uso.</p>	<p>Não</p>
<p>Exame colhido somente de 2ª a 4ª feira até as 11:00 horas. Não deve ser colhido e aceito nos feriados ou em vésperas de feriados. Não consta no Rol de cobertura.</p>	<p>Não</p>
<p>O material é eliminado espontaneamente ou por extração cirúrgica. coleta do material trata-se de um procedimento médico Enviar todo o material colhido.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>



<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Exame não consta no Rol da ANS, verificar cobertura no plano.      Necessário preencher Questionários para testes genéticos.</p>	<p>Não</p>
<p>Exame pode ser realizado em qualquer faixa etária. Este teste não esta indicado para recémnascidos prematuros devido a imaturidade do sistema imunológico. Procedimento não consta no rol da ANS verificar cobertura no plano.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas. Até 2 anos colher antes da próxima alimentação.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Informar medicamentos em uso (inclusive pomadas e cremes).Informar dia e hora da última medicação. Para mulher (informar uso de anticoncepcional).</p>	<p>Não</p>

<p>Urina 1º jato. Coletar preferencialmente no laboratório a 1ª urina da manhã. Fazer higiene da genitália com água e sabão, secar, e coletar o 1º jato de urina em frasco estéril.</p> <p>Coleta uretral: colher preferencialmente pela manhã sem urinar, ou com retenção urinária de 4 horas.</p> <p>Coleta de secreção vaginal e endocervical:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. A paciente não deverá ter feito ducha vaginal nas 24 horas anteriores ao exame;</li> <li>. Não fazer uso de desinfetantes ou medicações tópicas (caso estiver, aguardar 48 horas após o término);</li> <li>. Não manter relação sexual nas últimas 24 horas anteriores ao exame;</li> <li>. Não deve ter feito exame ginecológico com o uso de iodo ou ácido acético nas últimas 24 horas;</li> <li>. Não estar menstruada (caso estiver, aguardar 48 horas após o término da menstruação).</li> </ul>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Coletar todo volume urinário de uma urina recente.</p> <p style="text-align: right;">Enviar</p> <p style="text-align: center;">xerox do pedido médico para o setor.</p>	<p>Não</p>
<p>A coleta do material medula óssea é um procedimento médico.</p> <p style="text-align: center;">Jejum não obrigatório.</p> <p style="text-align: center;">Informar medicamento em uso.</p> <p style="text-align: center;">Obrigatório cópia do hemograma.</p>	<p>Sim</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>

<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Preencher corretamente o formulário "Questionário para envio de HPN". Exame deverá ser colhido somente de 2ª a 5ª feira. Não colher nos feriados e vésperas de feriados.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Necessário autorização dos planos. Enviar cópia do pedido médico. Não colher véspera de feriados. Exame colhido de 2° a 5° feira (baixa estabilidade).</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>

<p>Informar o tipo de alimentação recebida pelo recém-nascido, se amamentação convencional, fórmulas infantis ou outro tipo de nutrição, tal como a parenteral, comum em recém-nascidos hospitalizados.</p> <p>Colher preferentemente do 3º ao 30º dia após o nascimento e no máximo até o 90º dia.</p>	<p>Não</p>
<p>Urina recente.</p> <p>Informar medicamentos em uso e suspeita clínica.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório;</p> <p>Se o material for Líquor, só pode ser colhido pelo médico.</p> <p>Exame não consta no Rol da ANS, verificar cobertura do plano.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.</p> <p>Exame não consta no Rol de cobertura da ANS verificar nos planos.</p>	<p>Não</p>
<p>Buscar frasco no laboratório.</p> <p>A amostra deve permanecer refrigerada e protegida da luz.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Colher em frasco protegido da luz (âmbar) e manter a urina refrigerada durante todo o procedimento de coleta. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Não fazer esforço físico durante a coleta.</li> <li>- O cliente deve manter sua rotina diária.</li> </ul> </li> <li>- Não é necessário aumentar a ingestão de líquidos, exceto sob orientação médica.</li> </ul> <p>- Mulheres não podem fazer uso de creme e/ou óvulo vaginal nas 48 horas que antecedem o exame e, idealmente, devem colher a amostra fora do período da menstruação.</p>	<p>Não</p>

<p>Não consta no Rol de cobertura da ANS. Verificar cobertura no plano.  Jejum não obrigatório.  Exame colhido somente de 2ª a 4ª feira. Não deve ser colhido e aceito em feriados ou véspera de feriados.  Exame não é realizado sem pedido médico.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Colher no laboratório a 1ª urina da manhã ou com intervalo de 4 horas entre as micções. Fazer higiene local com água e sabão, secar, desprezar o 1º jato e coletar o jato domeio.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b>  Não consta no Rol da ANS verificar cobertura no plano.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 4 horas;  Informar dados clínicos, data e horário da coleta.  Exame colhido somente de 2ª a 4ª feira. Não deve ser colhido e aceito nos feriados ou em vésperas de feriados.</p>	<p>Não</p>

<p style="text-align: center;"><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p style="text-align: center;">Não</p>
<p style="text-align: center;"><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p style="text-align: center;">Não</p>
<p style="text-align: center;">Informar se está grávida e se já fez este exame anteriormente. É recomendável que o teste no líquido seja realizado em paralelo com o soro, devido à possibilidade de contaminação do material durante a punção. A coleta do material líquido é um procedimento médico.</p>	<p style="text-align: center;">Não</p>
<p style="text-align: center;">É recomendável que o teste no líquido seja realizado em paralelo com o soro, devido à possibilidade de contaminação do material durante a punção. Informar se está grávida e se já fez este exame anteriormente.</p>	<p style="text-align: center;">Não</p>
<p style="text-align: center;">Jejum não obrigatório. Exame colhido somente de 2ª a 4ª feira. Não deve ser colhido e aceito em feriados ou véspera de feriados. Exame não é realizado sem pedido médico e o laudo é liberado em acordo com o que o médico solicitou. Preencher o formulário e termo de consentimento Estudo Genético Completo.</p>	<p style="text-align: center;">Não</p>

<p>Procedimento não consta no Rol da ANS, verificar cobertura junto as operadoras de planos. Bloco de parafina (tecido fixado e impregnado em parafina, FIP) A amostra FIP deverá ser acompanhada de uma cópia do laudo histopatológico. A amostra FIP enviada deve conter áreas suficientes e viáveis de tumor.</p>	Não
<p>Jejum não obrigatório. Procedimento não consta no Rol da ANS, verificar cobertura junto as operadoras de planos.</p>	Não
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	Não
<p>Exame possui diretriz de utilização necessário verificar cobertura no plano.</p>	Não
<p>Recémnascidos: intervalo entre as mamadas. 01 mês a 01 ano: 4 horas de jejum. 01 ano a 05 anos: 6 horas de jejum. Acima de 05 anos: 12 horas de jejum. Exame possui diretriz de utilização necessário verificar cobertura no plano. Relatar os medicamentos em uso e se paciente está em dieta especial.</p>	Não

<p style="text-align: center;"><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p style="text-align: center;">Não</p>
<p style="text-align: center;">Jejum: Intervalo máximo entre as mamadas. Colher após 72 horas do nascimento.</p> <p style="text-align: center;">Colher preferencialmente entre 3º e o 30º dia de vida e, no máximo, até o 90º dia. Coletar antes do 3º dia de vida apenas caso exista solicitação médica.</p> <p style="text-align: center;">Caso o recém-nascido tenha recebido transfusão sanguínea, Recomenda-se aguardar, no mínimo, 120 dias para a coleta da triagem neonatal para hemoglobinopatias e galactosemia. Não é permitido a marcação na UA CANAÃ no horário de 15:15 .</p>	<p style="text-align: center;">Não</p>
<p style="text-align: center;">Jejum: Intervalo máximo entre as mamadas. Colher após 72 horas do nascimento.</p> <p style="text-align: center;">Colher preferencialmente entre 3º e o 30º dia de vida e, no máximo, até o 90º dia. Coletar antes do 3º dia de vida apenas caso exista solicitação médica.</p> <p style="text-align: center;">Caso o recém-nascido tenha recebido transfusão sanguínea, Recomenda-se aguardar, no mínimo, 120 dias para a coleta da triagem neonatal para hemoglobinopatias e galactosemia. Não é permitido a marcação na UA CANAÃ no horário de 15:15 .</p>	<p style="text-align: center;">Não</p>
<p style="text-align: center;">Jejum: Intervalo máximo entre as mamadas.</p> <p style="text-align: center;">Este perfil equivale aos Exames: Fenilalanina (PKU) quantitativo, TSH neonatal, Hemoglobinopatias, Aminoácidos cromatografia qualitativa, T4 neonatal, 17 OH Progesterona neonatal, Tripsina neonatal, biotinidase neonatal, galactose total (triagem neonatal), toxoplasmose IgM neonatal, rubéola IgM neonatal, G6PD teste do pezinho, sífilis IgM neonatal, citomegalovírus IgM neonatal, Trypanossoma cruzi neonatal.</p> <p style="text-align: center;">A triagem neonatal deve ser coletada preferencialmente entre o 3º a 5º dia de vida, podendo ser realizada entre zero e 28 dias de vida. Não tem cobertura pela tabela TUSS.</p> <p style="text-align: center;">Caso o recém-nascido tenha recebido transfusão sanguínea, Recomenda-se aguardar, no mínimo, 120 dias para a coleta da triagem neonatal para hemoglobinopatias e galactosemia. Não é permitida a marcação na UA CANAÃ no horário de 15:15 .</p>	<p style="text-align: center;">Não</p>
<p style="text-align: center;">Jejum: Intervalo máximo entre as mamadas.</p> <p style="text-align: center;">Este perfil equivale aos Exames: Fenilalanina (PKU) quantitativo, TSH neonatal, Hemoglobinopatias, Aminoácidos cromatografia qualitativa, T4 neonatal, 17 OH Progesterona neonatal, Tripsina neonatal, biotinidase neonatal, galactose total (triagem neonatal), toxoplasmose IgM neonatal.</p> <p style="text-align: center;">A triagem neonatal deve ser coletada preferencialmente entre o 3º a 5º dia de vida, podendo ser realizada entre zero e 28 dias de vida. Não tem cobertura pela tabela TUSS.</p> <p style="text-align: center;">Colher preferencialmente entre 3º e o 30º dia de vida e, no máximo, até o 90º dia. Coletar antes do 3º dia de vida apenas caso exista solicitação médica.</p> <p style="text-align: center;">Caso o recém-nascido tenha recebido transfusão sanguínea, Recomenda-se aguardar, no</p>	<p style="text-align: center;">Não</p>



<p>Jejum não obrigatório.  Necessário enviar cópia do pedido médico.  Orientação para equipe da marcação presencial:  Obrigatório o envio do Questionário para cariótipos e FISH  Procedimento possui DUT necessário solicitar autorização do convênio.  Realizado de segunda a quinta normalmente e sexta até as 12horas.  Não pode ser agendado sábado, domingo ou vésperas de feriado.</p>	<p>Sim</p>
<p>Jejum não obrigatório;  À equipe de marcação:  Procedimento não consta no Rol da ANS verificar cobertura nos planos.  Código CBHPM: 40324354</p>	<p>Não</p>
<p>Este exame não é utilizado para diagnóstico de Síndrome de Turner.      Precisa de  autorização do plano.      Exame deverá ser colhido somente de 2ª a 5ª feira. Não colher nos  feriados e vésperas de feriados.</p>	<p>Sim</p>
<p>Jejum não obrigatório.  Procedimento possui DUT (diretriz de utilização) necessita de autorização do plano.  Preencher questionário genético.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>

<p>Jejum obrigatório de 8 horas. Informar medicamentos e/ou suplementos em uso; Informar exposição ocupacional. Obrigatório autorização para convenio da VALE</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas. Informar medicamentos em uso. Evitar o uso de bebida alcoólica por pelo menos 24 horas antes do teste.</p>	<p>Não</p>

<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Informar se esta grávida e se ja fez esteExame anteriormente.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Informar se esta grávida e se ja fez esteExame anteriormente.</p>	<p>Não</p>
<p>Urina recente. Informar se é urina início ou final de jornada, quando for exposição ocupacional. COLETA DOMICILIAR O TÉCNICO APENAS RECOLHE O MATERIAL</p>	<p>Não</p>
<p>Urina recente. Informar se é urina início ou final de jornada quando for exposição ocupacional. COLETA DOMICILIAR O TÉCNICO APENAS RECOLHE O MATERIAL</p>	<p>Não</p>

<p>Exame não consta no rol da ANS. Jejum obrigatório de 8 horas.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Exame não consta no Rol da ANS, verificar de cobertura dos planos;</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas. Não consta no Rol de cobertura.</p>	<p>Não</p>
<p>Urina recente. Especificar se início ou final de jornada de trabalho Especificar tipo de urina colhida (início ou final de jornada). Para urina 24h deve-se coletar em frasco SEM CONSERVANTE.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas      Informar medicamentos em uso, inclusive vitaminas.</p>	<p>Não</p>

<p>Urina 24 horas.</p> <p>Evitar medicamentos que contenham Vitamina C, 48 horas antes e durante a coleta.</p> <p>Colher urina de 24 horas utilizando conservante. Obrigatório acidificar a amostra com HCL 50%, 20 mL para cada 3 litros de urina (adultos e crianças), desde o início da coleta.</p> <p>Não colher durante o período de cólica renal.</p> <p>Não fazer esforço físico durante a coleta.</p> <p>Manter sua rotina diária.</p> <p>Não é necessário aumentar a ingestão de líquidos, exceto sob orientação médica.</p> <p>Buscar orientação (impressa) e frasco no laboratório.</p> <p>Informar medicamentos em uso.</p> <p>Informar volume urinário, horário inicial e final da coleta.</p>	<p>Não</p>
<p>Colher preferencialmente no laboratório a 1ª urina da manhã ou com intervalo de 4 horas entre as micções.</p> <p>Desprezar o 1º jato de urina e coletar o jato do meio.</p>	<p>Não</p>
<p>Coleteta Não realizada na Unidade do Canaã ( necessário medir o pH da urina.) Colher preferencialmente no laboratório a 1ª urina da manhã ou com intervalo de 4 horas entre as micções. Fazer higiene da genitália com água e sabão, secar, desprezar o 1º jato de urina e coletar o jato do meio.</p> <p>Evitar medicamentos que contenham Vitamina C, durante 48 horas antes da coleta.</p> <p>Não colher durante o período de cólica renal.</p> <p>Urina recente.</p> <p>Informar medicamento em uso.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>

Urina Recente, volume recomendável 20 mL	Não
<b>Jejum não obrigatório.</b>	Não
Sangue:Jejum não obrigatório. .	Não
<b>Jejum não obrigatório.</b>	Não
<b>Jejum não obrigatório.</b>	Não

<p>Jejum obrigatório de 8 horas.</p>	<p>Não</p>
<p>Não é necessário pedido médico. Quando for solicitação judicial, a ordem mandatória do Juízo deverá ser encaminhada junto com o exame. Agendamento: não é necessário. Exame não consta no rol da ANS, verificar cobertura no plano. É necessário solicitar kit, verificar no laboratório.</p>	<p>Sim</p>
<p>Jejum não obrigatório; Procedimento possui DUT necessário solicitar autorização para convênios que seguem o rol da ANS.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Procedimento não consta no rol da ANS, verificar cobertura no plano.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Colher antes da próxima dose da medicação ou conforme orientação médica. Necessita de autorização do Convênioênio. Estabilidade de 20 dias congelado</p>	<p>Não</p>





<p>Material coletado pelo médico : Líquor, líquido ascítico, pleural, sinovial.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Exame colhido somente de 2ª a 4ª feira. Não deve ser colhido e aceito em feriados ou véspera de feriados. Exame não consta no rol de cobertura da ANS, verificar no plano. É necessário preencher questionários para testes genéticos.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. A coleta apenas deve ser realizada a partir da 8ª semana completa de gestação (7 semanas e 7 dias). Colher de Segunda a Quinta normalmente, e SextaFeira até as 12:00 horas. Não colher aos sábados ou vésperas de feriados. <b>Particular</b></p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório; Procedimento não consta no rol da ANS; Código CBHPM: 40313360.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Procedimento com DUT (diretriz de utilização) necessário solicitar autorização do convênio. Obrigatório preenchimento do questionários para testes genéticos.</p>	<p>Não</p>

<p>Jejum não obrigatório. Procedimento não possui cobertura no rol da ANS.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Material coletado pelo médico Preenchimento obrigatório do questionário para cariótipos e FISH.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Informar medicamentos em uso.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas Para as unidades descentralizadas: coleta SOMENTE de segunda a sexta feira pela manhã. Estabilidade da amostra: 48horas ou congelado.</p>	<p>Sim</p>
<p>Urina recente Colher 1ª urina da manhã ou urina com o mínimo de 4 horas de retenção urinária Fazer higiene local com água e sabão, secar, desprezar o 1º jato e coletar o jato do meio.</p>	<p>Não</p>

<p>Jejum não obrigatório. Preencher questionários para testes genéticos. Procedimento não consta no rol da ANS, verificar cobertura no plano.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Coleta realizada até as 12hs.                      Marcar FUNGI (Antifungigrama) se houver descrição no pedido médico.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório; Procedimento não consta no rol da ANS, verificar autorização no plano.</p>	<p>Não</p>

<p>Jejum não obrigatório; Procedimento com diretriz de utilização verificar cobertura no plano Obrigatório preenchimento de questionário para testes genéticos. Enviar pedido medico.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Material coletado pelo médico Não coletar sábados, domingos e vespera de feriados.</p>	<p>Sim</p>

<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>

<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>
<p>Procedimento coletado pelo médico. Não possui cobertura o rol da ANS</p>	<p>Sim</p>
<p>Material coletado pelo médico. Procedimento não consta no rol da ANS, verificar cobertura do plano.</p>	<p>Sim</p>
<p>Jejum não obrigatório; Procedimento não consta no rol da ANS.</p>	<p>Não</p>
<p>Coleta realizada pelo médico. Procedimento não consta no rol da ANS.</p>	<p>Sim</p>

<p>Coleta realizado pelo médico.  Procedimento não consta no rol da ANS, verificar cobertura no plano.</p>	<p>Sim</p>
<p>Jejum não obrigatório.  Atenção! Preencher questionário.  Não consta no Rol de cobertura da ANS.  Questionários para testes genéticos.  Enviar pedido médico.  A interpretação doExame é direcionada pelo quadro clinico e desta forma, é essencial uma informação clinica detalhada.</p>	<p>Não</p>
<p>Obrigatório envio do Termo de Consentimento Biópsias, disponível no Portal em Formulários e Questionários (Termo para transporte de amostras).  Enviar pedido médico e laudo anatomopatológico anterior. Obrigatório o envio da requisição médica e termo de consentimento para o transporte da amostra biológica.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.  Não colher às 6ª feira, sábado ou véspera feriado. Coletar até as 11:00 horas.  Obrigatório enviar o material acompanhado de informes clínicos do paciente:  Dados relevantes do Exame Físico Ex.: Adeno ou hepatoesplenomegalia.  História Clínica;  Hipóteses diagnósticas;  Tratamentos anteriores;  Utilização de medicamentos;  Exames laboratoriais pertinentes, tais como, hemograma, citoquímicas realizadas, resultados de mielogramas anteriores, citogenéticas e outros</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório;  Procedimento não consta no rol da ANS, verificar cobertura no plano. Questionario para Testes Genéticos.</p>	<p>Não</p>

<p>Jejum não obrigatório; Questionário obrigatório; Verificar autorização no plano; Não colher nos feriados e vésperas de feriados. Enviar pedido médico.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório; Necessário autorização do plano; Coleta realizada somente de 2ª a 5ª feira. Não coletamos nos feriados e vésperas de feriados. Enviar pedido médico. Obrigatório o envio de Questionário para testes genéticos.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>



<p>Jejum não obrigatório; Preencher Questionário para testes genéticos; Necessário solicitar autorização no plano (utilizar o código 40503801) Enviar pedido médico.</p>	<p>Não</p>
<p>Urina recente. Colher preferencialmente no laboratório a 1ª urina da manhã ou com intervalo de 4 horas entre as micções. Fazer higiene da genitália com água e sabão, secar, desprezar o 1º jato de urina e coletar o jato do meio.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Não coletar as sextas, sábados, domingos e vespéra de feriados.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Questionários para testes genéticos.</p>	<p>Não</p>
<p>Urina recente. Não colher em local de trabalho. Retirar o uniforme antes da coleta. Não utilizar recipiente de vidro para coletar ou acondicionar a amostra. Recomenda-se coletar no início ou ao final da jornada de trabalho, após a 4ª jornada de trabalho da semana.</p>	<p>Não</p>

<p style="text-align: center;"><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p style="text-align: center;">Não</p>
<p>Urina final de jornada de trabalho. Fazer higiene da genitália com água e sabão, secar, desprezar o 1º jato de urina e coletar o jato do meio. Procedimento não possui cobertura no rol da ANS.</p>	<p style="text-align: center;">Não</p>
<p style="text-align: center;">Jejum não obrigatório. Solicitar autorização do plano.</p>	<p style="text-align: center;">Não</p>
<p style="text-align: center;">Jejum não obrigatório. Procedimento não consta no rol da ANS necessário solicitar autorização no plano.</p>	<p style="text-align: center;">Não</p>
<p>A interpretação do Exame é direcionada pelo quadro clínico e desta forma, é essencial uma informação clínica detalhada. Jejum não obrigatório. Questionários para testes genéticos. Enviar pedido médico. Exame de alto custo necessita de autorização.</p>	<p style="text-align: center;">Não</p>

<p>Colher preferencialmente no laboratório a 1ª urina da manhã ou com intervalo de 4 horas entre as micções. Fazer higiene da genitália com água e sabão, secar, desprezar o 1º jato de urina e coletar o jato do meio.</p>	<p>Não</p>
<p>Colher preferencialmente no laboratório a 1ª urina da manhã ou com intervalo de 4 horas entre as micções. Fazer higiene da genitália com água e sabão, secar, desprezar o 1º jato de urina e coletar o jato do meio.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>A interpretação do Exame é direcionada pelo quadro clínico e desta forma, é essencial uma informação clínica detalhada. Necessário pedido médico. Jejum não obrigatório. Procedimento não consta no rol de cobertura dos convênios. É obrigatório o envio do termo "Questionário para testes Cardiogenéticos" devidamente preenchido.</p>	<p>Não</p>

<p>Jejum não obrigatório;  Procedimento não consta no rol de cobertura dos convênios.  É obrigatório enviar questionário e termo de consentimento Questionário para testes genéticos.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.  Procedimento não consta no rol de cobertura dos Convênioênios.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.  Procedimento não consta no rol de cobertura do Convênioênio, código CBHPM 40302997.</p>	<p>Não</p>
<p>Colher urina após retenção urinária de 4 horas.  Fazer higiene da genitália com água e sabão, secar, desprezar o 1º jato de urina, coletar o jato médio em frasco protegido da luz (âmbar).  O horário de coleta não é crítico desde que o trabalhador esteja em trabalho contínuo sem afastamento maior que 4 dias.  Informar se a urina é de início ou final de jornada.  Mulheres não podem fazer uso de creme e/ou óvulo vaginal nas 48 horas que antecedem o exame e, idealmente, devem colher a amostra fora do período da menstruação.</p>	<p>Não</p>
<p>1ª urina da manhã ou reter no mínimo 4h, colhida no laboratório.  Mulheres não podem fazer uso de creme e/ou óvulo vaginal nas 48 horas que antecedem o exame e, idealmente, devem colher a amostra fora do período da menstruação.</p>	<p>Não</p>

<p>1ª urina da manhã ou reter no mínimo 4h, colhida no laboratório. Mulheres não podem fazer uso de creme e/ou óvulo vaginal nas 48 horas que antecedem o exame e, idealmente, devem colher a amostra fora do período da menstruação.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Necessário autorização para Usisaúde.</p>	<p>Não</p>
<p>A coleta do material delíquor é um procedimento médico.</p>	<p>Não</p>
<p>Buscar orientação e frasco no laboratório. Não fazer esforço físico durante a coleta. O cliente deve manter sua rotina diária. Informar horário inicial e final da coleta.</p>	<p>Não</p>
<p>Lavar as mãos e genitália antes da coleta. Coletar o jato médio da 1ª urina da manhã. Fazer higiene da genitália com água e sabão, secar, desprezar o 1º jato de urina, coletar o jato médio e colher em frasco próprio. Colher o jato médio da urina com retenção de 4 horas entre as micções.</p>	<p>Não</p>

Urina de 24 horas.	Se criança até 10 anos, informar peso e altura.	Não
<b>Jejum não obrigatório.</b>		Não
Até 7 dias refrigerado entre 2 e 8 °C, ou congelado a 4 °C por até 3 meses.		Não
<b>Jejum não obrigatório.</b>		Não
Até 7 dias refrigerado entre 2 e 8 °C ou congelado a 4 °C por até 3 meses.		Não

Até 7 dias refrigerado entre 2 e 8 °C ou congelado a 4 °C por até 3 meses.	Não
<b>Jejum não obrigatório.</b>	Não
<b>Jejum não obrigatório.</b>	Não
<b>Jejum não obrigatório.</b>	Não
<b>Jejum obrigatório de 8 horas. Intervalo entre mamadas para lactentes.</b>	Não

<p>Jejum não obrigatório. Procedimento não consta no rol da ANS verificar cobertura no plano. Aguardando estudo financeiro para ativar procedimento.</p>	<p>Não</p>
<p>Não necessita de preparo. Colher 5,0 g de fezes diretamente em frasco estéril. Não manipular a amostra.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Urina Final de Jornada de trabalho reter a urina no minimo 4 horas.</p>	<p>Não</p>



<p>Urina recente. Informar se faz uso de algum medicamento. Informar se está exposto ocupacionalmente. Informar se início ou final de jornada.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas. Intervalo entre mamadas para lactentes.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Procedimento não consta no rol da ANS, verificar cobertura no plano.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Solicitar autorização no convênio.</p>	<p>Não</p>
<p>Exame não colhido em véspera de feriados Tempo de jejum: Intervalo máximo entre as mamadas. Colher preferencialmente entre 3º e o 30º dia de vida e no máximo até o 90º dia. Coletar antes do 3º dia de vida apenas caso exista solicitação médica.</p>	<p>Não</p>

<p>Exame não colhido em véspera de feriados Tempo deJejum: Intervalo máximo entre as mamadas. Colher preferencialmente entre 3º e o 30º dia de vida e no máximo até o 90º dia. Coletar antes do 3º dia de vida apenas caso exista solicitação médica.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b> Exame não colhido em véspera de feriados</p>	<p>Não</p>
<p>Colher preferencialmente entre 3º e o 30º dia de vida e, no máximo, até o 90º dia. Coletar antes do 3º dia de vida apenas caso exista solicitação médica.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Colher preferencialmente entre 3º e o 30º dia de vida e no máximo até o 90º dia. Coletar antes do 3º dia de vida apenas caso exista solicitação médica.</p>	<p>Não</p>

<p>Jejum não obrigatório. Procedimento não consta no rol, solicitar autorização do plano. Questionários para testes genéticos. Enviar pedido médico.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Não consta no Rol de cobertura da ANS.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>

<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas. Procedimento não consta no rol da ANS, verificar cobertura com plano. Exame colhido somente de 2ª a 4ª feira. Não deve ser colhido e aceito nos feriados ou em vésperas de feriados. Informar medicamentos em uso.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.                      Enviar pedido médico. Questionários para testes genéticos.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. As amostras de líquido e de soro devem ser colhidas simultaneamente.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>

Jejum não obrigatório.	Não
Jejum não obrigatório.	Não
Jejum não obrigatório.	Não
Jejum não obrigatório.	Não
Jejum não obrigatório.	Não

<p>Jejum não obrigatório. Exame de alto custo necessita de autorização. É obrigatório enviar questionário e termo de consentimento Questionário para testes genéticos.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Questionários para testes genéticos. Enviar pedido médico Exame de alto custo necessita de autorização.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Questionário para testes genéticos Exame de alto custo necessita de autorização.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Questionário para testes genéticos.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Questionário para testes genéticos. Solicitar autorização do plano. Código 40503615</p>	<p>Não</p>

<p>Jejum não obrigatório. Solicitar autorização do plano código 40503631.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Procedimento não consta no rol da ANS, verificar cobertura do plano.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório Não consta no rol da ANS. Coleta devera ser realizada de segunda a quinta em qualquer horário. Nas sextas colher somente ate as 12:00HRS. Não coletar aos final de semana.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório, de acordo com o Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico".</p>	<p>Não</p>
<p>Colher preferencialmente no laboratório a 1ª urina da manhã ou com intervalo de 4 horas entre as micções. Fazer higiene da genitália com água e sabão, secar, desprezar o 1º jato de urina e coletar o jato do meio.</p>	<p>Não</p>

<p>Colher preferentemente do 3º ao 30º dia após o nascimento e, no máximo, até o 90º dia. Colher antes do 3º dia de vida apenas caso exista solicitação médica.</p>	<p>Não</p>
<p>Teste do pezinho: . Colher preferentemente do 3º ao 30º dia após o nascimento e no máximo até o 90º dia. . Colher antes do 3º dia de vida apenas caso exista solicitação médica. Exame em sangue total EDTA: pode ser realizado em pacientes de qualquer idade.</p>	<p>Não</p>
<p>Trazer cópia do laudo Histopatológico. Exame realizado em material anatomopatológico. Verificar cobertura no plano. Obrigatório envio do questionário para exame de Oncologia Molecular.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Informar dosagem do medicamento; Informar data e hora da última dose.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>



<p>Coleta Domiciliar: Atendimentos apenas no carro 04. Disponível apenas pagamento com cartão. Verificar cobertura do plano.</p>	<p>Sim</p>
<p>Colher a 1ª urina da manhã ou urina com o mínimo de 4 horas de retenção urinária. Urina recente. Fazer higiene local com água e sabão, secar, desprezar o 1º jato e coletar o jato do meio.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Este Exame requer um Jejum mínimo de oito horas. A coleta deve ser feita pela manhã. Procedimento não possui cobertura, consultar os planos.</p>	<p>Não</p>

<p>Jejum obrigatório de 8 horas. Procedimento não consta no rol da ANS verificar cobertura do plano.</p>	<p>Não</p>
<p>Não é necessário dieta. Antes de coletar as fezes, se necessário, urinar no vaso sanitário para evitar a contaminação do material. Evitar o uso de laxantes, substâncias digestivas, contraste oral ( utilizado em exames radiológicos) e supositórios nos 3 dias que antecedem ao exame e no dia da coleta. Defecar em vasilhame limpo e seco, próprio para coleta de fezes.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de pelo menos 2 horas (evitar vômito). Se a coleta for realizada pela manhã, vir ao laboratório antes do desjejum. Realizar a coleta entre o 1º e 7º dia após aparecimento dos sintomas: febre, tosse, dor de garganta, coriza e dispnéia</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>

<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Não consta no rol de cobertura dos convênios.</p>	<p>Não</p>
<p>2 círculos de sangue (separados) em papel de filtro saturados nos dois lados do papel. Colher preferentemente do 3º ao 30º dia após o nascimento e, no máximo, até o 90º dia.</p>	<p>Não</p>
<p>Urina recente. Procedimento não consta no rol de cobertura dos planos.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Procedimento necessita de autorização</p>	<p>Não</p>

<p>Jejum obrigatório de 8 horas. Colher pela manhã, somente ingerir medicação, vitaminas ou suplementos minerais após a coleta. Não consta no Rol de cobertura da ANS.</p>	<p>Não</p>
<p>Conv. Usisaúde: pegar guia e senha. Exame possui diretriz de utilização solicitar autorização para planos que seguem rol da ANS. Jejum obrigatório de 4 horas.</p>	<p>Não</p>
<p>Procedimento não consta no rol da ANS. Jejum não obrigatório</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Exame não consta no Rol de cobertura dos planos; verificar cobertura nos planos</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>

<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas.</p>	<p>Não</p>
<p>Não consta no rol, necessário autorização do plano. Jejum não obrigatório. Não coletar as sextas, sábados ou véspera de feriado;</p>	<p>Não</p>
<p>Colher, preferencialmente, a primeira urina da manhã ou com intervalo mínimo de 04 horas após a última micção. O material deve ser colhido preferencialmente no laboratório. Lavar as mãos com água e sabão. Fazer higiene da genitália com água e sabão, secar, desprezar o 1º jato de urina, coletar o jato médio em frasco próprio.</p>	<p>Não</p>

Jejum não necessário.	Não
Jejum obrigatório de 8 horas.	Não
<b>Jejum não obrigatório.</b>	Não
Não consta no Rol de cobertura dos convênios. Solicitar autorização com código 40324494 Jejum obrigatório de 8 horas. Anexar história clínica ou diagnóstico e motivo para a solicitação do Exame.	Não
Jejum não obrigatório. Exame Não consta no Rol de cobertura da ANS.	Não

<p>Exame não consta no Rol da ANS, verificar cobertura no plano.  Jejum obrigatório de 8 horas.  Intervalo entre mamadas para lactentes.</p>	<p>Não</p>
<p>Não consta no Rol de cobertura da ANS.  Jejum obrigatório de 8 horas.</p>	<p>Não</p>
<p>O horario e dieta para coleta não são críticos desde que o trabalhador esteja em trabalho contínuo nas últimas 4 semanas, sem afastamento maior que 4 dias.  Questionar se o paciente está em uso de agentes quelantes.  Informar se o paciente é exposto ocupacionalmente.  Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>
<p>Não consta no Rol da ANS, verificar cobertura dos planos.  1ª urina da manhã ou reter no mínimo 4 hs, colhida no laboratório.  Não é permitida a coleta domiciliar e oncologia  Coleta assistida por um técnico.  É obrigatório o preenchimento completo do formulário ou a utilização do selo de identificação de coleta assistida juntamente com o cliente.  No caso de paciente menor de 18 anos, é necessário a assinatura do menor e do responsável.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 8 horas.  Se a resposta for "SIM" a qualquer uma das perguntas abaixo, Recomenda-se aguardar os prazos citados para a coleta do material, em caso de dúvida o cliente deverá consultar o médico:  . Após Toque Retal, aguardar 2 dias;  . Após ejaculação (Relação Sexual), aguardar 48 horas;  . Já realizou cirurgia de próstata? Há quanto tempo?  . Está em uso de medicamento para próstata?</p>	<p>Não</p>

<p>Jejum não obrigatório. Informar medicamentos em uso ou usados recentemente, inclusive formulas para emagrecer (Triostat, Thevier). Se mulher, Informar se esta grávida ou se usa anticoncepcional.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 4 horas.</p>	<p>Não</p>
<p>Não consta no Rol de cobertura dos convênios. Jejum não obrigatório. Informar medicamentos em uso (inclusive pomadas e cremes). Para mulher (informar uso de anticoncepcional). Informar dia e hora da última medicação.</p>	<p>Não</p>
<p>Procedimento não consta no rol da ANS, verificar cobertura no plano código CBHPM 40311406.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Não consta no Rol de cobertura da ANS.</p>	<p>Não</p>



<p>Jejum não obrigatório. Não é agendamento para coleta domiciliar. Procedimento não realizado pelo SUS</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Necessário cópia do pedido médico.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não necessário. As amostras não devem ser colhidas em pacientes em tratamento com doses elevadas de biotina (acima de 5 mg/dia) até, no mínimo, 48 horas após a última administração, ou a critério médico.</p>	<p>Não</p>

<p>Coleta não permitida as sextas, sábados, domingos e véspera de feriados. Necessário enviar cópia do pedido médico.</p>	<p>Sim</p>
<p>Procedimento não consta no rol da ANS, verificar no plano. Enviar pedido médico ou pedido de nutricionista. Fezes recentes</p>	<p>Não</p>
<p>Urina ao final da jornada de trabalho. Próximo aos dias da coleta, manter dieta isenta de alimentos que contenham Ácido Sórbico (Sorbato) em sua composição.</p>	<p>Não</p>
<p>Procedimento não consta no rol da ANS A coleta ideal deve ser realizada imediatamente antes da administração da próxima dose do medicamento ou conforme orientação médica. Caso o medicamento seja tomado apenas uma vez ao dia, a coleta deve ser feita pelo menos 12 horas após a medicação. Informar medicamentos em uso, dosagem, dia, hora da última dose.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Procedimento de alto custo não consta no rol da ANS, verificar cobertura no plano. Enviar pedido médico.</p>	<p>Não</p>

<p>Procedimento necessita de autorização. Jejum não obrigatório. Exame colhido somente de 2ª a 4ª feira. Não deve ser colhido e aceito em feriados ou véspera de feriados.</p>	<p>Não</p>
<p>Não consta no Rol de cobertura da ANS. Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>
<p>Urina recente, retenção urinária de 4 horas.</p>	<p>Não</p>
<p>Urina recente, retenção urinária de 4 horas.</p>	<p>Não</p>
<p>Exame não consta no Rol da ANS, verificar cobertura no plano. Jejum obrigatório de 8 horas. Informar medicamentos em uso. Não ingerir bebida alcoólica nas últimas 24 horas.</p>	<p>Não</p>

<p>Exame não consta no rol da ANS verificar cobertura no plano. Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>
<p>Urina recente. (Urina de início ou final da jornada de trabalho). Colher urina após retenção urinária de 4 horas. Fazer higiene da genitália com água e sabão, secar, desprezar o 1º jato de urina, coletar o jato médio em frasco próprio. Não colher em local de trabalho. Retirar o uniforme de trabalho antes da coleta. Informar se faz uso de algum medicamento. Informar se está exposto ocupacionalmente.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum obrigatório de 4 horas. Exame colhido somente de 2ª a 4ª feira Não deve ser colhido e aceito em feriados ou véspera de feriados</p>	<p>Sim</p>
<p>Não consta no Rol de cobertura dos planos. Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>

<p>Não consta no Rol de cobertura da ANS. Encaminhar para o plano para autorização. Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>
<p>Não consta no Rol de cobertura da ANS. Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Exame não possui cobertura pelos Convênioênios. Jejum obrigatório de 8 horas ou a critério médico.</p>	<p>Não</p>
<p>Não consta no rol. Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>

<p>Exame não consta no Rol de cobertura. Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. - NÃO coletar na sexta-feira após as 12:00, sábados, domingos e véspera de feriados. estabilidade de até 48 horas após coleta em temperatura ambiente.</p>	<p>Sim</p>
<p>Procedimento de coleta do material é realizado pelo médico solicitante.</p>	<p>Não</p>
<p>Procedimento não consta no rol, verificar cobertura no plano. Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>

<p style="text-align: center;"><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p style="text-align: center;">Não</p>
<p style="text-align: center;">Jejum não obrigatório. Questionário obrigatório.</p>	<p style="text-align: center;">Não</p>
<p style="text-align: center;"><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p style="text-align: center;">Não</p>
<p style="text-align: center;">Jejum obrigatório de 4 horas (alimentar) ou conforme orientação médica. Informar data e hora da coleta, medicamentos em uso, dosagem, dia e hora da última administração do medicamento.</p>	<p style="text-align: center;">Não</p>
<p>É aconselhável que se aguarde 07 dias após a utilização de antimicrobianos para a realização do exame ou conforme orientação do médico. Informar se o cliente está ou esteve recentemente em uso de antimicrobianos. AMOSTRA: raspado de borda de lesão genital. Preparo: Não usar pomada ou outro produto/medicamento no local no dia da coleta. Paciente não deve estar em uso de antibiótico. Não é permitida coleta íntima masculina de segunda à sexta, no período da tarde, na unidade de CORONEL FABRICIANO. Não é permitido coleta íntima masculina em TIMOTEO (agendar p Fabriciano pela manhã)</p>	<p style="text-align: center;">Não</p>

<p>Procedimento não consta no Rol verificar no plano. Material: blocos de parafina. Cliente deve trazer uma cópia do laudo histopatológico.</p>	<p>Não</p>
<p><b>Jejum não obrigatório.</b></p>	<p>Não</p>
<p>Urina do final da última jornada de trabalho da semana.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório; Procedimento não consta no rol da ANS, verificar no plano.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Solicitar autorização do plano. Caso não esteja especificado no pedido, confirmar se é plataforma 400K ou 750K.</p>	<p>Não</p>



<p>Jejum não obrigatório;          Não deve ser colhido e aceito em feriados ou véspera de feriados.          Procedimento não consta no rol da ANS solicitar autorização no plano.</p>	<p>Sim</p>
<p>Verificar cobertura do plano.          Jejum não obrigatório.          Exame colhido somente de 2ª a 4ª feira</p>	<p>Sim</p>
<p>Jejum não obrigatório.          Exame colhido somente de 2ª a 4ª feira até as 12:00 horas.          Enviar pedido médico.          Verificar cobertura do plano.</p>	<p>Sim</p>
<p>Jejum não obrigatório.          Resumo da historia clínica do paciente.          Sempre que possível, enviar cópia do estudo molecular familiar no qual tenha sido detectada a mutação.          Solicitar autorização no plano procedimento com DUT.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.          Enviar pedido médico.          A interpretação do Exame é direcionada pelo quadro clínico e desta forma, é essencial uma informação clínica detalhada.          Verificar cobertura do plano.</p>	<p>Não</p>

Verificar cobertura do plano. Jejum não obrigatório.	Não
<b>Jejum não obrigatório.</b>	Não
Urina recente; Lavar as mãos antes de colher; Colher urina após retenção urinária mínima de 4 horas; Lavar as mãos, fazer higiene da genitália com água e sabão, secar, desprezar o 1º jato de urina e coletar o jato médio; Recomenda-se coletar material no início da última jornada de trabalho da semana.	Não
<b>Jejum não obrigatório.</b>	Não
<b>Jejum não obrigatório.</b>	Não

<p>Jejum não obrigatório. Procedimento não consta no rol da ANS.</p>	<p>Não</p>
<p>Procedimento não possui cobertura pelo convenio. Verificar nos planos. Urina 1º jato: colher preferencialmente no laboratório a 1ª urina da manhã. Fazer higiene da genitália com água e sabão, secar, e coletar o 1º jato de urina em tubo de 12mL. Este exame detecta: Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis e Neisseria gonorrhoeae.</p>	<p>Não</p>
<p>Informar medicamentos dos últimos 14 dias. Jejum não obrigatório. Verificar cobertura do plano.</p>	<p>Não</p>
<p>Exame colhido somente de 2ª a 4ª feira. Não deve ser colhido e aceito em feriados ou véspera de feriados. Jejum não obrigatório. Verificar cobertura do convênio.</p>	<p>Sim</p>
<p>Jejum não obrigatório. Verificar cobertura do plano.</p>	<p>Não</p>

<p>Jejum não obrigatório. Colher somente de 2ª a 5ª feira, na quinta feira colher até 12:00hrs. Verificar cobertura do plano.</p>	<p>Sim</p>
<p>Necessário pedido médico. Necessário pedido médico e laudo da biopsia. Verificar cobertura do plano.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório. Necessário pedido médico. A interpretação do Exame é direcionada pelo quadro clínico e desta forma, é essencial uma informação clínica detalhada. Não consta no Rol de cobertura da ANS.</p>	<p>Não</p>
<p>Urina 24 horas. Buscar orientação e frasco no laboratório. Encaminhar paciente ao laboratório. Informar medicamentos em uso, dosagem, dia e hora da última dose.</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório.</p>	<p>Não</p>

<p>Não é necessário preparo para este exame</p>	<p>Não</p>
<p>Exame coletado de 2ª a 4ª feira, não colher em véspera e feriado. Necessário preencher questionários e termo de esclarecimento para envio de amostras. Informar medicamentos dos últimos 7 dias.</p>	<p>Sim</p>
<p>Não é necessário preparo para este exame</p>	<p>Sim</p>
<p>Paciente tem que assinar o termo de consentimento para encaminhamento do material.</p>	<p>Sim</p>
<p>Não é necessário preparo para este exame</p>	<p>Sim</p>

Não é necessário preparo para este exame	Sim
Não é necessário preparo para este exame	Sim
Jejum obrigatório de 8 horas.☒ Informar medicamentos em uso.	Não
Não é necessário preparo para este exame	Não
Não é necessário preparo para este exame	Não

<p>Não é necessário preparo para este exame</p>	<p>Não</p>
<p>Não é necessário preparo para este exame</p>	<p>Não</p>
<p>Não é necessário preparo para este exame</p>	<p>Não</p>
<p>Podese realizar o exame em qualquer amostra, exceto FEZLS.  Coleta de escarro: colher em casa pela manhã, antes do desjejum. Não escovar dentes antes da coleta, lavar a boca apenas com água. Fazer várias inspirações e tossir para obter material do fundo do peito. Não coletar saliva nem secreção nasal junto com a amostra. Estabilidade: até 06 horas a temperatura ambiente ou 3 dias entre 2 e 8°C. Manter protegido da luz.  Urina: colher todo o volume da primeira urina da manhã (não desprezar primeiro jato). Estabilidade: até 6 horas à temperatura ambiente ou em 1 dia entre 2 e 8°C. Manter protegido da luz.  Amostras de biópsias só podem ser aceitas se coletadas em soro fisiológico. O formol inviabiliza o exame. Estabilidade: até 6 horas à temperatura ambiente ou em 1 dia entre 2 e 8°C. Manter protegido da luz.</p>	<p>Não</p>
<p>Outros líquidos/punções: a coleta é procedimento médico. Estabilidade: até 6 horas à temperatura ambiente ou em 1 dia entre 2 e 8°C. Manter protegido da luz.  Coleta uretral (masculina e feminina) ou vaginal.  não urinar antes da coleta ou estar sem urinar há pelo menos 4 horas. Não realizar higienização local. Não utilizar produto/medicação tópica nas 48h antes da coleta (exceto por orientação médica). Não ter relação sexual nas últimas 24h anteriores ao exame. Não estar menstruada (caso estiver, aguardar 48 horas após o término da mesma).  Coleta de líquidos corpóreos não é realizada pelo Laboratório, pois é um procedimento médico. O material deverá ser mantido refrigerado em geladeira (2°C a 8°C) e entregue para análise em até 24 horas após a coleta.  Esperma: não necessita de tempo de abstinência sexual. A coleta será realizada no Laboratório. As mãos e a genitália devem ser higienizadas antes da coleta.  Urina de primeiro jato: estar sem urinar há pelo menos 4 horas. Coleta: fazer higienização e colher aproximadamente 20ml da primeira porção da urina eliminada.</p>	<p>Não</p>

<p>Se descamação, evitar uso de pomada ou outro produto sobre a pele durante 3 dias.  Se secreção vaginal/uretral, não realizar higiene local.  Caso a realização do FUNGI (Antifungigrama) não seja necessária devido ao resultado NEGATIVO da cultura para fungos, o mesmo será retirado da cobrança.</p>	<p>Não</p>
<p>Não realizar higiene local (lesão genital).  O exame não é realizado em amostras de secreções em geral, apenas em lesão.  Não marcar domiciliar ou Oncologia.  Não é permitida coleta íntima feminina na unidade do Canaã de segunda à sexta, no período da tarde.  Não é permitida coleta íntima masculina de segunda à sexta, no período da tarde, na unidade de CORONEL FABRICIANO.  Não é permitido coleta íntima masculina em TIMOTEO (agendar p Fabriciano pela manhã).</p>	<p>Não</p>
<p>Não é permitido coleta íntima masculina em TIMOTEO (agendar p Fabriciano)  Não é permitida a coleta domiciliar.  Para toda amostra: colher preferencialmente antes de iniciar medicação antifúngica.  Se solicitada pesquisa de fungos em URINA, SECREÇÃO VAGINAL/ENDOCERVICAL ou URETRAL, marcar código EMA.  Secreção de ouvido: não limpar secreção antes da coleta. Necessário estar há pelo menos 3 dias sem utilizar medicação no local.  Secreção ocular: não lavar os olhos no dia da coleta. Necessário estar há pelo menos 3 dias sem utilizar medicação no local.  Lesão descamativa: no dia da coleta não fazer uso de cremes, loções, pomadas ou outras substâncias gordurosas na pele. Necessário estar há pelo menos 7 dias sem utilizar medicação</p>	<p>Não</p>
<p>Não há preparo específico. A coleta deve ser feita preferencialmente antes da utilização de antimicrobianos.  Informar se está em uso de antimicrobianos.  Não é permitida a coleta no Canaã, Oncologia, Timóteo, Ideal ou Coronel Fabriciano.  Para coleta: observar volume adequado abaixo:  Frasco Aeróbio: volume ideal de 8 a 10 mL (não ultrapassar o volume máximo); mínimo de 5 mL  Frasco Aeróbio pediátrico: volume ideal de 4 mL (não ultrapassar o volume máximo); mínimo de 1 mL  Frasco Anaeróbio: volume ideal de 8 a 10 mL (não ultrapassar o volume máximo); mínimo de 5 mL</p>	<p>Não</p>
<p>Não há preparo específico. A coleta deve ser feita preferencialmente antes da utilização de antimicrobianos.  Informar se está em uso de antimicrobianos.  Não é permitida a coleta no Canaã, Oncologia, Timóteo, Ideal ou Coronel Fabriciano.  Para coleta: observar volume adequado abaixo:  Frasco Aeróbio: volume ideal de 8 a 10 mL (não ultrapassar o volume máximo); mínimo de 5 mL  Frasco Aeróbio pediátrico: volume ideal de 4 mL (não ultrapassar o volume máximo); mínimo de 1 mL  Frasco Anaeróbio: volume ideal de 8 a 10 mL (não ultrapassar o volume máximo); mínimo de 5 mL</p>	<p>Não</p>



<p>Não é permitida coleta íntima masculina de segunda à sexta, no período da tarde, na unidade de CORONEL FABRICIANO.</p> <p>Não é permitido coleta íntima masculina em TIMOTEO (agendar p Fabriciano pela manhã)</p> <p>Amostra uretral: estar sem urinar a pelo menos 4 horas</p> <p>Amostra vaginal ou endocervical: não estar menstruada, não realizar higiene local, não ter relação sexual nas últimas 24 horas.</p>	<p>Não</p>
<p>Se secreção vaginal/uretral, não fazer higiene local e não urinar antes do exame.</p> <p>Se secreção de ferida: coleta deverá ser feita no laboratório. Não há preparo específico.</p> <p>Se Gram de Gota: 1ª urina da manhã ou reter no mínimo 4h, colhida no laboratório em frasco estéril.</p> <p>Para outras amostras: verificar no ramal 9197 ou 9028.</p> <p>Não é permitida coleta íntima masculina de segunda à sexta, no período da tarde, na unidade de CORONEL FABRICIANO.</p> <p>Não é permitido coleta íntima masculina em TIMOTEO (agendar p Fabriciano pela manhã)</p>	<p>Não</p>
<p>Não há preparo específico. A coleta deve ser feita preferencialmente antes da utilização de antimicrobianos.</p> <p>Informar se está em uso de antimicrobianos.</p> <p>Se houver prescrição de mais de uma amostra de hemocultura, estas devem ser coletadas com 30 minutos de intervalo (salvo sob critério médico de coleta conjunta).</p>	<p>Não</p>
<p>A marcação de coleta domiciliar é permitida APENAS para buscar o material (se ESCARRO ou URINA) em casa do paciente. Para isto, no horário agendado o material já deve ter sido coletado e deve estar disponível para recolhimento. Entregar ao cliente as orientações por escrito "INST. ESCARRO PARA PESQUISA DE BAAR E CULTURA DE BK"</p> <p>Coleta de escarro: colher em casa pela manhã, antes do desjejum. Não escovar dentes antes da coleta, lavar a boca apenas com água. Fazer várias inspirações e tossir para obter material do fundo do peito. Não coletar saliva nem secreção nasal junto com a amostra. Entregar a amostra ao laboratório em até 6h após a coleta, se mantida à temperatura ambiente. Se refrigerar, entregar em até 24h.</p> <p>Quando o médico solicitar mais de uma amostra, deve-se marcar BAAR, BAAR2, BAAR3, etc.</p> <p>O exame também pode ser realizado nas seguintes amostras: lavado brônquico, aspirado transtraqueal, secreções de feridas, punção de linfonodos, abscessos, medula óssea, líquidos</p>	<p>Não</p>
<p>Material deve ser coletado no laboratório dentro do preparo: 1ª urina da manhã ou retida no mínimo 4 horas e conforme orientação repassada pelo técnico.</p> <p>Para pacientes sem controle da micção será necessário utilização de sonda de alívio. O Laboratório não realiza este procedimento.</p> <p>Quando pedese urocultura realizar o exame preferencialmente na mesma amostra de EAS.</p>	<p>Não</p>

<p>Exame não realizado em material coletado em swab. Exame não realizado em secreção vaginal</p> <p>Se URINA, só é realizado se amostra coletada por punção suprapúbica. Qualquer amostra coletada deve ser processada imediatamente pelo laboratório. Verificar no Laboratório ramal 9197, pois para a maioria das amostras o procedimento de coleta é médico).</p>	<p>Não</p>
<p>A marcação de coleta domiciliar é permitida APENAS para buscar o material (se ESCARRO ou URINA) em casa do paciente. Para isto, no horário agendado o material já deve ter sido coletado e deve estar disponível para recolhimento. Entregar ao cliente as orientações por escrito "INST. ESCARRO PARA PESQUISA DE BAAR E CULTURA DE BK"</p> <p>Coleta de escarro: colher em casa pela manhã, antes do desjejum. Não escovar dentes antes da coleta, lavar a boca apenas com água. Fazer várias inspirações e tossir para obter material do fundo do peito. Não coletar saliva nem secreção nasal junto com a amostra. Entregar a amostra ao laboratório em até 6h após a coleta, se mantida à temperatura ambiente. Se refrigerar, entregar em até 24h.</p> <p>Quadro o médico solicitar mais de uma amostra, devese marcar BAAR, BAAR2, BAAR3, etc. O exame também pode ser realizado nas seguintes amostras: lavado brônquico, aspirado</p>	<p>Não</p>
<p>A marcação de coleta domiciliar é permitida APENAS para buscar o material (se ESCARRO ou URINA) em casa do paciente. Para isto, no horário agendado o material já deve ter sido coletado e deve estar disponível para recolhimento. Entregar ao cliente as orientações por escrito "INST. ESCARRO PARA PESQUISA DE BAAR E CULTURA DE BK"</p> <p>Coleta de escarro: colher em casa pela manhã, antes do desjejum. Não escovar dentes antes da coleta, lavar a boca apenas com água. Fazer várias inspirações e tossir para obter material do fundo do peito. Não coletar saliva nem secreção nasal junto com a amostra. Entregar a amostra ao laboratório em até 6h após a coleta, se mantida à temperatura ambiente. Se refrigerar, entregar em até 24h.</p> <p>Quadro o médico solicitar mais de uma amostra, devese marcar BAAR, BAAR2, BAAR3, etc. O exame também pode ser realizado nas seguintes amostras: lavado brônquico, aspirado</p>	<p>Não</p>
<p>A marcação de coleta domiciliar é permitida APENAS para buscar o material (se ESCARRO ou URINA) em casa do paciente. Para isto, no horário agendado o material já deve ter sido coletado e deve estar disponível para recolhimento. Entregar ao cliente as orientações por escrito "INST. ESCARRO PARA PESQUISA DE BAAR E CULTURA DE BK"</p> <p>Coleta de escarro: colher em casa pela manhã, antes do desjejum. Não escovar dentes antes da coleta, lavar a boca apenas com água. Fazer várias inspirações e tossir para obter material do fundo do peito. Não coletar saliva nem secreção nasal junto com a amostra. Entregar a amostra ao laboratório em até 6h após a coleta, se mantida à temperatura ambiente. Se refrigerar, entregar em até 24h.</p> <p>Quadro o médico solicitar mais de uma amostra, devese marcar BAAR, BAAR2, BAAR3, etc. O exame também pode ser realizado nas seguintes amostras: lavado brônquico, aspirado</p>	<p>Não</p>
<p>A marcação de coleta domiciliar é permitida APENAS para buscar o material (se ESCARRO ou URINA) em casa do paciente. Para isto, no horário agendado o material já deve ter sido coletado e deve estar disponível para recolhimento. Entregar ao cliente as orientações por escrito "INST. ESCARRO PARA PESQUISA DE BAAR E CULTURA DE BK"</p> <p>Coleta de escarro: colher em casa pela manhã, antes do desjejum. Não escovar dentes antes da coleta, lavar a boca apenas com água. Fazer várias inspirações e tossir para obter material do fundo do peito. Não coletar saliva nem secreção nasal junto com a amostra. Entregar a amostra ao laboratório em até 6h após a coleta, se mantida à temperatura ambiente. Se refrigerar, entregar em até 24h.</p> <p>Quadro o médico solicitar mais de uma amostra, devese marcar BAAR, BAAR2, BAAR3, etc. O exame também pode ser realizado nas seguintes amostras: lavado brônquico, aspirado</p>	<p>Não</p>

<p>Marcar FUNGI (Antifungigrama) se houver descrição no pedido médico. <b>IMPORTANTE:</b> para culturas negativas e para resultados positivos de fungos filamentosos, o antifungigrama não será realizado e o mesmo será retirado da cobrança.</p> <p>Não é permitida coleta domiciliar.</p> <p>Para toda amostra: colher preferencialmente antes de iniciar medicação antifúngica.</p> <p>Em suspeita de ESPOROTRICOSE cutânea ou subcutânea, a amostra deve ser coletada pelo médico: aspirado de punção ou fragmento de tecido.</p> <p>Secreção de ouvido: não limpar secreção antes da coleta. Necessário estar há pelo menos 3 dias sem utilizar medicação no local.</p> <p>Secreção ocular: não lavar os olhos no dia da coleta. Necessário estar há pelo menos 3 dias sem utilizar medicação no local.</p>	<p>Não</p>
<p>Exame marcado apenas para urina masculina, secreção uretral masculina e secreção endocervical (feminina). Para outros materiais, deve-se marcar CLAUD.</p> <p>Se urina masculina (1º jato): obrigatoriamente 1ª urina da manhã.</p> <p>Swab uretral masculino: não urinar pelo menos 1 hora antes da coleta.</p> <p>Para coleta de swab endocervical: não estar menstruada (caso estiver, aguardar 72 horas após o fim da menstruação).</p> <p>NÃO é permitida coleta íntima feminina na unidade do Canaã de segunda a sexta no período da tarde (a partir de 12h).</p> <p>NÃO é permitida coleta íntima masculina para TIMOTEO de segunda a sexta no período da tarde (a partir de 12h).</p> <p>Não é permitida coleta íntima masculina de segunda à sexta, no período da tarde, na unidade de CORONEL FABRICIANO.</p>	<p>Não</p>
<p>LÍQUIDOS e LÍQUOR: Entregar amostra coletada em frasco estéril imediatamente após a coleta em temperatura ambiente. Se refrigerar, a estabilidade é de até 24 horas.</p> <p>ESCARRO: colher em casa pela manhã, antes do desjejum. Não escovar dentes antes da coleta, lavar a boca apenas com água. Fazer várias inspirações e tossir para obter material do fundo do peito. Não coletar saliva nem secreção nasal junto com a amostra. Entregar a amostra ao laboratório em até 6h após a coleta, se mantida à temperatura ambiente. Se refrigerar, entregar em até 24h.</p>	<p>Não</p>
<p>Não realizar higiene local.</p> <p>Secreção uretral: a coleta deverá ser realizada antes de urinar.</p> <p>Endocervical: estar sem utilizar pílulas ou óvulos por 48h, não manter relação sexual nas últimas 24h, não estar menstruada (aguardar 48h após o término do fluxo menstrual).</p> <p>Esperma: não é necessário tempo de abstinência</p> <p>Lesões: não fazer higienização do local.</p> <p>Urina de 1º jato: colher primeira urina da manhã ou retida por 4 horas, fazer higienização e coletar os primeiros 20ml de urina.</p> <p>Não é permitida coleta íntima feminina na unidade do Canaã de segunda à sexta, no período da tarde.</p> <p>Não é permitida coleta íntima masculina de segunda à sexta, no período da tarde, na unidade de CORONEL FABRICIANO.</p>	<p>Não</p>
<p>Amostras: secreção de orofaringe, nasofaringe e pseudomembranas.</p> <p>A coleta de secreção de nasofaringe é procedimento médico.</p> <p>Para coleta de secreção em orofaringe e pseudomembranas: higienizar a boca apenas com bochecho de água.</p> <p>Não marcar coleta domiciliar nem para o posto de coleta da Oncologia.</p>	<p>Não</p>

<p>LÍQUIDOS e LÍQUOR: Entregar amostra coletada em frasco estéril imediatamente após a coleta em temperatura ambiente. Se refrigerar, a estabilidade é de até 24 horas.</p> <p>ESCARRO: colher em casa pela manhã, antes do desjejum. Não escovar dentes antes da coleta, lavar a boca apenas com água.</p> <p>OUTRAS SECREÇÕES: Coletar com swab sem salina. Fazer várias inspirações e tossir para obter material do fundo do peito. Não coletar saliva nem secreção nasal junto com a amostra. Entregar a amostra ao laboratório em até 6h após a coleta, se mantida à temperatura ambiente. Se refrigerar, entregar em até 24h.</p>	<p>Não</p>
<p>Não é permitido coleta íntima masculina em HIVOTEC (agendar p Fabriciano pela manhã) Não é permitida a coleta domiciliar.</p> <p>Para toda amostra: colher preferencialmente antes de iniciar medicação antifúngica.</p> <p>Se solicitada pesquisa de fungos em URINA, SECREÇÃO VAGINAL/ENDOCERVICAL ou URETRAL, marcar código EMA.</p> <p>Secreção de ouvido: não limpar secreção antes da coleta. Necessário estar há pelo menos 3 dias sem utilizar medicação no local.</p> <p>Secreção ocular: não lavar os olhos no dia da coleta. Necessário estar há pelo menos 3 dias sem utilizar medicação no local.</p> <p>Lesão descamativa: no dia da coleta não fazer uso de cremes, loções, pomadas ou outras substâncias gordurosas no pelo. Necessário estar há pelo menos 7 dias sem utilizar medicação</p>	<p>Não</p>
<p>Não é permitido coleta íntima masculina em HIVOTEC (agendar p Fabriciano pela manhã) Não é permitida a coleta domiciliar.</p> <p>Para toda amostra: colher preferencialmente antes de iniciar medicação antifúngica.</p> <p>Se solicitada pesquisa de fungos em URINA, SECREÇÃO VAGINAL/ENDOCERVICAL ou URETRAL, marcar código EMA.</p> <p>Secreção de ouvido: não limpar secreção antes da coleta. Necessário estar há pelo menos 3 dias sem utilizar medicação no local.</p> <p>Secreção ocular: não lavar os olhos no dia da coleta. Necessário estar há pelo menos 3 dias sem utilizar medicação no local.</p> <p>Lesão descamativa: no dia da coleta não fazer uso de cremes, loções, pomadas ou outras substâncias gordurosas no pelo. Necessário estar há pelo menos 7 dias sem utilizar medicação</p>	<p>Não</p>
<p>Não é permitido coleta íntima masculina em HIVOTEC (agendar p Fabriciano pela manhã) Não é permitida a coleta domiciliar.</p> <p>Para toda amostra: colher preferencialmente antes de iniciar medicação antifúngica.</p> <p>Se solicitada pesquisa de fungos em URINA, SECREÇÃO VAGINAL/ENDOCERVICAL ou URETRAL, marcar código EMA.</p> <p>Secreção de ouvido: não limpar secreção antes da coleta. Necessário estar há pelo menos 3 dias sem utilizar medicação no local.</p> <p>Secreção ocular: não lavar os olhos no dia da coleta. Necessário estar há pelo menos 3 dias sem utilizar medicação no local.</p> <p>Lesão descamativa: no dia da coleta não fazer uso de cremes, loções, pomadas ou outras substâncias gordurosas no pelo. Necessário estar há pelo menos 7 dias sem utilizar medicação</p>	<p>Não</p>
<p>Não é permitido coleta íntima masculina em HIVOTEC (agendar p Fabriciano pela manhã) Não é permitida a coleta domiciliar.</p> <p>Para toda amostra: colher preferencialmente antes de iniciar medicação antifúngica.</p> <p>Se solicitada pesquisa de fungos em URINA, SECREÇÃO VAGINAL/ENDOCERVICAL ou URETRAL, marcar código EMA.</p> <p>Secreção de ouvido: não limpar secreção antes da coleta. Necessário estar há pelo menos 3 dias sem utilizar medicação no local.</p> <p>Secreção ocular: não lavar os olhos no dia da coleta. Necessário estar há pelo menos 3 dias sem utilizar medicação no local.</p> <p>Lesão descamativa: no dia da coleta não fazer uso de cremes, loções, pomadas ou outras substâncias gordurosas no pelo. Necessário estar há pelo menos 7 dias sem utilizar medicação</p>	<p>Não</p>

<p>Não é permitida coleta íntima masculina em TIMÓTEO (agendar p Fabriciano pela manhã)        Não é permitida a coleta domiciliar.</p> <p>Para toda amostra: colher preferencialmente antes de iniciar medicação antifúngica.</p> <p>Se solicitada pesquisa de fungos em URINA, SECREÇÃO VAGINAL/ENDOCERVICAL ou URETRAL, marcar código EMA.</p> <p>Secreção de ouvido: não limpar secreção antes da coleta. Necessário estar há pelo menos 3 dias sem utilizar medicação no local.</p> <p>Secreção ocular: não lavar os olhos no dia da coleta. Necessário estar há pelo menos 3 dias sem utilizar medicação no local.</p> <p>Lesão descamativa: no dia da coleta não fazer uso de cremes, loções, pomadas ou outras substâncias gordurosas na pele. Necessário estar há pelo menos 7 dias sem utilizar medicação</p>	<p>Não</p>
<p>Não é permitida coleta íntima masculina em TIMÓTEO (agendar p Fabriciano pela manhã)        Não é permitida a coleta domiciliar.</p> <p>Para toda amostra: colher preferencialmente antes de iniciar medicação antifúngica.</p> <p>Se solicitada pesquisa de fungos em URINA, SECREÇÃO VAGINAL/ENDOCERVICAL ou URETRAL, marcar código EMA.</p> <p>Secreção de ouvido: não limpar secreção antes da coleta. Necessário estar há pelo menos 3 dias sem utilizar medicação no local.</p> <p>Secreção ocular: não lavar os olhos no dia da coleta. Necessário estar há pelo menos 3 dias sem utilizar medicação no local.</p> <p>Lesão descamativa: no dia da coleta não fazer uso de cremes, loções, pomadas ou outras substâncias gordurosas na pele. Necessário estar há pelo menos 7 dias sem utilizar medicação</p>	<p>Não</p>
<p>Não é permitida a coleta no HMCII após às 16 horas.</p> <p>Não existe preparo específico. Os sítios serão coletados de acordo com o especificado no pedido médico. Quando o médico não especificar os sítios, marcar "orelha esquerda", "orelha direita", "cotovelo esquerdo" e "cotovelo direito".</p>	<p>Não</p>
<p>Não há preparo específico antes da coleta, pode-se tomar banho e urinar antes da coleta.</p> <p>Não é permitida a coleta no Ideal após 12 horas.</p> <p>Não é permitida coleta íntima masculina de segunda à sexta, no período da tarde, nas unidades de TIMÓTEO e CORONEL FABRICIANO.</p>	<p>Não</p>
<p>Não usar pomada ou outro produto/medicamento no local no dia da coleta.</p> <p>Paciente não deve estar em uso de antibiótico.</p>	<p>Não</p>

<p>A amostra não pode ser coletada em MIF. Amostra deve ser coletada em casa e entregue ao laboratório em até 2 horas em temperatura ambiente. Recolher porções de fezes de 1g a 2g, preferencialmente que possuam muco, pus ou sangue.</p>	Não
<p>Amostra deve ser coletada em frasco estéril e entregue ao laboratório em até 8 horas em temperatura ambiente.</p>	Não
<p>Entregar amostra coletada em frasco estéril imediatamente após a coleta em temperatura ambiente. Se refrigerar, a estabilidade é de até 24 horas.</p>	Não
<p>A coleta é feita pelo médico e o material deve ser entregue em frasco estéril imediatamente ao laboratório em temperatura ambiente (prazo máximo 1 hora).</p>	Não
<p>Coleta de escarro: colher em casa pela manhã, antes do desjejum. Não escovar dentes antes da coleta, lavar a boca apenas com água. Fazer várias inspirações e tossir para obter material do fundo do peito. Não coletar saliva nem secreção nasal junto com a amostra. Entregar a amostra ao laboratório em até 6h após a coleta, se mantida à temperatura ambiente. Se refrigerar, entregar em até 24h.</p>	Não

<p>Fragmento de tecido deve ser acondicionada em frasco estéril contendo solução fisiológica estéril. Prazo de entrega ao laboratório: máximo 24 horas.</p>	<p>Não</p>
<p>Entregar amostra coletada em frasco estéril imediatamente após a coleta em temperatura ambiente. Se refrigerar, a estabilidade é de até 24 horas.</p>	<p>Não</p>
<p>Entregar amostra coletada em frasco estéril imediatamente após a coleta em temperatura ambiente. Se refrigerar, a estabilidade é de até 24 horas.</p>	<p>Não</p>
<p>Não utilizar medicação local no dia da coleta</p>	<p>Não</p>
<p>Evitar higiene local e urinar antes da coleta. Não utilizar pomadas ou óvulos vaginais no dia da coleta. Não é permitida coleta íntima feminina, na unidades de CORONEL FABRICIANO, durante o período de pandemia, agendas reduzidas</p>	<p>Não</p>

<p>Evitar higiene local e urinar antes da coleta. Não utilizar pomadas ou outros medicamentos locais no dia da coleta. Não é permitida a coleta domiciliar e Oncologia Não é permitida coleta íntima masculina de segunda à sexta, no período da tarde, nas unidades de TIMÓTEO e CORONEL FABRICIANO.</p>	<p>Não</p>
<p>Não é necessário preparo para este exame</p>	<p>Não</p>
<p>Não é necessário preparo para este exame</p>	<p>Não</p>
<p>Não é necessário preparo para este exame</p>	<p>Não</p>
<p>Não é necessário preparo para este exame</p>	<p>Não</p>



Não é necessário preparo para este exame	Não
Não é necessário preparo para este exame	Não
Não é necessário preparo para este exame	Não
Não é necessário preparo para este exame	Não
Não é necessário preparo para este exame	Não

<p>Coletar amostra de fezes em frasco limpo e sem conservante. Após a coleta, entregar amostra em até 4 horas em temperatura ambiente ou em até 24 horas se refrigerada. ATENÇÃO AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS!</p>	Não
<p>Entregar amostra coletada em frasco estéril imediatamente após a coleta em temperatura ambiente. Se refrigerar, a estabilidade é de até 24 horas.</p>	Não
<p>Jejum não obrigatório; Obrigatório preenchimento dos termos, cópia do pedido médico e do documento de identidade do paciente. Procedimento com DUT, necessita de autorização do convênio;</p>	Não
<p>Jejum não obrigatório; Obrigatório preenchimento dos termos, cópia do pedido médico e do documento de identidade do paciente. Procedimento com DUT, necessita de autorização do convênio;</p>	Não
<p>Jejum não obrigatório; Obrigatório preenchimento dos termos, cópia do pedido médico e do documento de identidade do paciente. Procedimento com DUT, necessita de autorização do convênio;</p>	Não

<p>Jejum não obrigatório; Obrigatório preenchimento dos termos, cópia do pedido médico e do documento de identidade do paciente. Procedimento com DUT, necessita de autorização do convênio;</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório; Obrigatório preenchimento dos termos, cópia do pedido médico e do documento de identidade do paciente. Procedimento com DUT, necessita de autorização do convênio;</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório; Obrigatório preenchimento dos termos, cópia do pedido médico e do documento de identidade do paciente. Procedimento com DUT, necessita de autorização do convênio;</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório; Obrigatório preenchimento dos termos, cópia do pedido médico e do documento de identidade do paciente. Procedimento com DUT, necessita de autorização do convênio;</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório; Obrigatório preenchimento dos termos, cópia do pedido médico e do documento de identidade do paciente. Procedimento com DUT, necessita de autorização do convênio;</p>	<p>Não</p>

<p>Jejum não obrigatório; Obrigatório preenchimento dos termos, cópia do pedido médico e do documento de identidade do paciente. Procedimento com DUT, necessita de autorização do convênio;</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório; Obrigatório preenchimento dos termos, cópia do pedido médico e do documento de identidade do paciente. Procedimento com DUT, necessita de autorização do convênio;</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório; Obrigatório preenchimento dos termos, cópia do pedido médico e do documento de identidade do paciente. Procedimento com DUT, necessita de autorização do convênio;</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório; Obrigatório preenchimento dos termos, cópia do pedido médico e do documento de identidade do paciente. Procedimento com DUT, necessita de autorização do convênio;</p>	<p>Não</p>
<p>Jejum não obrigatório; Obrigatório preenchimento dos termos, cópia do pedido médico e do documento de identidade do paciente. Procedimento com DUT, necessita de autorização do convênio;</p>	<p>Não</p>

<p>Jejum não obrigatório; Obrigatório preenchimento dos termos, cópia do pedido médico e do documento de identidade do paciente. Procedimento com DUT, necessita de autorização do convênio;</p>	<p>Não</p>
<p>Não é necessário jejum. Obrigatório preenchimento dos termos, cópia do pedido médico e do documento de identidade do paciente. Procedimento com DUT, necessita de autorização do convênio.</p>	<p>Não</p>
<p>Não é necessário preparo para este exame</p>	<p>Não</p>
<p>Não é necessário preparo para este exame</p>	<p>Não</p>
<p>Não é necessário preparo para este exame</p>	<p>Não</p>

Não é necessário preparo para este exame	Não
Não é necessário preparo para este exame	Não
Não é necessário preparo para este exame	Não
Não é necessário preparo para este exame	Não
Não é necessário preparo para este exame	Não

<p>Não é necessário preparo para este exame</p>	<p>Não</p>
<p>IPSEMG só autoriza realizar pela internação e pronto socorro. Não Disponível para coleta ambulatorial, somente em atendimento do Pronto Socorro e coleta domiciliar. Coleta Domiciliar: atendimentos apenas nos carros 04 e 05. Disponível apenas pagamento com cartão.</p>	<p>Sim</p>
<p>Exame colhido apenas no HMC I: Segunda a sexta: atendimento entre 06:30 e 18:00. Reter a urina no mínimo por 4 horas se houver solicitação de outros exames em urina recente. Permanecer no laboratório por 2h, em repouso. Após repouso, colher a 2ª amostra de urina para o dismorfismo. Para mulheres: não colher durante o período menstrual.</p>	<p>Não</p>
<p>A amostra de urina deverá ser coleta após ejaculação.</p>	<p>Sim</p>
<p>1ª urina da manhã ou reter no mínimo 4 horas. Entregar a urina ao laboratório até 1 hora após a coleta.</p>	<p>Não</p>

<p>Para todas as idades jejum mínimo necessário de 4 horas. Não consta no rol de cobertura dos convênios.</p>	<p>Não</p>



**Responsável:**  
Carlos Lima

**PERMITE COLETA  
DOMICILIAR**

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Não

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio



Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não



Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não



Não

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio



Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não



Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido.

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio



Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio



Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio



Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não



Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio



Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio



Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio



Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio



Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio



Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não



Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não



Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio



Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Não

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Não

Não



Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não



Não

Não

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante agendamento prévio, apenas para recebimento do material previamente colhido
Não
Não
Sim, mediante agendamento prévio
Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio



Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não



Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Não

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não



Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não



Não

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio



Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio



Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Não

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio



Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio



Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio



Não

Não

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Não

Não

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não



Não

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio



Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Não

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não



Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio



Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Sim, mediante  
agendamento prévio



Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Não

Não



Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não



Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não



Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio

Não

Não

Sim, mediante  
agendamento prévio,  
apenas para recebimento  
do material previamente  
colhido

Não