

Medicamento Oncológico

Encorafenibe

Indicação Terapêutica: Tratamento de câncer Colorretal e Melanoma.

Recomendações

- Este medicamento deve ser mantido em temperatura ambiente (15°C a 30°C). Mantenha o medicamento em sua embalagem original para proteger da umidade;
- Engula as cápsulas inteiras com água;
- Tome sempre no mesmo horário;
- Este medicamento pode ser tomado com a comida ou entre as refeições;
- Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado; tome sempre com um copo de água;
- Não tome suco de toranja (grapefruit) durante o tratamento com este medicamento, porque esta fruta pode aumentar os efeitos colaterais;
- Este medicamento não é recomendado durante a gravidez. Se você está grávida, acha que está grávida ou planeja engravidar, consulte o seu médico antes de tomar este medicamento;
- Este medicamento não é recomendado durante o aleitamento materno. Não se sabe se o encorafenibe passa para o leite materno. Se você está amamentando ou planeja amamentar, consulte o seu médico antes de tomar este medicamento;
- Este medicamento pode afetar sua capacidade de dirigir ou operar máquinas. Evite dirigir ou operar máquinas se tiver algum problema com a sua visão ou se tiver qualquer outro efeito colateral que possa afetar a sua capacidade de fazê-lo;
- Apesar do risco de fototoxicidade ser mínimo com encorafenibe, é recomendado usar roupas adequadas para se proteger do sol e sempre aplicar filtro solar antes de sair ao ar livre;
- Se você perder uma dose de encorafenibe, tome-o assim que se lembrar. Porém, se a dose tiver sido esquecida por mais de 12 horas, pule essa dose e tome a seguinte no horário habitual. Depois, continue tomando as cápsulas nos horários regulares, como de costume;
- Não tome uma dose dobrada para compensar a dose esquecida.

Reações adversas frequentes

- Anemia;
- Dor de cabeça;
- Tontura;
- Pressão sanguínea alta;
- Deficiência visual;
- Dor de estômago;
- Diarréia;
- Vômito;
- Náusea;
- Constipação;
- Coceira;
- Pele seca;
- Queda ou diminuição de cabelo (alopecia);
- Dor nas articulações (artralgia);
- Dor muscular, fraqueza ou espasmo;
- Dor nas costas;
- Dor nas extremidades;
- Febre;
- Inchaço nas mãos ou pés (edema periférico);
- Fadiga.