

Medicamento Oncológico

Pomalidomida

Indicação Terapêutica: Tratamento de pacientes com Mieloma Múltiplo.

Recomendações

- Este medicamento deve ser mantido em temperatura ambiente (15°C a 30°C). Mantenha o medicamento em sua embalagem original para proteger da umidade;
- Este medicamento deve ser administrado por via oral, aproximadamente no mesmo horário, todos os dias;
- As cápsulas de pomalidomida devem ser ingeridas inteiras, preferencialmente com água, com ou sem alimentos;
- Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado;
- Não abrir e nem quebrar as cápsulas. Caso o pó de pomalidomida entre em contato com a pele, lave-a imediatamente e abundantemente com água e sabão. Se o pó de pomalidomida entrar em contato com as membranas mucosas, lave abundantemente com água;
- Este medicamento não deve ser administrado em mulheres que estão grávidas ou que podem engravidar durante a administração do medicamento.

Reações adversas frequentes

- Anemia;
- Insônia (dificuldade em dormir);
- Neuropatia sensorial periférica (dormência, formigamento ou sensação de queimação na pele, dores nas mãos ou nos pés);
- Tontura;
- Tremor;
- Catarata (turvação da visão);
- Fibrilação atrial (batimento cardíaco rápido e irregular);
- Hipotensão (diminuição da pressão arterial);
- Hipertensão (aumento da pressão arterial);
- Trombose venosa profunda (formação de coágulos no interior de veias profundas que pode causar dor e inchaço nas pernas, especialmente na perna ou nas panturrilhas);
- Tosse;
- Dispneia (falta de ar);
- Constipação (prisão de ventre);
- Diarreia;
- Náusea;
- Vômitos;
- Reação alérgica na pele;
- Dor nas costas;
- Fraqueza muscular;
- Fadiga (cansaço);
- Inchaço do corpo, incluindo inchaço dos braços ou pernas;
- Febre;
- Peso diminuído;
- Queda.