

Medicamento Oncológico

Alectinibe

Indicação Terapêutica: Tratamento de câncer de Pulmão.

Recomendações

- Possui cápsulas duras que devem ser conservadas em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C) e devem ser mantidas dentro do cartucho para proteger da luz e umidade;
- As cápsulas duras devem ser ingeridas com alimento, devem ser engolidas inteiras e não devem ser abertas ou dissolvidas;
- Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado;
- Tome sempre com um copo de água;
- Tome sempre no mesmo horário;
- Não tome nenhum medicamento, chás, fitoterápicos, produtos naturais sem o consentimento do seu médico;
- Se uma dose programada for esquecida, os pacientes podem tomar aquela dose, desde que a dose seguinte seja dentro das próximas 6 (seis) horas;
- Se ocorrerem vômitos depois de tomar uma dose, os pacientes devem tomar a dose seguinte no horário agendado;
- Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. Informe imediatamente seu médico em caso de suspeita de gravidez;
- O uso deste medicamento no período da lactação depende da avaliação e acompanhamento do seu médico ou cirurgião-dentista;
- Em casos de dúvidas, entre em contato com o seu médico.

Reações adversas frequentes

- Constipação;
- Náuseas;
- Diarreia;
- Vômitos;
- Edema (inchado);
- Mialgia (dor muscular);
- Erupção na pele (feridas);
- Reação de fotossensibilidade;
- Anemia;
- Distúrbios da visão;
- Bradicardia (ritmo cardíaco irregular ou lento).

