

Medicamento Oncológico

# Larotrectinibe

**Indicação Terapêutica:** Tratamento de pacientes pediátricos com tumores sólidos localmente avançados ou metastáticos positivos para fusão do gene NTRK.

## Recomendações

- O medicamento deve ser mantido em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C) e dentro da embalagem original, para proteger da luz e umidade;
- Você pode tomar larotrectinibe com ou sem alimentos;
- As cápsulas devem ser engolidas inteiras, com água. Devido ao gosto amargo do princípio ativo, as cápsulas não devem ser abertas, mastigadas ou esmagadas;
- Tome sempre com um copo de água;
- Tome sempre no mesmo horário;
- Não coma toranja nem beba suco de toranja enquanto estiver tomando larotrectinibe, isso porque a toranja pode aumentar a quantidade de larotrectinibe no seu corpo;
- Não tome nenhum medicamento, chás, fitoterápicos, produtos naturais sem o consentimento do seu médico;
- Se ocorrerem vômitos depois de tomar uma dose ou se esquecer de tomar, você não deve tomar uma dose adicional para compensar o vômito ou tomar duas doses ao mesmo tempo para compensar a dose esquecida. Tome a próxima dose no horário programado;
- Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. Informe imediatamente seu médico em caso de suspeita de gravidez;
- Não amamente enquanto estiver tomando este medicamento e durante 3 dias após a última dose. Isto porque não se sabe se o larotrectinibe passa para o leite materno. Fale com o seu médico imediatamente para determinar se você pode e quando reiniciar a amamentação;
- Em casos de dúvidas, entre em contato com o seu médico.

## Reações adversas frequentes

- Tontura;
- Fadiga (cansaço);
- Náusea;
- Vômito;
- Diarreia ou constipação;
- Dor muscular;
- Anemia;
- Aumento do peso;
- Sensação de formigamento ou dormência em partes do corpo;
- Alteração do paladar;
- Fraqueza muscular.

