

Medicamento Oncológico

Acalabrutinibe

Indicação Terapêutica: Leucemia linfocítica crônica; Leucemia linfocítica crônica e Linfoma de células do manto (LCM)

Recomendações

- Tome sempre com um copo de água;
- Tome sempre no mesmo horário;
- Os comprimidos não devem ser partidas abertas ou mastigadas;
- Pode ser administrado com ou sem alimentos;
- Informe imediatamente o seu médico caso esteja grávida ou com suspeita de gravidez;
- Informe o seu médico caso esteja amamentando;
- Não manuseie os comprimidos. De preferência, coloque o comprimido em um copo descartável ao toma-lo;
- Se esquecer de tomar uma dose por mais de 3 horas, tomar a próxima dose em seu horário habitual. Não se devem tomar cápsulas adicionais para compensar a dose perdida;
- Armazenar em temperatura ambiente (15°C a 30°C), protegido da luz e umidade;
- Mantenha as cápsulas em sua embalagem original até o momento de uso e observe a validade;
- Não tome nenhum medicamento, chás, fitoterápicos, produtos naturais sem o consentimento do seu médico;
- Pergunte ao seu médico se existe interação medicamentosa com demais medicamentos em uso e procure saber os efeitos adversos menos comuns.

Reações adversas frequentes

- Náusea;
- Vômito;
- Diarreia;
- Constipação
- Dor abdominal;
- Artralgia (dor articular)
- Dor de cabeça;
- Tontura;
- Fadiga;
- Dor muscular;
- Alterações na cor (como vermelhidão) e/ou na textura (como caroços e inchaço) da pele.