

Medicamento Oncológico

Afatinibe

Indicação Terapêutica: Tratamento de câncer de Pulmão.

Recomendações

- Tome sempre com um copo de água;
- Tome sempre no mesmo horário;
- O medicamento não deve ser partido aberto ou mastigado;
- Não deve ser ingerido com alimento. Não se deve consumir alimentos durante pelo menos 3 horas antes e 1 hora após a ingestão;
- Informe imediatamente o seu médico caso esteja grávida ou com suspeita de gravidez;
- Informe o seu médico caso esteja amamentando;
- Não manuseie os comprimidos. De preferência, coloque o comprimido em um copo descartável ao toma-lo;
- No caso de uma dose ser esquecida, esta deve ser tomada no mesmo dia, assim que o paciente se lembrar. No entanto, caso a próxima dose ocorra nas 8 horas seguintes, então a dose esquecida não deverá ser tomada;
- Para evitar rash cutâneo (vermelhidão), quando se expuserem ao sol é aconselhável o uso de roupas protetoras e/ou protetor solar;
- Mantenha os comprimidos em sua embalagem original até o momento de uso e observe a validade;
- Não tome nenhum medicamento, chás, fitoterápicos, produtos naturais sem o consentimento do seu médico;
- Pergunte ao seu médico se existe interação medicamentosa com demais medicamentos em uso e procure saber os efeitos adversos menos comuns;
- Em casos de dúvidas entre em contato com seu médico.

Reações adversas frequentes

- Redução de apetite;
- Diarreia;
- Estomatite (feridas no interior da boca);
- Náusea (ânsia de vômito);
- Vômito;
- Rash (vermelhidão);
- Dermatite (doença inflamatória da pele que gera vermelhidão, coceira e bolhas);
- Acne (processo inflamatório da pele, resultando em cravos e espinhas);
- Coceira;
- Pele seca.