

Medicamento Oncológico

Anastrozol

Indicação Terapêutica: Tratamento de câncer de Mama.

Recomendações

- Pode ser tomado com ou sem alimentos;
- O comprimido não deve ser mastigado;
- Tome com água;
- Tome sempre no mesmo horário;
- Caso tenha esquecido de tomar a dose do dia anterior, tome a dose do dia normalmente, não dobre a dose;
- Armazenar em temperatura ambiente (15°C a 30°C), protegido da luz e umidade;
- Mantenha os comprimidos em sua embalagem original até o momento de uso e observe a validade;
- Não manuseie o comprimido. De preferência, coloque o comprimido em um copo descartável ao toma-lo;
- Não suspenda a medicação sem orientação médica;
- Não tome nenhum medicamento, chás, fitoterápicos, produtos naturais sem o consentimento do seu médico;
- Informe imediatamente o seu médico caso esteja grávida ou com suspeita de gravidez;
- Informe o seu médico caso esteja amamentando;
- Pergunte ao seu médico se existe interação medicamentosa com demais medicamentos em uso e procure saber os efeitos adversos menos comuns;
- Em casos de dúvidas entre em contato com seu médico.

Reações adversas frequentes

- Fadiga;
- Dor de cabeça;
- Sonolência;
- Dor articular (“dor nas juntas”);
- Episódios de calor (Fogachos).