

Medicamento Oncológico

Citrato de ixazomibe

Indicação Terapêutica: Tratamento de Mieloma Múltiplo.

Recomendações

- Tome sempre com um copo de água;
- Tome sempre no mesmo horário;
- Informe imediatamente o seu médico caso esteja grávida ou com suspeita de gravidez;
- Informe o seu médico caso esteja amamentando;
- Não manuseie as cápsulas. De preferência, coloque a cápsula em um copo descartável ao toma-lo;
- Caso haja atraso ou esquecimento de uma dose de Citrato de Ixazomibe, a dose deve ser tomada apenas se a próxima dose estiver programada para depois de 72 horas ou mais. Uma dose esquecida não deve ser tomada nas 72 horas que antecedem a próxima dose programada. Uma dose duplicada não deve ser tomada para compensar a dose esquecida. Se o paciente vomitar após a tomada da dose, ele não deve repetir a dose. O paciente deve prosseguir com a administração na hora programada para a próxima dose.
- Mantenha as cápsulas em sua embalagem original até o momento de uso e observe a validade;
- Não tome nenhum medicamento, chás, fitoterápicos, produtos naturais sem o consentimento do seu médico;
- Pergunte ao seu médico se existe interação medicamentosa com demais medicamentos em uso e procure saber os efeitos adversos menos comuns;
- Em casos de dúvidas entre em contato com seu médico.

Reações adversas frequentes

- Infecção como sinusite e faringite;
- Diarreia;
- constipação (Dificuldade de eliminar as fezes);
- Náusea(ânsia de vômito);
- Vômito;
- Feridas na pele;
- Dor lombar;
- Inchaço nos pés e tornozelos.