

Medicamento Oncológico

Clorambucila

Indicação Terapêutica: Tratamento de Linfoma de Hodgkin e Não – Hodgkin, LLC - Leucemia Linfocítica Crônica.

Recomendações

- Tome sempre com um copo de água;
- Tome sempre no mesmo horário;
- Os comprimidos devem ser engolidos inteiros, sem partir ou mastigar, juntamente com um copo de água e com o estômago vazio, pelo menos de 1 hora antes ou 3 horas após as refeições;
- Informe imediatamente o seu médico caso esteja grávida ou com suspeita de gravidez;
- Informe o seu médico caso esteja amamentando;
- Não manuseie o medicamento. De preferência, coloque o medicamento em um copo descartável ao toma-lo;
- Mantenha o medicamento em sua embalagem original até o momento de uso e observe a validade;
- Não tome nenhum medicamento, chás, fitoterápicos, produtos naturais sem o consentimento do seu médico;
- Pergunte ao seu médico se existe interação medicamentosa com demais medicamentos em uso e procure saber os efeitos adversos menos comuns;
- Em casos de dúvidas entre em contato com seu médico.

Reações adversas frequentes

- Anemia;
- Tremor;
- Náusea (ânsia de vômito);
- Vômito;
- Diarreia.