

Medicamento Oncológico

# Cobimetinibe

**Indicação Terapêutica: Tratamento de Melanoma.**

## Recomendações

- Tome sempre com um copo de água;
- Tome sempre no mesmo horário;
- Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado;
- Se uma dose for perdida, pode ser administrada até 12 horas antes da dose seguinte, para manter o esquema de dose uma vez ao dia;
- Em caso de vômitos após a administração de Hemifumarato De Cobimetinibe , o paciente não deve tomar uma dose adicional naquele dia, e o tratamento deve ser mantido como prescrito no dia seguinte;
- Informe imediatamente o seu médico caso esteja grávida ou com suspeita de gravidez;
- Informe o seu médico caso esteja amamentando;
- Não manuseie os comprimidos. De preferência, coloque o comprimido em um copo descartável ao toma-lo;
- Mantenha os comprimidos em sua embalagem original até o momento de uso e observe a validade;
- Não tome nenhum medicamento, chás, fitoterápicos, produtos naturais sem o consentimento do seu médico;
- Pergunte ao seu médico se existe interação medicamentosa com demais medicamentos em uso e procure saber os efeitos adversos menos comuns;
- Em casos de dúvidas entre em contato com seu médico.

## Reações adversas frequentes

- Diarreia;
- Náuseas (ânsia de vômito);
- Vômitos;
- Febre;
- Fotossensibilidade (quando aparecem reações na pele ao se expor à luz);
- Dermatite acneiforme (inflamação da pele do tipo acne);
- Hipertensão (pressão alta).