

Medicamento Oncológico

Crizotinibe

Indicação Terapêutica: Tratamento de câncer de pulmão.

Recomendações

- Tome sempre com um copo de água;
- Tome sempre no mesmo horário;
- As cápsulas não devem ser partidas abertas ou mastigadas;
- Pode ser administrado com ou sem alimentos;
- Informe imediatamente o seu médico caso esteja grávida ou com suspeita de gravidez;
- Informe o seu médico caso esteja amamentando;
- Não manuseie as cápsulas. De preferência, coloque a cápsula em um copo descartável ao toma-lo;
- Caso tenha esquecido de tomar a dose do dia anterior, tome a dose do dia normalmente, não dobre a dose;
- Armazenar em (20°C a 25°C), protegido da luz e umidade;
- Mantenha as cápsulas em sua embalagem original até o momento de uso e observe a validade;
- Não tome nenhum medicamento, chás, fitoterápicos, produtos naturais sem o consentimento do seu médico;
- Pergunte ao seu médico se existe interação medicamentosa com demais medicamentos em uso e procure saber os efeitos adversos menos comuns;
- Em casos de dúvidas entre em contato com seu médico.

Reações adversas frequentes

- Diminuição do apetite;
- Tontura;
- Alteração do paladar;
- Dificuldade visual;
- Vômito;
- Diarreia;
- Náusea (ânsia de vômito);
- Constipação (Dificuldade de eliminar as fezes);
- Erupção na pele (Feridas);
- Inchaço;
- Cansaço.