

Medicamento Oncológico

Dabrafenibe

Indicação Terapêutica: Tratamento de Melanoma.

Recomendações

- Tome sempre com um copo de água;
- Tome sempre no mesmo horário;
- Deve ser tomado pelo menos uma hora antes, ou duas horas após as refeições, deixando um intervalo de aproximadamente 12 horas entre as doses. Este medicamento deve ser tomado em horários semelhantes todos os dias;
- Se uma dose deste medicamento for perdida, ela não deve ser tomada a não ser que o tempo até a próxima dose programada seja maior que 6 horas;
- Informe imediatamente o seu médico caso esteja grávida ou com suspeita de gravidez;
- Informe o seu médico caso esteja amamentando;
- Não manuseie o medicamento. De preferência, coloque o medicamento em um copo descartável ao toma-lo;
- Mantenha o medicamento em sua embalagem original até o momento de uso e observe a validade;
- Não tome nenhum medicamento, chás, fitoterápicos, produtos naturais sem o consentimento do seu médico;
- Pergunte ao seu médico se existe interação medicamentosa com demais medicamentos em uso e procure saber os efeitos adversos menos comuns;
- Em casos de dúvidas entre em contato com seu médico.

Reações adversas frequentes

- Diminuição do apetite;
- Dor de cabeça;
- Tosse;
- Náuseas (ânsia de vômito);
- Vômitos;
- Diarreia;
- Perda de pelo no corpo;
- Artralgia (dor nas articulações);
- Mialgia (dor muscular);
- Dor nas extremidades;
- Astenia (sensação de fraqueza e falta de energia);
- Calafrios ("arrepios");
- Fadiga;
- Febre.