

Medicamento Oncológico

# Darolutamida

**Indicação Terapêutica: Tratamento de câncer de Próstata.**

## Recomendações

- Administrado por via oral, com ou sem alimento;
- Tome sempre com um copo de água;
- Os comprimidos devem ser ingeridos inteiros;
- Não podem ser partidos ou mastigados;
- Tome sempre no mesmo horário, caso tenha esquecido de tomar a dose do dia anterior, tome a dose do dia normalmente, não dobre a dose;
- Conservado em temperatura ambiente (entre 15 e 30 °C), protegido da umidade e luz;
- Mantenha os comprimidos em embalagens originais até o momento de seu uso e observe validade;
- Não manuseie o comprimido;
- De preferência, coloque o comprimido em um copo descartável ao tomá-lo;
- Não suspenda a medicação sem orientação médica;
- Não tome nenhum medicamento; chás, fitoterápicos, produtos naturais sem o consentimento do seu médico;
- Informe imediatamente o seu médico caso esteja grávida ou com suspeita de gravidez;
- Informe o seu médico caso esteja amamentando;
- Pergunte seu médico se existe interação medicamentosa com os demais medicamentos em uso e procure saber sobre os efeitos adverso menos comum;
- Em casos de dúvidas entre em contato com seu médico;

## Reações adversas frequentes

- Fadiga (cansaço);
- Dor nas extremidades (dor nos braços e pernas);
- Manchas cutâneas vermelhas, escamosas, com prurido e, possivelmente, com bolhas ou vergões.