

Medicamento Oncológico

Dasatinibe

Indicação Terapêutica: Tratamento de LLA - Leucemia Linfocítica (Linfoblástica) Aguda e de LMC - Leucemia Mielocítica (mielóide, mielógena, granulocítica) crônica.

Recomendações

- Tome sempre com um copo de água;
- Tome sempre no mesmo horário;
- Os comprimidos não devem ser partidos abertos ou mastigados;
- Pode ser administrado com ou sem alimentos;
- Informe imediatamente o seu médico caso esteja grávida ou com suspeita de gravidez;
- Informe o seu médico caso esteja amamentando;
- Não manuseie os comprimidos. De preferência, coloque o comprimido em um copo descartável ao toma-lo;
- Caso tenha esquecido de tomar a dose do dia anterior, tome a dose do dia normalmente, não dobre a dose;
- Armazenar em temperatura ambiente (15°C a 30°C), protegido da luz e umidade;
- Mantenha os comprimidos em sua embalagem original até o momento de uso e observe a validade;
- Não tome nenhum medicamento, chás, fitoterápicos, produtos naturais sem o consentimento do seu médico;
- Pergunte ao seu médico se existe interação medicamentosa com demais medicamentos em uso e procure saber os efeitos adversos menos comuns;
- Em casos de dúvidas entre em contato com seu médico.

Reações adversas frequentes

- Náusea (ânsia de vômito);
- Vômito;
- Diarreia;
- Dor abdominal;
- Cansaço;
- Aumento temporário da temperatura;
- Inchaço em membros inferiores e facial;
- Dificuldade de respirar;
- Dor de cabeça;
- Dor muscular.