

Medicamento Oncológico

Dietiletilbestrol

Indicação Terapêutica: Tratamento de câncer de Mama e Próstata.

Recomendações

- Tome sempre com um copo de água;
- Administrar após uma refeição;
- Tome sempre no mesmo horário;
- Este medicamento não deve ser partido ou mastigado;
- Informe imediatamente o seu médico caso esteja grávida ou com suspeita de gravidez;
- Informe o seu médico caso esteja amamentando;
- Caso tenha esquecido de tomar a dose do dia anterior, tome a dose do dia normalmente, não dobre a dose;
- armazenar em temperatura ambiente (15°C a 30°C), protegido da luz e umidade;
- Mantenha comprimidos em sua embalagem original até o momento de uso e observe a validade;
- Informe imediatamente o seu médico caso esteja grávida ou com suspeita de gravidez;
- Não tome nenhum medicamento, chás, fitoterápicos, produtos naturais sem o consentimento do seu médico;
- Pergunte ao seu médico se existe interação medicamentosa com demais medicamentos em uso e procure saber os efeitos adversos menos comuns;
- Em casos de dúvidas entre em contato com seu médico.

Reações adversas frequentes

- Ginecomastia (Crescimento da mama em homens) e/ou sensibilidade mamária aumentada;
- Ondas de calor;
- Náusea (ânsia de vômito).