

Medicamento Oncológico

Enzalutamida

Indicação Terapêutica: Tratamento de câncer de Próstata.

Recomendações

- Pode ser tomado com ou sem alimentos;
- As cápsulas não devem ser partidas abertas ou mastigadas;
- Tome com água;
- Tome sempre no mesmo horário;
- Caso tenha esquecido de tomar a dose do dia anterior, tome a dose do dia normalmente, não dobre a dose;
- Armazenar em temperatura ambiente (15°C a 30°C), protegido da luz e umidade;
- Mantenha as cápsulas em sua embalagem original até o momento de uso e observe a validade;
- Não manuseie a cápsula. De preferência, coloque a cápsula em um copo descartável ao toma-lo;
- Não suspenda a medicação sem orientação médica;
- Não tome nenhum medicamento, chás, fitoterápicos, produtos naturais sem o consentimento do seu médico;
- O paciente deverá utilizar algum método contraceptivo, se mantiver relações sexuais com mulher grávida ou em idade fértil, durante e após 3 meses do tratamento, pois o uso desse medicamento poderá afetar o desenvolvimento do feto;
- Pergunte ao seu médico se existe interação medicamentosa com demais medicamentos em uso e procure saber os efeitos adversos menos comuns;
- Em casos de dúvidas entre em contato com seu médico.

Reações adversas frequentes

- Astenia (perda ou diminuição da força física)/fadiga;
- Ondas de calor;
- Dor de cabeça;
- Hipertensão.