

Medicamento Oncológico

Erlotinibe

Indicação Terapêutica: Tratamento de câncer de Pulmão.

Recomendações

- Tome sempre com um copo de água;
- Tome sempre no mesmo horário;
- Tomar de estômago vazio (pelo menos 1h antes ou 2horas após a ingestão de alimentos);
- Os comprimidos não devem ser partidos ou mastigados;
- Informe imediatamente o seu médico caso esteja grávida ou com suspeita de gravidez;
- Informe o seu médico caso esteja amamentando;
- Não manuseie os comprimidos. De preferência, coloque o comprimido em um copo descartável ao toma-lo;
- Caso tenha esquecido de tomar a dose do dia anterior, tome a dose do dia normalmente, não dobre a dose;
- Armazenar em temperatura ambiente (15°C a 30°C), protegido da luz e umidade;
- Mantenha os comprimidos em sua embalagem original até o momento de uso e observe a validade;
- Não tome nenhum medicamento, chás, fitoterápicos, produtos naturais sem o consentimento do seu médico;
- Pergunte ao seu médico se existe interação medicamentosa com demais medicamentos em uso e procure saber os efeitos adversos menos comuns
- Em casos de dúvidas entre em contato com seu médico.

Reações adversas frequentes

- Inchaço;
- Vermelhidão;
- Coceira;
- Ressecamento da pele;
- Queda de cabelo;
- Diarreia;
- Náusea (ânsia de vômito);
- Vômito;
- Mucosite (feridas e lesões que surgem na boca e na garganta);
- Estomatite (feridas no interior da boca);
- Boca seca;
- Dor;
- Flatulência (acumulação de gases no estômago e nos intestinos);
- Constipação (Dificuldade de eliminar as fezes);
- Falta de ar;
- Dificuldade de engolir;
- Perda de peso;
- Paladar anormal;
- Dor abdominal;
- Conjuntivite (inflamação da conjuntiva - membrana que reveste a parte externa do globo ocular);
- Conjuntiva seca ("sensação de olho seco");
- Cansaço;
- Ansiedade;
- Dor de cabeça;
- Tontura;
- Insônia.