

Medicamento Oncológico

Everolimus

Indicação Terapêutica: Tratamento de câncer de mama, pâncreas, estômago, intestino e pulmão.

Recomendações

- Tome sempre com um copo de água;
- Tome sempre no mesmo horário;
- Podem ser tomados com ou sem alimentos;
- Os comprimidos devem ser engolidos inteiros, não devem ser mastigados ou triturados;
- Caso tenha dificuldade de engolir, dissolva o comprimido em meio copo de água (contendo aproximadamente 30ml) por agitação suave, até que o comprimido esteja completamente desintegrado (aproximadamente 7 minutos) imediatamente antes da ingestão, NÃO devem ser utilizados outros líquidos, NÃO esmague o comprimido. BEBA o líquido imediatamente. Para garantir que bebeu todo o medicamento. O copo deve ser enxaguado com o mesmo volume de água e o enxágue deve ser ingerido completamente para garantir que a dose total seja administrada. Deve utilizar luvas descartáveis para o manuseio do medicamento, assim como lavar as mãos antes e depois do contato com o frasco;
- Informe imediatamente o seu médico caso esteja grávida ou com suspeita de gravidez;
- Informe o seu médico caso esteja amamentando;
- Não manuseie os comprimidos. De preferência, coloque o comprimido em um copo descartável ao toma-lo;
- Caso tenha esquecido de tomar a dose do dia anterior, tome a dose do dia normalmente, não dobre a dose;
- Armazenar em temperatura ambiente (15°C a 30°C), protegido da luz e umidade;
- Mantenha os comprimidos em sua embalagem original até o momento de uso e observe a validade;
- Não tome nenhum medicamento, chás, fitoterápicos, produtos naturais sem o consentimento do seu médico;
- Pergunte ao seu médico se existe interação medicamentosa com demais medicamentos em uso e procure saber os efeitos adversos menos comuns;
- Em casos de dúvidas entre em contato com seu médico.

Reações adversas frequentes

- Estomatite (feridas no interior da boca);
- Erupção na pele (Feridas);
- Cansaço;
- Diarreia;
- Náusea (ânsia de vômito);
- Appetite diminuído;
- Alteração do paladar;
- Inchaço periférico (pés e tornozelos);
- Aumento da glicose;
- Perda ou diminuição da força física;
- Coceira;
- Diminuição do peso;
- Sangramento nasal;
- Tosse;
- Fraqueza;
- Dor de cabeça.