

Medicamento Oncológico

Gefitinibe

Indicação Terapêutica: Tratamento de câncer de Pulmão.

Recomendações

- Tome sempre com um copo de água;
- Tome sempre no mesmo horário;
- Caso tenha dificuldade de engolir, os comprimidos podem ser administrados como uma dispersão em água. O comprimido deve ser colocado em meio copo de água potável (sem gás), sem quebrar ou esmagar, e o copo agitado até que o comprimido seja disperso (aproximadamente 15 minutos) e deve-se tomar o líquido imediatamente. Adicionar mais meio copo de água, mexer e tomar a água adicionada. O líquido também pode ser administrado por sonda nasogástrica. Deve utilizar luvas descartáveis para o manuseio do medicamento, assim como lavar as mãos antes e depois do contato com o frasco;
- Este medicamento não deve ser partido ou mastigado;
- Podem ser tomados com ou sem alimentos;
- Informe imediatamente o seu médico caso esteja grávida ou com suspeita de gravidez;
- Informe o seu médico caso esteja amamentando;
- Depois de aberto o envelope, o medicamento deve ser utilizado em até 30 dias.
- Não manuseie os comprimidos. De preferência, coloque o comprimido em um copo descartável ao toma-lo;
- Caso tenha esquecido de tomar a dose do dia anterior, tome a dose do dia normalmente, não dobre a dose;
- Armazenar em temperatura ambiente (15°C a 30°C), protegido da luz e umidade;
- Mantenha os comprimidos em sua embalagem original até o momento de uso e observe a validade;
- Não tome nenhum medicamento, chás, fitoterápicos, produtos naturais sem o consentimento do seu médico;
- Pergunte ao seu médico se existe interação medicamentosa com demais medicamentos em uso e procure saber os efeitos adversos menos comuns;
- Em casos de dúvidas entre em contato com seu médico.

Reações adversas frequentes

- Vermelhidão;
- Erupção na pele (Feridas);
- Acne (processo inflamatório da pele,resultando em cravos e espinhas);
- Pele seca;
- Diarreia;
- Náusea (ânsia de vômito);
- Vômito.