

Medicamento Oncológico

Gilteritinibe

Indicação Terapêutica: Tratamento de LMA - leucemia mieloide aguda.

Recomendações

- Administrado por via oral, com ou sem alimento;
- Tome sempre com um copo de água;
- Os comprimidos devem ser ingeridos inteiros;
- Não podem ser partidos ou mastigados;
- Deve ser administrado mais ou menos na mesma hora todos os dias. Se uma dose for omitida ou não for tomada no horário de costume, ela deve ser administrada assim que possível no após a administração da dose, os pacientes não devem tomar outra dose, mas devem retornar ao esquema normal no dia seguinte;
- Conservado em temperatura ambiente (entre 15 e 30 °C), protegido da umidade e luz;
- Mantenha os comprimidos em embalagens originais até o momento de seu uso e observe validade;
- Não manuseie o comprimido;
- De preferência, coloque o comprimido em um copo descartável ao tomá-lo;
- Não suspenda a medicação sem orientação médica;
- Não tome nenhum medicamento; chás, fitoterápicos, produtos naturais sem o consentimento do seu médico;
- Informe imediatamente o seu médico caso esteja grávida ou com suspeita de gravidez;
- Informe o seu médico caso esteja amamentando;
- Pergunte seu médico se existe interação medicamentosa com os demais medicamentos em uso e procure saber sobre os efeitos adverso menos comum;
- Em casos de dúvidas entre em contato com seu médico;

Reações adversas frequentes

- Neuropatia (fraqueza, dormência e dor devido a danos nos nervos, normalmente nas mãos e nos pés);
- Cefaleia (dor de cabeça);
- Tontura;
- Sentido de paladar alterado ou prejudicado;
- Insônia;
- Hipotensão (pressão arterial baixa);
- Tosse;
- Dispneia (falta de ar);
- Inflamação na parte interna da boca e da garganta;
- Diarreia;
- Náusea (ânsia de vômito);
- Constipação;
- Vômito;