

Medicamento Oncológico

# Hidroxiuréia

**Indicação Terapêutica: Tratamento de LMC - Leucemia Mielocítica (mielóide, mielógena, granulocítica) Crônica.**

## Recomendações

- Tome sempre com um copo de água;
- Tome sempre no mesmo horário;
- Caso tenha dificuldade de engolir, o conteúdo da cápsula pode ser transferido para um copo de água e ingerido imediatamente. Algum componente utilizado na cápsula pode não se dissolver e assim flutuar na superfície. Devem ter cautela ao manipular o medicamento, não permitindo que o pó entre em contato com a pele e mucosas, evitando inclusive a inalação do pó quando da abertura da cápsula. Para reduzir o risco de exposição à Hidroxiureia, devem utilizar luvas descartáveis no manuseio do medicamento, assim como lavar as mãos antes e depois do contato com o frasco e cápsulas;
- Se o pó se esparramar limpar imediatamente com uma toalha úmida e descartável e desprezada em um recipiente fechado, como um saco plástico, assim como às cápsulas vazias;
- Informe imediatamente o seu médico caso esteja grávida ou com suspeita de gravidez;
- Informe o seu médico caso esteja amamentando;
- Não manuseie as cápsulas. De preferência, coloque a cápsula em um copo descartável ao toma-lo;
- Caso tenha esquecido de tomar a dose do dia anterior, tome a dose do dia normalmente, não dobre a dose;
- Armazenar em temperatura ambiente (15°C a 30°C), protegido da luz e umidade;
- Mantenha as cápsulas em sua embalagem original até o momento de uso e observe a validade;
- Não tome nenhum medicamento, chás, fitoterápicos, produtos naturais sem o consentimento do seu médico;
- Pergunte ao seu médico se existe interação medicamentosa com demais medicamentos em uso e procure saber os efeitos adversos menos comuns;
- Em casos de dúvidas entre em contato com seu médico.

## Reações adversas frequentes

- Náusea (ânsia de vômito);
- Vômito;
- Diarreia;
- Estomatite (feridas no interior da boca);
- Constipação (Dificuldade de eliminar as fezes)
- Mucosite (feridas e lesões que surgem na boca e na garganta);
- desconforto estomacal,
- desconforto na área superior do abdômen,
- queda de cabelo,
- esfoliação da pele,
- hiperpigmentação cutânea,
- desordens nas unhas,
- desconforto ao urinar,
- aumento temporário da temperatura corporal,
- diminuição da força física,
- calafrios (Arrepios),
- mal-estar.