

Medicamento Oncológico

# Ibrutinibe

**Indicação Terapêutica:** Tratamento de Leucemia linfocítica crônica (LLC), Linfoma linfocítico de pequenas células (LLCPC), Linfoma de células do manto (LCM).

## Recomendações

- Tome sempre com um copo de água;
- Tome sempre no mesmo horário;
- Pode ser tomado antes ou após a refeição;
- Ibrutinibe não deverá ser administrado com suco de toranja ('grapefruit') ou Laranjas de Sevilha.
- As cápsulas devem ser engolidas inteiras, não deverão ser abertas, quebradas ou mastigadas;
- Informe imediatamente o seu médico caso esteja grávida ou com suspeita de gravidez;
- Informe o seu médico caso esteja amamentando;
- Não manuseie as cápsulas. De preferência, coloque a cápsula em um copo descartável ao toma-lo;
- Caso tenha esquecido de tomar a dose do dia anterior, tome a dose do dia normalmente, não dobre a dose;
- Armazenar em temperatura ambiente (15°C a 30°C), protegido da luz e umidade;
- Mantenha as cápsulas em sua embalagem original até o momento de uso e observe a validade;
- Não tome nenhum medicamento, chás, fitoterápicos, produtos naturais sem o consentimento do seu médico;
- Pergunte ao seu médico se existe interação medicamentosa com demais medicamentos em uso e procure saber os efeitos adversos menos comuns;
- Em casos de dúvidas entre em contato com seu médico.

## Reações adversas frequentes

- Sinusite;
- infecção na pele;
- conjuntivite (inflamação da conjuntiva – membrana que reveste a parte externa do globo ocular);
- espasmos musculares (contração involuntária de um músculo).