

Medicamento Oncológico

# Imatinibe

**Indicação Terapêutica:** Tratamento de LLA - Leucemia Linfocítica (Linfoblástica) Aguda, LMC - Leucemia Mielocítica (mielóide, mielógina, granulocítica) Crônica e Tumor estromal gastrointestinal (GIST).

## Recomendações

- Tome preferencialmente com uma refeição para ajudar a proteger seu estômago, junto com um copo de água;
- Caso tenha dificuldade para engolir, pode dissolvê-los em um copo de água ou suco de maçã. O número de comprimidos necessários deverá ser colocado num volume apropriado de bebida (aproximadamente 50 mL para um comprimido de 100 mg, e 200 mL para um comprimido de 400 mg) e misturado com uma colher. A suspensão deve ser administrada imediatamente após a dissolução completa do(s) comprimido(s);
- Informe imediatamente o seu médico caso esteja grávida ou com suspeita de gravidez;
- Informe o seu médico caso esteja amamentando;
- Tome sempre no mesmo horário;
- Caso tenha esquecido de tomar a dose do dia anterior, tome a dose do dia normalmente, não dobre a dose;
- Armazenar em temperatura ambiente (15°C a 30°C), protegido da luz e umidade;
- Mantenha comprimidos em sua embalagem original até o momento de uso e observe a validade;
- Não manuseie o comprimido. De preferência, coloque o comprimido em um copo descartável ao toma-lo;
- Não suspenda a medicação sem orientação médica;
- Não tome nenhum medicamento, chás, fitoterápicos, produtos naturais sem o consentimento do seu médico;
- Pergunte ao seu médico se existe interação medicamentosa com demais medicamentos em uso e procure saber os efeitos adversos menos comuns
- Em casos de dúvidas entre em contato com seu médico.

## Reações adversas frequentes

- Náusea (ânsia de vômito);
- diminuição da imunidade;
- dor de cabeça;
- insônia;
- alteração do paladar;
- câimbras;
- inchaço da pálpebra;
- olhos lacrimejantes;
- sangue ou vermelhidão no olho;
- conjuntivite (inflamação da conjuntiva - membrana que reveste a parte externa do globo ocular);
- ressecamento ocular;
- visão turva.