

Medicamento Oncológico

Lenalidomida

Indicação Terapêutica: Tratamento de pacientes com mieloma múltiplo, síndrome mielodisplásica Crônica.

Recomendações

- Tome sempre com um copo de água;
- Administrar após uma refeição;
- Tome sempre no mesmo horário;
- Este medicamento não deve ser partido ou mastigado;
- Caso tenha esquecido de tomar a dose do dia anterior, tome a dose do dia normalmente, não dobre a dose;
- Armazenar em temperatura ambiente (15°C a 30°C), protegido da luz e umidade;
- Mantenha comprimidos em sua embalagem original até o momento de uso e observe a validade;
- Não tome nenhum medicamento, chás, fitoterápicos, produtos naturais sem o consentimento do seu médico;
- Informe imediatamente o seu médico caso esteja grávida ou com suspeita de gravidez;
- Não deve ser utilizado por mulheres grávidas ou que possam ficar grávidas durante o tratamento, entretanto, orienta-se mulheres em idade fértil utilizar método anticoncepcional, conforme orientação do seu médico ou farmacêutico;
- Informe o seu médico caso esteja amamentando;
- Pergunte ao seu médico se existe interação medicamentosa com demais medicamentos em uso e procure saber os efeitos adversos menos comuns;
- Em casos de dúvidas entre em contato com seu médico.

Reações adversas frequentes

- Reações alérgicas como inchaço nos lábios e olhos;
- Urticária (lesões avermelhadas e levemente inchadas, como vergões, que aparecem na pele e coçam muito);
- Feridas em todo corpo que podem levar à descamação permanente da pele;
- Gripe;
- Tosse;
- Diarreia;
- Constipação (Dificuldade de eliminar as fezes);
- Dor na barriga;
- Náuseas (ânsia de vômito);
- Pele seca;
- Espasmos musculares (Contrações involuntárias de um músculo);
- Fadiga;
- Fraqueza muscular;
- Febre.