

Medicamento Oncológico

Lenvatinibe

Indicação Terapêutica: Tratamento de câncer de fígado.

Recomendações

- Tome sempre com um copo de água;
- Administrar após uma refeição;
- Tome sempre no mesmo horário;
- Este medicamento não deve ser partido ou mastigado;
- Caso tenha esquecido de tomar a dose do dia anterior, tome a dose do dia normalmente, não dobre a dose;
- Armazenar em temperatura ambiente (15°C a 30°C), protegido da luz e umidade;
- Mantenha comprimidos em sua embalagem original até o momento de uso e observe a validade;
- Não tome nenhum medicamento, chás, fitoterápicos, produtos naturais sem o consentimento do seu médico;
- Informe imediatamente o seu médico caso esteja grávida ou com suspeita de gravidez;
- Este medicamento não deve ser usado durante a amamentação;
- Pergunte ao seu médico se existe interação medicamentosa com demais medicamentos em uso e procure saber os efeitos adversos menos comuns;
- Em casos de dúvidas entre em contato com seu médico.

Reações adversas frequentes

- Aumento da pressão arterial;
- Diarreia;
- Diminuição do apetite;
- Redução de peso;
- Cansaço;
- Enjoo;
- Inflamação da mucosa oral;
- Vômitos;
- Rouquidão;
- Dor de cabeça
- Síndrome mão-pé (sintomas dormência das mãos e pés, vermelhidão da pele, rachaduras e dor).