

Medicamento Oncológico

Loratinibe

Indicação Terapêutica: Tratamento de pacientes com câncer de pulmão

Recomendações

- Tome sempre com um copo de água;
- Tome sempre no mesmo horário;
- Pode ser administrado com ou sem alimento;
- Os comprimidos não devem ser partidos ou mastigados;
- Nenhum comprimido deve ser ingerido se estiver quebrado, rachado, ou de outro modo não intacto.
- Informe imediatamente o seu médico caso esteja grávida ou com suspeita de gravidez;
- Não deve ser usado durante a amamentação;
- Não manuseie os comprimidos. De preferência, coloque o comprimido em um copo descartável ao toma-lo;
- Se uma dose for esquecida, deve tomá-la tão logo se lembrar, a menos que falte menos de 4 horas até a próxima dose, e nesse caso, o paciente não deve tomar a dose esquecida. Os pacientes não devem tomar 2 doses ao mesmo tempo para compensar a dose esquecida;
- Armazenar em temperatura ambiente (15°C a 30°C), protegido da luz e umidade;
- Mantenha os comprimidos em sua embalagem original até o momento de uso e observe a validade;
- Não tome nenhum medicamento, chás, fitoterápicos, produtos naturais sem o consentimento do seu médico;
- Pergunte ao seu médico se existe interação medicamentosa com demais medicamentos em uso e procure saber os efeitos adversos menos comuns.

Reações adversas frequentes

- Inchaço;
- Transtorno do humor;
- Diarreia;
- Náusea;
- Constipação;
- Fadiga;
- Ganho peso;
- Hipertensão;
- Artralgia (dor articular)