

Medicamento Oncológico

# Megestrol

**Indicação Terapêutica: Tratamento cancer de mama e endométrio.**

## Recomendações

- Tome sempre com um copo de água;
- Administrar após uma refeição;
- Tome sempre no mesmo horário;
- Este medicamento não deve ser partido ou mastigado;
- Caso tenha esquecido de tomar a dose do dia anterior, tome a dose do dia normalmente, não dobre a dose;
- Armazenar em temperatura ambiente (15°C a 30°C), protegido da luz e umidade;
- Mantenha comprimidos em sua embalagem original até o momento de uso e observe a validade;
- Não tome nenhum medicamento, chás, fitoterápicos, produtos naturais sem o consentimento do seu médico;
- Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. Seu uso não é recomendado durante os primeiros quatro meses de gravidez;
- A amamentação deve ser interrompida durante o tratamento com este medicamento;
- Pergunte ao seu médico se existe interação medicamentosa com demais medicamentos em uso e procure saber os efeitos adversos menos comuns.
- Em casos de dúvidas entre em contato com seu médico.

## Reações adversas frequentes

- Aumento de peso;
- Aumento de apetite;
- Aumento da pressão arterial;
- Sensação de calor;
- Transpiração
- Vermelhidão da pele;
- Falta de ar;
- Intestino preso.