

Medicamento Oncológico

Mercaptopurina

Indicação Terapêutica: LLA - Leucemia Linfocítica (Linfoblástica) Aguda.

LMA - Leucemia Mielóide (mielocítica, mielógena, mieloblástica, mielomonocítica) Aguda.

LMC - Leucemia Mielocítica (mielóide, mielógena, granulocítica) Crônica.

Recomendações

- Tome sempre com um copo de água;
- Administrar após uma refeição;
- Tome sempre no mesmo horário;
- Este medicamento não deve ser partido ou mastigado;
- Caso tenha esquecido de tomar a dose do dia anterior, tome a dose do dia normalmente, não dobre a dose;
- Armazenar em temperatura ambiente (15°C a 30°C), protegido da luz e umidade; Mantenha comprimidos em sua embalagem original até o momento de uso e observe a validade;
- Não tome nenhum medicamento, chás, fitoterápicos, produtos naturais sem o consentimento do seu médico;
- Informe seu médico caso esteja grávida ou suspeita de gravidez
- Devem ser tomadas medidas contraceptivas em caso de algum dos parceiros estarem fazendo uso do medicamento, não se deve amamentar ao uso do medicamento;
- Pergunte ao seu médico se existe interação medicamentosa com demais medicamentos em uso e procure saber os efeitos adversos menos comuns.
- Em casos de dúvidas entre em contato com seu médico.

Reações adversas frequentes

- Enjoo;
- Vômito;
- Perda de apetite.