

Medicamento Oncológico

Metotrexato

Indicação Terapêutica: Tratamento de câncer de cabeça e pescoço; de linfoma não-Hodgkin, LLA - leucemias linfocíticas (Linfoblástica) agudas; câncer de mama; sarcoma osteogênico; tumor trofoblástico gestacional.

Recomendações

- Tome sempre com um copo de água;
- Administrar após uma refeição;
- Tome sempre no mesmo horário;
- Este medicamento não deve ser partido ou mastigado;
- Caso tenha esquecido de tomar a dose do dia anterior, tome a dose do dia normalmente, não dobre a dose;
- Armazenar em temperatura ambiente (15°C a 30°C), protegido da luz e umidade;
- Mantenha comprimidos em sua embalagem original até o momento de uso e observe a validade;
- Não tome nenhum medicamento, chás, fitoterápicos, produtos naturais sem o consentimento do seu médico;
- Não deve ser usado em pacientes durante a gravidez informe seu médico caso esteja suspeita de estar grávida, recomenda-se não utilizar durante a amamentação.
- Pergunte ao seu médico se existe interação medicamentosa com demais medicamentos em uso e procure saber os efeitos adversos menos comuns;
- Em casos de dúvidas entre em contato com seu médico.

Reações adversas frequentes

- Inflamação da mucosa da boca;
- Enjoo;
- Desconforto abdominal;
- Dor de cabeça;
- Rigidez de nuca;
- Vômitos;
- Febre;
- Vermilhado na pele;
- Irritação na garganta;
- Vertigem (sensação de estar girando em torno do ambiente);
- Mal-estar;
- Febre;
- Calafrios ("Arrepios");
- Embaçamento visual.