

Medicamento Oncológico

Midostaurina

Indicação Terapêutica: Tratamento de leucemia mieloide aguda (LMA).

Recomendações

- Tome sempre com um copo de água;
 - Administrar após uma refeição;
- Tome sempre no mesmo horário;
- Caso tenha esquecido de tomar a dose do dia anterior, tome a dose do dia normalmente, não dobre a dose;
 - Armazenar em temperatura ambiente (15°C a 30°C), protegido da luz e umidade;
 - Mantenha comprimidos em sua embalagem original até o momento de uso e observe a validade;
 - Não tome nenhum medicamento, chás, fitoterápicos, produtos naturais sem o consentimento do seu médico;
 - As cápsulas não devem ser abertas, esmagadas ou mastigadas para garantir a dose correta e evitar o sabor desagradável do conteúdo da cápsula;
 - Informe imediatamente o seu médico caso esteja grávida ou com suspeita de gravidez;
 - Informe o seu médico caso esteja amamentando;
 - Pergunte ao seu médico se existe interação medicamentosa com demais medicamentos em uso e procure saber os efeitos adversos menos comuns;
 - Em casos de dúvidas entre em contato com seu médico.

Reações adversas frequentes

- Enjoo
- Descamação e pequenas manchas vermelhas na pele
- Vômitos
- Dor de cabeça
- Febre