

Medicamento Oncológico

Mitotano

Indicação Terapêutica: Tratamento de tumor do córtex Suprarenal.

Recomendações

- Tome sempre com um copo de água;
- Administrar após uma refeição;
- Tome sempre no mesmo horário;
- Este medicamento não deve ser partido ou mastigado;
- Caso tenha esquecido de tomar a dose do dia anterior, tome a dose do dia normalmente, não dobre a dose;
- Armazenar em temperatura ambiente (15°C a 30°C), protegido da luz e umidade;
- Mantenha comprimidos em sua embalagem original até o momento de uso e observe a validade;
- Não tome nenhum medicamento, chás, fitoterápicos, produtos naturais sem o consentimento do seu médico;
- O medicamento só deve ser utilizado por mulheres grávidas se estritamente necessário;
- Mulheres em idade fértil devem utilizar métodos contraceptivos eficazes, durante e após a interrupção do tratamento;
- Informe imediatamente o seu médico caso esteja grávida ou com suspeita de gravidez;
- As mães devem ser aconselhadas a interromper a amamentação;
- Pergunte ao seu médico se existe interação medicamentosa com demais medicamentos em uso e procure saber os efeitos adversos menos comuns;
- Em casos de dúvidas entre em contato com seu médico.

Reações adversas frequentes

- Depressão;
- Sonolência;
- Tontura ou vertigem;
- Perda de apetite;
- Enjoo;
- Vômito;
- Diarreia
- Lesões avermelhadas na pele;