

Medicamento Oncológico

Nilotinibe

Indicação Terapêutica: Tratamento LMC-Leucemia Mielocítica (mieloide,mielógena,granulocítica) Crônica.

Recomendações

- Tome sempre com um copo de água;
- Tome sempre no mesmo horário;
- Este medicamento não deve ser partido ou mastigado;
- Caso tenha esquecido de tomar a dose do dia anterior, tome a dose do dia normalmente, não dobre a dose;
- Armazenar em temperatura ambiente (15°C a 30°C), protegido da luz e umidade;
- Mantenha comprimidos em sua embalagem original até o momento de uso e observe a validade;
- Não tome nenhum medicamento, chás, fitoterápicos, produtos naturais sem o consentimento do seu médico;
- Não ingerir o medicamento com alimentos. Tomar as cápsulas pelo menos duas horas após a ingestão de qualquer alimento e, após tomá-las, esperar pelo menos uma hora para se alimentar novamente;
- Não comer ou beber produtos e sucos contendo grapefruit (toranja), carambola, romã, laranjas de Seville durante o tratamento;
- Informe imediatamente o seu médico caso esteja grávida ou com suspeita de gravidez;
- Informe o seu médico caso esteja amamentando;
- Pergunte ao seu médico se existe interação medicamentosa com demais medicamentos em uso e procure saber os efeitos adversos menos comuns.
- Em casos de dúvidas entre em contato com seu médico.

Reações adversas frequentes

- Dor abdominal;
- Enjoo;
- Vômito;
- Intestino preso;
- Diarreia;
- Dor de cabeça;
- Cansaço;
- Falta de energia;
- Dor muscular;
- Dor nas articulações (“dor nas juntas”);
- Coceira;
- Erupção cutânea (feridas na pele);
- Pele seca;
- Queda de cabelo.