

Medicamento Oncológico

Ribociclib

Indicação Terapêutica: Tratamento de câncer de mama.

Recomendações

- Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado;
- Pode ser tomado com ou sem alimento;
- Tomar dose aproximadamente à mesma hora todos os dias, preferencialmente de manhã;
- Se vomitar depois de tomar a dose ou se esquecer de tomar uma dose, não deve tomar uma dose adicional naquele dia;
- Conservar este medicamento em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C);
- Informe imediatamente o seu médico caso esteja grávida ou com suspeita de gravidez;
- Informe o seu médico caso esteja amamentando;
- O tratamento com Ribociclib pode ter alguma influência sobre a capacidade de dirigir e operar máquinas. Aconselha-se a serem cautelosos ao conduzir ou utilizar máquinas no caso de apresentarem fadiga, tontura ou vertigem durante o tratamento;
- Evitar grapefruit ou suco de grapefruit;
- Pergunte seu médico se existe interação medicamentosa com os demais medicamentos em uso e procure saber sobre os efeitos adversos menos comuns;
- Informe imediatamente o seu médico caso esteja grávida ou com suspeita de gravidez;
- Informe o seu médico caso esteja amamentando.
- Em casos de dúvidas entre em contato com seu médico.

Reações adversas frequentes

- Diminuição do apetite;
- Dor de cabeça;
- Tontura;
- Tosse;
- Falta de ar;
- Náusea ("ânsia de vômito")
- Diarreia;
- Vômito;
- Constipação (Dificuldade de eliminar as fezes);;
- Estomatite (feridas no interior da boca); ;
- Dor abdominal;
- Erupção na pele (ferida);
- Coceira;
- Dor nas costas.