

Medicamento Oncológico

Ruxolitinibe

Indicação Terapêutica: Tratamento de Mielofibrose.

Recomendações

- Administrado por via oral, com ou sem alimentos;
- Os comprimidos devem ser ingeridos inteiros com um copo de água.
- Se omitir uma dose, o doente não deve tomar uma dose adicional, mas deve tomar a dose seguinte como habitualmente;
- Nunca deve começar um medicamento novo sem antes consultar o médico que lhe prescreveu. Isso inclui medicamentos de prescrição, medicamentos de venda livre e medicamentos fitoterápicos ou alternativos;
- Se você apresentou tonturas durante o tratamento com não deve conduzir veículos ou operar máquinas, pois sua habilidade e atenção podem estar prejudicadas;
- Armazenar este medicamento em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C);
- Não tome uma dose dupla para compensar uma dose esquecida. Se você se esquecer de tomar simplesmente tome a próxima dose no horário planejado;
- Informe imediatamente o seu médico caso esteja grávida ou com suspeita de gravidez;
- Informe o seu médico caso esteja amamentando.
- Pergunte seu médico se existe interação medicamentosa com os demais medicamentos em uso e procure saber sobre os efeitos adversos menos comuns;
- Em casos de dúvidas entre em contato com seu médico.

Reações adversas frequentes

- Infecções do trato urinário;
- Hematomas (Manchas na pele);
- Ganho de peso;
- Tontura;
- Dor de cabeça;
- Constipação (Dificuldade de eliminar as fezes);
- Flatulência (Eliminação de gases de forma frequente).