

Medicamento Oncológico

Sunitinibe

Indicação Terapêutica: Tratamento de câncer estromal gastrointestinal (GIST), Rins e Pâncreas.

Recomendações

- Deve ser conservado em temperatura ambiente (entre 15 e 30 °C), protegido da umidade;
- Deve ser utilizado por via oral, com ou sem alimentos;
- Caso você esqueça-se de tomar no horário estabelecido pelo seu médico, não tome uma dose adicional. Neste caso, tome a dose recomendada no dia seguinte, como faria habitualmente.
- Aconselha a não engravidar enquanto estiverem recebendo tratamento;
- Informe imediatamente o seu médico caso esteja grávida ou com suspeita de gravidez;
- Informe o seu médico caso esteja amamentando;
- Efeitos na Habilidade de Dirigir e Operar Máquinas cautela devido a reações adversas como tontura;
- Pergunte seu médico se existe interação medicamentosa com os demais medicamentos em uso e procure saber sobre os efeitos adversos menos comuns;
- Em casos de dúvidas entre em contato com seu médico.

Reações adversas frequentes

- Diminuição do apetite;
- Insônia;
- Dor de cabeça;
- Hipertensão (aumento da pressão arterial);
- Dor abdominal;
- Diarreia;
- Vômito;
- Náusea (ânsia de vômito);
- Estomatite (feridas no interior da boca);
- Constipação (Dificuldade de eliminar as fezes);
- Alteração na cor da pele e cabelo;
- Pele seca;
- Fadiga;
- Tontura.