

Medicamento Oncológico

Temozolamida

Indicação Terapêutica: Tratamento de tumor no Sistema Nervoso Central.

Recomendações

- Não deve ser aberta ou mastigada, devendo ser administrada inteira com um copo de água;
- Se a cápsula for danificada, o paciente deve ser orientado a evitar o contato do seu conteúdo com a pele ou com as mucosas. Em caso de contato com o pó, as mãos devem ser lavadas;
- Conservar em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C);
- Podem ser ingeridas independentemente da alimentação; entretanto, a administração uma hora antes da refeição pode auxiliar na redução de náuseas;
- O paciente deve ser instruído a dose esquecida assim que se lembrar, durante o mesmo dia, não devendo tomar dose dupla em um mesmo dia;
- Se ocorrer vômito após a dose administrada, não se deve administrar uma segunda dose no mesmo dia;
- Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. Informe imediatamente seu médico em caso de suspeita de gravidez;
- Informe seu médico se estiver amamentando;
- Pergunte seu médico se existe interação medicamentosa com os demais medicamentos em uso e procure saber sobre os efeitos adversos menos comuns;
- Em casos de dúvidas entre em contato com seu médico.

Reações adversas frequentes

- Ansiedade;
- Insônia;
- Tontura;
- Alteração no equilíbrio;
- Dificuldade de concentração;
- Náusea (ânsia de vômito);
- Vômito;
- Confusão;
- Sonolência;
- Distúrbios da fala;
- Diarreia;
- Tremores;
- Constipação (Dificuldade de eliminar as fezes).