

Medicamento Oncológico

Tioguanina

Indicação Terapêutica: Tratamento LMA - Leucemia Mielóide (mielocítica,mielógena,mielomonocítica,mieloblástica) Aguda.

Tratamento LLA - Leucemia Linfocítica (linfoblástica) Aguda.

Tratamento LMC - Leucemia Mielocítica (mieloide,mielógena,granilocítica) Crônica.

Recomendações

- O medicamento deve ser mantido em sua embalagem original, em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C), protegido da luz e da umidade;
- Devem ser engolidos com o auxílio de um copo de água;
- Evite a ingestão de alimentos em horários próximos à administração;
- Se for necessária a utilização de um comprimido partido deve-se ter cautela para não contaminar as mãos ou inalar o medicamento;
- Não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. Informe imediatamente seu médico em caso de suspeita de gravidez;
- Devem ser, sempre que possível evitado na gestação, especialmente durante o primeiro trimestre;
- Devem tomar precauções adequadas para evitar a gravidez durante o tratamento;
- Pergunte seu médico se existe interação medicamentosa com os demais medicamentos em uso e procure saber sobre os efeitos adversos menos comuns.
- Em casos de dúvidas entre em contato com seu médico.

Reações adversas frequentes

- Estomatite (inflamação e feridas na mucosa bucal);
- Distúrbio gastrointestinal;
- Ganho de peso devido à retenção de fluidos.