

Medicamento Oncológico

Trametinibe

Indicação Terapêutica: Tratamento de melanoma.

Recomendações

- Armazenar sob refrigeração de 2°C a 8°C. Não congelar. Proteger contra umidade e luz.
- Conservar o produto em seu frasco original;
- Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado;
- Deve ser administrado sem alimentos pelo menos 1 hora antes ou 2 horas após uma refeição;
- Se uma dose for omitida, só deve ser tomado se faltarem mais de 12 horas até a próxima dose prevista;
- Deve ser tomado por via oral com um copo cheio de água;
- Recomenda-se que a dose seja tomada em horários semelhantes todos os dias;
- Mulheres com potencial para engravidar devem ser aconselhadas a utilizar contracepção altamente eficaz durante o tratamento e até 4 semanas após o término do tratamento;
- Para prevenir uma gravidez, juntamente com contracepção hormonal, aconselha-se utilizar um método adicional ou alternativo durante o tratamento e durante 4 meses após a descontinuação;
- Não deve ser administrado em mulheres grávidas ou em mães a amamentar;
- Pode-se haver alterações sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas, devendo haver cautela, devido ao potencial para fadiga, tonturas ou problemas oculares que podem afetar estas atividades;
- Pergunte seu médico se existe interação medicamentosa com os demais medicamentos em uso e procure saber sobre os efeitos adversos menos comuns;
- Em casos de dúvidas entre em contato com seu médico.

Reações adversas frequentes

- Diminuição do apetite;
- Dor de cabeça;
- Tontura;
- Tosse;
- Dor abdominal;
- Constipação (Dificuldade de eliminar as fezes);
- Diarreia;
- Náusea (ânsia de vômito);
- Vômitos;
- Pele seca;
- Coceira;
- Erupção na pele (ferida);
- Fadiga.