

Medicamento Oncológico

Tretinoína

Indicação Terapêutica: Tratamento leucemia Promielocítica.

Recomendações

- Testes de gravidez devem ser realizados mensalmente durante o tratamento, contraindicado para mulheres grávidas e para mulheres que possam vir a engravidar durante ou até um mês após o término do tratamento;
- A paciente deve-se aderir e cumprir as medidas anticoncepcionais obrigatórias;
- Informe seu médico se você estiver amamentando antes de iniciar o tratamento
- Não deverá dirigir veículos ou operar máquinas durante o tratamento, pois a sua habilidade e atenção podem estar prejudicadas;
- Deve conservar o frasco bem fechado em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C) e protegê-lo da luz;
- Recomenda-se que seja administrado junto com a refeição ou logo após, porque os alimentos melhoram a absorção deste medicamento;
- Se esquecer de tomar as cápsulas, deve tomá-las com uma refeição, assim que lembrar;
- Pergunte seu médico se existe interação medicamentosa com os demais medicamentos em uso e procure saber sobre os efeitos adversos menos comuns
- Em casos de dúvidas entre em contato com seu médico.

Reações adversas frequentes

- Vermelhidão na pele;
- Ressecamento dos lábios;
- Secura da boca;
- Secura da Conjuntiva ("sensação de olho seco");
- Coceira;
- Sudorese ("Muito Suor");
- Perda de cabelo;
- Dor de cabeça;
- Febre;
- Tremores;
- Tontura;
- Confusão;
- Ansiedade;
- Náusea
- Vômito;
- Dor abdominal;
- Constipação (Dificuldade de eliminar as fezes);
- Diarreia;
- Appetite diminuído.