

Medicamento Oncológico

Venetoclax

**Indicação Terapêutica: Tratamento Leucemia Linfocítica Crônica (LLC).
Tratamento Leucemia Mieloide Aguda (LMA).**

Recomendações

- Evite produtos à base de toranja, laranja-azeda e carambola durante o tratamento;
- Deve ser mantido em sua embalagem original e conservado em temperatura ambiente (temperatura entre 15 e 30°C). Guarde-o em sua embalagem original;
- É muito importante manter-se hidratado e beber água todos os dias;
- Se você se esquecer de tomar uma dose por mais de 8 horas do horário em que normalmente toma o medicamento, entre em contato com o seu médico;
- Se você vomitar após a tomada da dose, não tomar uma dose adicional no dia. Tomar a próxima dose prescrita no horário habitual;
- Informar seu médico se estiver amamentando
- Informar o seu médico se estiver grávida ou suspeita de gravidez;
- Pergunte seu médico se existe interação medicamentosa com os demais medicamentos em uso e procure saber sobre os efeitos adverso menos comum;
- Em casos de dúvidas entre em contato com seu médico.

Reações adversas frequentes

- Náuseas (“ânsia de vômito”);
- Diarreia;
- Vômitos;
- Estomatite (feridas no interior da boca);
- Fadiga;
- Diminuição do apetite;
- Tontura.